

کتاب الحکامی

اردو ترجمہ

نواں حصہ

نواں حصہ

رحم اور حمل کے امراض

تالیف

ابوبکر محمد بن زکریا رازی

۸۶۵ء ————— ۹۲۵ء

امراض، اسباب امراض اور معالجات کی
شہرہ آفاق تالیف ”الحاوی الکبیر فی الطب“ کا اردو ترجمہ

کتاب الحاوی

موسوم بہ

حاوی کبیر

نواں حصہ

رحم اور حمل کے امراض

تالیف

ابوبکر محمد بن زکریا رازی

۸۶۵ء ————— ۹۲۵ء

شائع کردہ

سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن

(محکمہ ہندوستانی طریقہائے علاج و ہومیوپیتھی)

وزارت صحت و خاندانی بہبود، حکومت ہند، نئی دہلی

ناشر

سنٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن
۶۵-۶۱، انسٹی ٹیوشنل ایریا،

جنگ پوری
نئی دہلی ۱۱۰۰۵۸

جملہ حقوق محفوظ ہیں

تعداد اشاعت : ایک ہزار
سن اشاعت : ۲۰۰۱ء
قیمت : ۱۷۵ روپے

طابع : علی کارپوریشن انڈیا، دہلی - ۱۱۰۰۰۶

فہرست مضامین

پیش لفظ

5

7

پہلا باب

رحم کے زخم، نزف، سیلان، سرطان، رجاء (حمل کا ذب)، اور اس سے ملتے جلتے اور ام رحم، آکلہ، نتوء رحم، انقلاب رحم نیز تمام اقسام کے اور ام اور زخم، تمدوخ الرحم اور رحم میں پانی کا ہونا، صلابت (رحم کی سختی)، خلع رحم (رحم کا ٹل جانا)، رتق وفتق رحم، قاطع سیلان چیزیں، سیلان کے نقصانات، بواسیر رحم اور شقاق الرحم سے عارض ہونے والا نزف اور بطن رحم میں نفخ کے اسباب جن سے عورت پر حاملہ ہونے کا گمان لگتا ہے جسے با بورد کہتے ہیں۔

55

دوسرا باب

اختناق الرحم، سقوط الرحم، اطراف کی جانب مائل ہو جانا، اور قم رحم کا بند ہو جانا۔

71

تیسرا باب

حمل کی علامات، کثرت تولید اور بانجھ پن، جنس مذکر اور مؤنث کی پہچان اور ان کی تولید، اسقاط کی علامتیں، جنین کا قوی اور ضعیف ہونا اور ان کا تحفظ، تدبیر حوامل، اسقاط کے فوائد، ازالہ بکارت کے بعد اعادۂ بکارت کی تدبیر، جنین کے زندہ یا مردہ ہونے کی شناخت۔

120

چوتھا باب

ولادت میں سہولت، جنین اور مشیمہ کا اخراج، مانع حمل، تدبیر نفاس وزچہ، عسر ولادت کی علامات اور ولادت کی سہولت، اسقاط، رجاء کی علت جسے حمل کا ذب کہتے ہیں اور دروزہ میں شدت لانے والے اسباب۔

151

پانچواں باب

وہ چیزیں جو حیض جاری کرتی ہیں، احتباس طمث کے نقصانات، احتباس کی حالت میں جسم کی کیفیت اور اس کی علامات، تنقیہ رحم و نفاس اور اس بات کی جانکاری کہ حیض جاری ہو گیا یا نہیں۔

169

چھٹا باب

ناف، مقعد اور فرج کا باہر آ جانا، آلہ تناسل اور اس کے متعلقات، دُبر، عانہ، اورام اور بواسیر مقعد و رحم اور اس کے درد وغیرہ، عانہ کی خرابیاں، ذکر، خصی اور نتوء رحم۔

پیش لفظ

ابوبکر محمد بن زکریا رازی (۹۲۵-۸۶۵ء) کی ایک امتیازی شان یہ تھی کہ اس نے جملہ پیش رو اطباء کی تحریروں کا یہ نظر غائر مطالعہ کیا تھا، تاہم ان کے نظریات اور افکار و خیالات کو من و عن جذب و قبول کرنے کے بجائے تنقید کی کسوٹی پر کستا تھا، خواہ وہ افلاطون و ارسطو کیوں نہ ہوں۔ اس کے نقطہ نظر سے متاخرین متقدمین سے اس لحاظ سے بہتر ہیں کہ ان کے پاس اپنے علم کے علاوہ متقدمین کا سرمایہ بھی ہے۔ اسی طرح وہ جالینوس کے نظریات سے متعدد امور میں اختلاف کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اس صالح تنقید و اختلاف کے ساتھ متقدمین کے درست اصول و نظریات کی تائید و توثیق میں وہ پیش پیش نظر آتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ:

”فن طب مردہ تھا، جالینوس نے زندہ کیا، منتشر تھا، رازی نے مرتب کر کے شیرازہ بندی کی، ناقص تھا ابن سینا نے مکمل کیا“

رازی کی مبسوط تالیف الحاوی الکبیر فی الطب کو دیکھ کر اس مقولہ پر ایمان لانا پڑتا ہے، جو نہ صرف اس کے ذاتی تجربات، خیالات و نظریات کا نچوڑ اور سرمایہ بے بہا ہے، بلکہ جس کی وساطت سے نہ جانے کتنے معروف و غیر معروف لیکن اہم اطباء کے قیمتی سریری اقوال و تجربات نیز مجربات ہم تک پہنچے۔ بلاشبہ طبی دنیا رازی کے احسانات سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ بصورت دیگر اتنا وسیع سرمایہ ہمیشہ کے لیے ماضی کی تاریکیوں میں گم ہو گیا ہوتا۔ اطباء قدیم کے اقوال و تجربات کے انتخاب کے پیش نظر اس کی فراست، ذاتی علمیت، ندرت خیال، اصابت رائے، مشاہدات نیز دو ٹوک فیصلہ کی داد دینی پڑتی ہے۔

کتاب الحاوی کے لاطینی ایڈیشن ۲۵ جلدوں میں مختلف لائبریریوں کی زینت تھے، لیکن الگوڈ نے ۱۹۵۱ء میں لکھا تھا کہ ”مکمل عربی متن کبھی نہیں شائع ہوا۔ اصل متن کے حصے مختلف لائبریریوں میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔ ایک دن ان کی فراہمی اور تدوین و اشاعت عمل میں آئے گی۔ طب العرب کے مورخین کو الحاوی (Continens) کو بہت زیادہ بلکہ شیخ الرئیس ابن سینا کی القانون فی الطب سے بھی زیادہ اہمیت دینی چاہئے۔“

الگوڈ کا جذبہ صادق بالآخر رنگ لایا اور وزارت تعلیم، حکومت ہند کے تحت دائرۃ المعارف العثمانیہ، عثمانیہ یونیورسٹی، حیدرآباد نے اسکوریاں کے نسخہ کو اساس بنا کر اصل عربی متن کی تدوین و طباعت جیسے عظیم لیکن وقت طلب کام کا بیڑا اٹھایا اور اس دائرۃ المعارف نے ۱۹۵۸ء تا ۱۹۷۱ء کی درمیانی مدت میں کتاب الحاوی کی ۲۳ جلدوں کو زیور طبع سے آراستہ کر کے تشنگان علم و فن کے سامنے پیش کر دیا اور اس طرح یہ قیمتی فنی سرمایہ زمانے کی دست برد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ الگوڈ کی پیش قیاسی کے پہلے حصے کی تکمیل ہوئی۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ الحاوی فی الطب کی ۲۱ ویں اور ۲۳ ویں جلدیں دودھ و حصوں پر مشتمل ہیں۔ لہذا اگر دیکھا جائے تو لاطینی ایڈیشن کی طرح اس کی بھی ۲۵ جلدیں مکمل طور سے موجود ہیں۔ بلاشبہ دائرۃ المعارف کی خدمات کو طبی اور علمی دنیا میں ہمیشہ یہ نظر استحسان دیکھا جائے گا۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں تک رسائی محض ان چند گنے چنے اسکالرس ہی کی ممکن تھی جو طب یونانی کے ساتھ ساتھ عربی زبان پر بھی

دسترس رکھتے تھے۔ چنانچہ طب یونانی کے اس مہر بند خزانے کا فیض عام کرنے کی غرض سے سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن نے اردو زبان میں اس کی منتقلی کو اپنے لٹریری ریسرچ پروگرام کی ترجیحات میں شامل کیا، جس کے نتیجے میں اس کی آٹھ جلدیں شائع ہو کر ارباب علم و فن سے تحسین حاصل کر چکی ہیں اور نویں جلد آپ کے سامنے ہے نیز دسویں اور گیارہویں جلدیں ترجمہ اور ترمیم و تہذیب کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہیں۔

کتاب الحاوی کی زیر نظر جلد امراض رحم و حمل (Gynaecology & Midwifery) پر مشتمل ہے، جس میں جملہ چھ ابواب ہیں۔ باب اول میں قروح رحم، نزف الرحم، سیلان الرحم، سرطان الرحم، جملہ اورام رحم کے علاوہ حمل کا ذب نیز انقلاب و تمدد رحم پر فاضلانہ گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طرح باب دوم میں اختناق الرحم، سقوط الرحم (رحم کا گر جانا)، سیلان الرحم یا میلان الرحم (رحم کا اطراف کی طرف مائل ہو جانا) اور انسداد رحم (مجمد رحم کا بند ہو جانا) جیسے اہم موضوعات پر سائنٹفک انداز نگارش اختیار کیا گیا ہے۔ باب سوم میں علامات حمل، کثرت تولید اور عقرو عقم، جنین کی جنس کی شناخت، اسقاط حمل اور جنین کی حیات و ممات کے موضوع پر زریں مواد فراہم کیا گیا ہے۔ باب چہارم میں تسہیل ولادت، عسر ولادت، اخراج مشیمہ، اعتناع حمل، حمل کا ذب اور درد زہ کی شدت سے عارض ہونے والی بیماری کا احاطہ کیا گیا ہے۔ باب پنجم میں احتباس طمث نیز منقیات رحم اور متعلقہ امور سے بحث کی گئی ہے اور باب ششم میں نتوء السره (ناف کے باہر نکلنے)، نتوء المقعد (خروج المقعد)، قروح فرج اور بواسیر، اورام مقعد و رحم وغیرہ کے علاوہ عضو تناسل، خصیتین اور مقعد کے اورام و مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ رازی نے متذکرہ گونا گوں مسائل نسوان و قابلہ، عہد قدیم کے اہم اطباء کے اقوال و مجربات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ذاتی نظریات اور اصول مطب و تجربات کی تطبیق انتہائی فطری انداز میں کی ہے۔ اس طرح نہ صرف تحقیقی میدان میں اس کی اساسی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ عملی مطب میں بھی افادیت بڑھ گئی ہے۔

الگوڈ نے مورخین کو کتاب الحاوی کو شیخ الرئیس کی القانون فی الطب پر ترجیح دینے کی سفارش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مخلصانہ اپیل کے مخاطب مورخین سے زیادہ حاملین فن ثابت ہوئے، کیونکہ بفضل الہی ہندوستان میں آج بھی یہ فن تاریخ کا ایک گمشدہ باب بننے کے بجائے عملی طور پر نہ صرف زندہ ہے، بلکہ نشاۃ ثانیہ کے دور سے گزر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بیکراں محاسن کے سبب اس ترقی پذیر خالص ہندوستانی طریقہ علاج کی طرف دنیا کی نگاہیں متبادل معالجہ کے طور پر اختیار کرنے کے لیے بے اختیار اٹھنے لگی ہیں اور عالمی سطح پر اس فن کو متعارف کرانے کے سلسلے میں سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن شانہ روز کوشاں ہے۔ اس انسائیکلو پیڈیا کی کارنامہ کا ترجمہ بھی اس سلسلے کی اہم کڑی ثابت ہوگی۔

امید ہے کہ سابقہ جلدوں کی طرح جلد نہم کے ترجمہ کی بھی علمی و فنی، تحقیقی و تدریسی حلقوں میں بھرپور پذیرائی ہوگی۔ اس کی باقی جلدوں کے ترجمہ و اشاعت کے عظیم پروجیکٹ پر ہماری توجہ مسلسل مرکوز رہے گی تاکہ یہ گنج گراں مایہ جلد از جلد اردو داں ارباب فن تک پہنچ سکے۔

حاج

(حکیم محمد خالد صدیقی)

ڈائریکٹر

سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن، نئی دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا باب

رحم کے زخم، نزف، سیلان، سرطان، رجاء (حمل کا ذب)، اور اس سے ملتے جلتے اور ام رحم، آکلہ، نتوء رحم، انقلاب رحم نیز تمام اقسام کے اور ام اور زخم، تمدد و نفخ الرحم اور رحم میں پانی کا ہونا، صلابت (رحم کی سختی)، خلع رحم (رحم کا مل جانا)، رتق و فتق رحم، قاطع سیلان چیزیں، سیلان کے نقصانات، بواسیر رحم اور شقاق الرحم سے عارض ہونے والا نزف اور بطن رحم میں نفخ کے اسباب جن سے عورت پر حاملہ ہونے کا گمان لگتا ہے جسے با بورد کہتے ہیں۔

”حیلۃ البر“ کے پانچویں باب میں جالینوس کہتا ہے :-

میں رحم کے زخم اور بد گوشت کی صفائی ماء العسل سے کرتا ہوں اسے زراقہ (پچکاری)

سے رحم میں پہنچاتا ہوں۔

میرے پاس ایک عورت آئی جس کو چار دن سے خون جاری تھا اس کے علاج میں

مستعمل کسی بھی دوا سے خون کا بہنا بند نہیں ہو رہا تھا حتیٰ کہ میں نے اس کا علاج چوتھے دن عصا رة

بارتنگ سے کیا جس سے خون بالکل بند ہو گیا۔

یہ عصارہ عضو میں گوشت خورہ کے باعث سیلان خون کی صورت میں مفید ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ قابض دوائیں شامل کر لینا ضروری ہیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ زخم کا پوری طرح علاج کیا جائے۔

نزف رحمی میں چاہے وہ کسی بھی جہت پر بھی ہو نیچے چھاتی کے زیریں جانب پچھنا (Cupping Glass) لگانا بہت مفید ہوتا ہے۔

کثرت حیض سے عارض ہونے والے نقصانات:

رنگ کا بدل کر خراب ہو جانا، ہاتھوں پیروں نیز پورے جسم کا ہیجان و اضطراب، ہاضمہ کی کمی، بھوک کی کمی، کثرت استفرغ کے بعد کے عوارضات کبھی خون حیض مائی ہوتا ہے اور کبھی زردی مائل ہوتا ہے، کبھی سیاہ ہوتا ہے اور کبھی سبز اور کبھی فصد کے خون سے مشابہ ہوتا ہے۔ لہذا اس بات پر نظر رکھی جائے کہ اندرون رحم آکله تو نہیں ہے۔ آکله اکثر رحم کی گہرائی میں ہوتا ہے جس کی علامت یہ ہے کہ خون سیاہی اور بدبودار ہوگا اور کبھی آکله نم رحم میں ہوتا ہے اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہاں خون لگ گیا ہو۔ (چھٹا باب الاعضاء الآلمہ)

اگر خون حیض روکنا مقصود ہو تو مریضہ کی چھاتیوں پر بڑے پچھنے (Cupping Glass) لگائے جائیں خاص طور سے زیریں حصہ میں کیونکہ رحم سے چھاتی کی طرف جانے والے عروق یہیں پہنچتے ہیں اور بڑے پچھنے اس لئے لگائیں کہ پوری شدت سے رحم سے مشارکت کی بنا پر خون کا انجذاب ہوتا ہے۔

کبھی خون حیض کی زیادتی کے سبب رحم کی طرف جانے والی رگوں کا منھ کھل جانے سے ہوتا ہے یا پھر اس کا سبب خون کا طبعی قوام سے زیادہ تیز ہو جانا اور گرم ہو جانا بھی ہوتا ہے۔ جب پورے بدن کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو اس پر خون بوجھ بن جاتا ہے۔ لیکن جب خون اپنے اعتدال پر قائم ہوتا ہے تو عروق رحمی کی طرف جوش مارتا ہے جیسا کہ ان تمام اعراض میں لاحق ہوتا ہے جو اندفاع مواد کی صورت میں پیش آتے ہیں۔ (الخامسہ)

ایک سیلان کی مریضہ کا علاج تمام قاطع سیلان رحم چیزوں سے کیا گیا لیکن سفید پانی کا بہنا بند نہیں ہوا تب میں نے پہلے اس کو مسہل آب چیزوں کے استعمال سے پانی کو دستوں کے ذریعہ خارج کیا پھر اس کے بعد تین روز اسارون اور کرفس کا جوشاندہ پلا کر دوبارہ مسہل آب کے ذریعہ اسہال مائی کرایا اس کے بعد پھر مذکورہ جوشاندہ کا اعادہ کرایا اس طرح وہ مریضہ پندرہ دن میں بالکل صحت یاب ہو گئی۔ (نوادرتقدمہ المعرفة)

فصد:

رحم کے اور ام میں رگ باسلیق کی فصد کھولنا بہت کم مفید ہوتا ہے کیونکہ اس کے تین اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ خون حیض کو اوپر کی طرف لے جاتی اور بہنے سے روکتی ہے بلکہ پیر میں فصد لگانا زیادہ مفید ہوتا ہے،

کیونکہ یہ حیض کو جاری کرتی ہے۔ (الفصد)

اور ام رحم کی علامات:

ورم بسا اوقات پورے رحم میں لاحق ہوتا ہے اور بسا اوقات نم رحم میں، کبھی عروق الرحم میں اور کبھی رحم کی جڑ میں اور کبھی اس کے نواح میں ہوتا ہے۔ ورم رحم کے علامات مندرجہ ذیل ہیں:-

وجع المفاصل، اختلاج، حرارت، بخار، ڈکار، تمدد، ریڑھ، کولہوں، رانوں، عانہ اور جنگا سوں میں بوجھ، کپکپی (تشریرہ)، چھین والا درد، شانوں کا سن ہو جانا، ہاتھوں پیروں کا ٹھنڈا ہو جانا، بہ کثرت پسینہ آنا اور نبض کا صغیر ہونا۔

اس کے ساتھ جب درد بھی ہوتا ہے تو پکلی، شدید درد، گردن، گالوں اور سر کے اگلے حصہ میں درد اور عسریوں کی شکایت لاحق ہوتی ہے۔ درد جب شدت اختیار کر لیتا ہے تو آواز بند ہو جاتی ہے اور تشنج لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن جب رحم کے کسی حصہ میں ورم ہوتا ہے تو درد ہلکا ہوتا ہے۔ ورم جب دائیں حصہ میں ہوتا ہے تو رحم کا میلان بائیں ہو جاتا ہے اور برعکس صورت میں دائیں جانب، اسی طرح ورم جب سامنے کے حصہ میں ہوتا ہے تو رحم کا میلان پیچھے کی جانب ہو جاتا ہے اور برعکس صورت میں سامنے کی جانب اور جب اوپر کے حصہ میں ہوتا ہے تو رحم کا میلان نیچے کی جانب ہو جاتا ہے اس کے برعکس صورت میں اور جب درد رحم کی گردن میں ہو تو وہ درد بہت شدید ہوتا ہے، دائیں جانب کا درد جنگا سوں اور رانوں سے ہوتا ہوا دائیں پنڈلی تک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بائیں جانب رحم کے بائیں حصے کا درد بائیں طرف کے جنگا سوں اور رانوں سے ہوتا ہوا بائیں پنڈلی تک جاتا ہے۔

جب رحم کے زیریں حصہ میں معاد مستقیم کی جگہ درد ہوتا ہے تو اس کے بعد پیش کی شکایت ہوتی ہے اور اجابت بد بودار ہوتی ہے اور قبض ہوتا ہے۔ جس کی تشخیص مقعد میں انگلی داخل کرنے اور انگلی کی معاد مستقیم تک پہنچنے سے ہو جاتی ہے۔ ورم جب رحم کے بالائی حصہ میں

ہوتا ہے تو احتباس بول کی شکایت ہوتی ہے اور ناف میں شدید درد عارض ہوتا ہے جب رحم کے کسی طرف مائل ہوتا ہے تو کو لھے میں درد اور شدید کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اگر ورم رحم کی گردن میں ہوتا ہے تو جب تک مریضہ پیشاب نہ کرے درد قدرے کم محسوس ہوتا ہے۔ ہاں پیشاب کرنے پر عانہ میں گول سی سوجن ابھر آتی ہے۔ جب ورم زیریں جانب ہوتا ہے تو درد ریڑھ میں اس قدر شدید ہوتا ہے کہ مریضہ نہ ٹیک لگا سکتی ہے۔ اور نہ اس جانب لیٹ سکتی ہے اس ورم کو انگلی سے محسوس کیا جاسکتا ہے۔

رحم اور شکم کے اور ام میں علامات فاروقہ یہ ہے کہ رحم کے ورم میں مقعد، جنگا سوں، سر اور میلان رحم کے عوارضات کی مشارکت ہوتی ہے۔ اور امتحان بالید سے رحم میں سختی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ براز، درد سر اور دوسرے اسباب متقدمہ کے اعراض سے تفریق کی جاتی ہے۔

رحم جب کسی جانب مائل ہو جاتا ہے تو اس جانب شدید درد اور کھنچاؤ ہوتا ہے اور مریضہ آرام سے نہ کھڑی ہو سکتی ہے اور نہ بیٹھ سکتی ہے نیز پیشاب پانچا نہ رک جاتا ہے۔
(العلامات)

خراج رحم کی علامتیں :

رحم میں شدید کھنچاؤ اور بعض مذکورہ بالا علامات، بخار اور قشریہ یعنی لرزہ وغیرہ۔

قروح رحم :

رحم میں جب زخم ہوتا ہے تو درد زخم کی جگہ ہوتا ہے اور رحم سے مختلف رنگوں اور بوؤں کی رطوبت خارج ہوتی ہے اور قوت زائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جسم لاغر ہو جاتا ہے، مستقل بخار رہتا ہے، ادویہ مرخیہ کے استعمال سے نقصان اور ادویہ قابض سے فائدہ ہوتا ہے، جب زخم نم رحم میں ہوتا ہے تو درد بہت تیز ہوتا ہے۔ جب زخم گندا ہوتا ہے تو اس سے بہنے والی رطوبتیں خراب اور بدبودار ہوتی ہیں اور درد بہت تیز ہوتا ہے اس کے برخلاف اگر زخم جب صاف ہوتا ہے تو رطوبات بدبودار نہیں ہوتیں اور درد بھی نسبتاً ہلکا ہوتا ہے۔

نفخ رحم کی علامات :

زیریں شکم کے ورم کی صورت میں صوت طبلی، مروڑ، گڑگڑاہٹ، قراقر جیسی علامات موجود ہوتی ہیں جن میں گرم چیزوں کی سنکائی سے آرام ملتا ہے۔ جبکہ ٹھنڈک پہنچانے سے قراقر

شکم بڑھ جاتا ہے اور ریاح کو تحریک ملتی ہے۔ کسی کسی صورت میں یہ نفع (اچھا رہ) تا حیات باقی رہتا ہے۔

رحم میں منی جانے سے یہ اچھا رہ تھوڑی دیر کے لئے تحلیل ہو جاتا ہے اور ورم ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی رحم میں خدر ہوتا ہے اور مریضہ درد کی شدت سے جھک کر چلتی ہے ورم بلغنی میں درد نہیں ہوتا ہے۔

اسقیر وس یعنی ورم سوداوی کی علامت :

اسقیر وس کی صورت میں درد بالکل نہیں ہوتا البتہ جسم لاغر اور ضعیف ہو جاتا ہے اور شکم کی حالت مرض استقاء کی سی ہو جاتی ہے۔

ضعف رحم کی علامات :

ضعف رحم سے شہوت کی کمی کثرت طمث اور استقرار حمل نیز منی کو اندر روکنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ فم رحم میں رکاوٹ یا تو کسی زخم کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں زائد گوشت آ جاتا ہے یا پھر اندرون رحم اس کا سبب ہوتا ہے جیسا کہ رحم میں آمادگی نہیں رہ جاتی۔ استقرار یا حمل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اتفاقاً حمل قرار پا جائے تو بچہ کی ولادت کے وقت موت ہو جاتی ہے کیونکہ بچہ باہر خارج نہیں ہو پاتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رحم میں ذکر جیسی کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے جس میں سختی ہوتی ہے اور جو باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے جس سے مجامعت میں رکاوٹ ہوتی ہے کبھی تنوء رحم کی شکایت ہو جاتی ہے جس سے کوئی چیز فرج سے باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے اس سے پیڑ و اور ریڑھ اور مقعد میں شدید درد ہوتا ہے اور پیڑ و میں ایک گول سی سوجن ہو جاتی ہے۔ (العلامات)

نفاس کی حالت میں ورم رحم کی وجہ سے واقع ہونے والا دوسرے میں یا فوخ (چند یا) میں ہوتا ہے اور رحم کے دیگر تمام درد کو کولھے تک آٹھ یا دس مہینے تک رہتے ہیں۔ (ابیدیمیا۔ باب چھ، جز اول)

سرپستان (جو پستان میں سرخ مقام ہوتا ہے) کے زرد ہو جانے کا مطلب بدن میں خون کی کمی ہے۔ غلیظ غذائیں مثلاً جاؤرس وغیرہ خون کو گاڑھا اور مشکل سے جاری ہونے والا بناتی ہیں۔

(ابیدیمیا۔ باب چھ، جز پانچ)

اگر سیلان خون امتلاء سے ہو تو مریضہ کا رنگ اور اس کے بدن کا ممتلی ہونا اور نبض کی تڑپ اس کی علامت ہونگے اور جب بدن سے خون نکل جائے گا تو راحت ملے گی لیکن ضعف رحم میں خون روکنے پر قدرت نہیں ہوتی اس کی علامت صفاء خون یا اس کی حدت و لطافت ہے۔ اس صورت میں خون میں تیزی اور سوزش ہوتی ہے اور آن واحد میں جلدی سے خارج ہوتا ہے اور اس کا سبب عروق کا کھلنا ہوتا ہے کہ خون صاف اور بغیر درد کے خارج ہو۔ (اھرن)

اس کے اور ضعف رحم کے مابین علامت فارقہ یہ ہے کہ قرحہ رحم کی وجہ سے ہونے والا سیلان درد اور پیپ کے ساتھ ہوتا ہے اور خراب آکلہ کی وجہ سے ہونے والے سیلان میں ردی اور بدبودار سوداء خارج ہوتا ہے۔ (مؤلف)

خون کا رنگ اسی اعتبار سے ہوتا ہے جس اعتبار سے جسم پر غلیظ رطوبتوں کا غلبہ ہوتا ہے اس کا امتحان اس طرح کریں کہ عورت باریک روئی کا فرزجہ (Vaginal Pad) رات میں رکھے پھر اسے سائے میں سکھائے اس طرح اگر فرزجہ میں مائیت غالب ہو تو غلبہ بلغم کی دلیل ہے، اگر سرخی پائی جائے تو امتلاء و کثرت خون کی دلیل ہے۔ اگر زردی مائل ہے تو صفراء اور اگر سیاہی یا سبزی ہے تو غلبہ سوداء کی دلیل ہے۔ لہذا دونوں صورت میں اسہال کے ذریعہ علاج کیا جائے جب کہ دموی کی صورت میں فصد کے ذریعہ علاج کیا جائے۔ (اھرن)

بلغمی کی صورت میں مسہل بلغم کے ذریعہ علاج کیا جائے۔ (مؤلف)

فم رحم میں کبھی سوجن کے ساتھ کھلبلی بھی واقع ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے شہوت ہو جاتی ہے جیسا کہ شہوت کے وقت سرزک شہوت کی وجہ سے پھول جاتا ہے۔ اس کا علاج پہلے اگر اکحل کی فصد پھر رگ صافن کی فصد ہے مرہ اور بلغم کا اسہال ہے اور منی کو جلانے والی دوائیں جیسے مولی، سداب، پودینہ اور زیرہ نیز ملطف رحم دوائیں جیسے اقا قیا، گلاب، صندل، ہمراہ سرکہ اور روغن گل ہیں۔ (اھرن)

رحم کے گرم اور ام:

اس میں شدید حرارت، کمر اور رحم کے مقام میں بوجھ ہوتا ہے اور جمی خارہ کے ساتھ ان مقامات میں انقباض ہوتا ہے۔ اگر ورم موخر رحم میں ہو تو اس کے ساتھ کمر کا درد اور قبض ہوتا ہے اور اگر مقدم رحم میں ہو تو زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ پیشاب بند ہو جاتا ہے اور ورم رحم کے ساتھ پیڑ و اور معدہ کے خراب ہونے کی شکایت ہوتی ہے۔ قے اور متلی کی تحریک ہوتی ہے کھانا ہضم

نہیں ہوتا۔ یہ ساری شکایات ہمیشہ قم رحم کے اشتراک سے ہوتی ہے لہذا اس کا علاج جہاں تک ممکن ہو فصد کے ذریعہ کیا جائے اور حسب قوت خون باہر نکالا جائے۔ اگر قوت ضعیف ہے تو کئی بار میں تھوڑا تھوڑا خون مختلف ایام میں نکالا جائے اگر حقنہ لبنیہ کیا جائے اور اندرون جسم ورم گرم میں نفع پہنچانے والی اشیاء جیسے آب کاسنج، عرق مکوء، وکاسنی اور مغز خیارشمبر وغیرہ دیا جائے اور خارجی طور پر مقام رحم پر اسفیوس، روغن گل یا برگ مکوء روغن گل کے اضافہ کے ساتھ بطور ضما درکھا جائے اور اتنی دیر تک رکھا جائے کہ ورم کی حدت اور سوزش کو سکون ہو جائے۔ نیز پونے سات گرام ایلوہ مغسول ہمراہ مکوء وخیارشمبر استعمال کیا جائے۔ جب ورم کی حدت کم ہو جائے اور باقی ماندہ ورم کو تحلیل کر دینا مقصود ہو تو میتھی اور کرنب دونوں کو جوش دیکر روغن سوسن میں ملا کر مرہم نما بنا لیا جائے اور مقام رحم پر بطور ضما د لگایا جائے اور روئی میں لگا کر بطور حمل بھی استعمال کرایا جائے اور سببخمین اشق، علك الانباط، کوز، جاو شیر، مفرد یا مرکب کی شکل میں استعمال کرایا جائے ساڑھے چار گرام یا نو گرام بقدر قوت پلایا جائے یا چاہیں تو بلخ کی چربی یا مرغ کی چربی یا دھن سوسن کے ساتھ حمل کرایا جائے اور روغن ارنڈ ساڑھے گرام سے ۱۸ گرام تک ہمراہ میتھی و خار خشک کے ساتھ تیار کیا گیا ماء الاصول پلایا جائے۔

نسخہ ضما د جس کا طلاء نہیں بلکہ حمل کیا جاتا ہے:

موم کو روغن سوسن میں حل کریں اور بلخ کی چربی ملائیں پھر مر اور لعاب میتھی کو شراب میں کھل کر کے سب کو اچھی طرح ملائیں پھر ضما د کریں یہ بہت عمدہ نسخہ ثابت ہوتا ہے۔

نسخہ دیگر برائے ضما د جو ورم حار کی ابتدا میں کام آتا ہے:

قیروطی، موم، روغن گل، عرق مکوء وکاسنی میں حل کر کے باقلا، جو کا آٹا اور انڈے کی زردی ملا لیں اور پھر بطور ضما د استعمال کریں۔

سیلان کو روکنے کے لئے:

پھنکری پونے دو گرام، افیون پانچ گرام، اجوائن اور گلنار پونے دو گرام۔ حمل کے لئے مردار سنگ، پھنکری، سرمہ، اور قابضات۔

سرکہ بھی قاطع طمٹ ہوتا ہے اور اسی طرح کافور بھی۔ اور اگر حرارت اور بخار کے ساتھ سیلان کی شکایت ہو تو روزانہ قرص طباشیر قابض بارد پانی کے ساتھ کھلائیں اور معدنیات کا

استعمال کرائیں اور اگر آکلہ کی وجہ سے سیلان طول پکڑ جائے تو مردار سنگ، سرمہ، شادند، سفیداج، گل مختوم وارمنی کا حمل کرائیں اور اگر سیلان بسبب امتلا ہو تو فصد کریں اور پٹی باندھیں۔ (اُھرن)

اگر نطفہ دم شدید ہو تو دونوں چھاتیوں، بازو، رانوں اور جنگا سوں کو کس کر باندھ دیا جائے اور برف سے ٹھنڈا کر کے پانی اور سرکہ پلایا جائے۔ ٹھنڈی چیزوں کا کمر اور پیٹ پر لپ کیا جائے اور گلنار، حفص، انگور قام اور زراوند پلایا جائے۔ اور فتق کی صورت میں استعمال ہونے والے ضما د اور فرزجے استعمال کئے جائیں جیسے عفص، کندر اور قرظ کے فرزجے اور مریضہ کو قابض چیزوں کے جو شاندرے میں بٹھایا جائے۔

کبھی عورت کو ایسے سیلان رحم کا عارضہ ہوتا ہے جس میں پورے جسم سے رطوبت کھینچ کے آتی ہے۔

اس رطوبت کا رنگ خلط غالب کا ہوتا ہے۔ اگر خون کا غلبہ ہوگا تو رطوبت کا رنگ گوشت کے پانی جیسا ہوگا اگر صفراء کا غلبہ ہوگا تو رطوبت پر زردی غالب ہوگی اور کبھی کبھی صاف خون بھی نکلتا ہے لہذا مقوی بدن اور مجفف چیزوں سے علاج کیا جائے، پورے جسم کی مالش کی جائے۔ شہد سے بنے ہوئے لطفوخ جسم پر لگائے جائیں اور پیشاب آوردائیں دی جائیں اور اگر رطوبت سیال ہو تو اسہال مائی کرایا جائے۔ رطوبت سرخ ہو تو فصد کریں اور نطفہ دم کا علاج کریں۔ اس میں خرگوش اور دوسرے جانوروں کا پنیر مایہ مفید ہوتا ہے۔ اگر سیلان رحم باری کے ساتھ ہوتا ہو تو حالت وقفہ میں علاج کیا جائے اور باری کے وقت سکنت دیئے جائیں۔ دلک، ریاضت، مدر، بول، مسہل کے ذریعہ علاج کیا جائے اور دھوپ میں بٹھایا جائے اور استقاء میں کام آنے والے ضما د لگائے جائیں قئے اور خشک حمام کرائے جائیں۔

رحم میں ورم حار عارض ہونے کے دوسرے بھی بہت سے اسباب ہیں جیسے چوٹ لگنا، احتباس دم، ولادت اور اس کے ساتھ میں بخار۔ آنکھوں اور گردن کے اعصاب میں بھاری پن، معدہ کی خرابی اور نفم رحم کا چپک جانا۔ ایسی صورت میں ولادت کے بعد شدید ٹیس ہوتی ہے۔ کبھی در رحم کے کسی ایک حصے میں ہوتا ہے اگر موخر جانب ہوتا ہے تو درد کمر، احتباس براز کی شکایت ہو جاتی ہے اور اگر آگے جانب ہوتا ہے تو احتباس بول، عسر البول اور درد پیڑ کی شکایت ہوتی ہے۔ اگر جوانب رحم میں ہوتا ہے تو جنگا سوں میں تناؤ اور رانوں میں بھاری پن ہوتا ہے۔ اگر رحم کے زیریں حصہ میں ہوتا ہے تو اکثر درد ناف کے مقام پر ہوتا ہے۔ اور اگر نفم

رحم کے قریب ہوتا ہے تو اسہال کے ساتھ درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پیڑ وا اور ریڑھ پر شراب اور روغن گل نیم گرم کا نطول کیا جائے، شراب خالص پلائی جائے اور مقام درد پر لگائی بھی جائے۔ تین دن کچھ نہ کھلائیں بلکہ لطیف غذا سے غذائیت پہنچائیں۔ عمل فصد کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔

میتھی، تخم کتاں، تخم عطمی، برنجاسف کے جوشاندہ میں مریضہ کو بٹھائیں اور ملین چیزوں کا حمل کرائیں بشرطیکہ ورم میں الٹہابی کیفیت پیدا نہ ہو جائے اگر ایسا ہو تو پھر ایسا نہ کریں اور روغن گل نیم گرم شیریں پانی میں ڈالکر مریضہ کو اس کے اندر بٹھائیں اس پانی کو رحم میں پہنچائیں۔ اگر حرارت بھی ہو تو روغن سوسن اور مقل وغیرہ فائدہ مند ہیں۔ اگر درد شدید ہو تو افیون خالص ملا کر حمل کرائیں اگر سخت ورم ہو تو داخلیون اور باسلیقون کا حمل کریں۔ اگر یہ مادہ جمع ہو گیا تو اس کی علامت اعراض کا شدت اختیار کرنا اور لرزہ ہونا ہے اگر مادہ استحکام پڑ لے تو بخار ہلکا اور درد قدرے کم ہو جائے گا۔ ورم کے پھوٹنے کا وقت اگر گزر گیا تو درد بڑھ جائے گا اور اس میں سوزش چھین ہوگی۔ بخار شدید تکلیف کے ساتھ اپنے اوقات کے مطابق آئے گا۔ بول و براز رک جائیں گے۔ انگلی ڈالنے پر ورم محسوس ہوگا ایسے موقع پر پھوڑے کو فوراً پھوڑنے کی تدبیر کریں جس کے لئے دیلا کو پکانے والے ضما د جیسے انجیر، کبوتر کی بیٹ اور رائی وغیرہ نیز پانی کا بکثرت استعمال اور اس میں بیٹھنا اور فرز جات وغیرہ کا استعمال۔

جب پھوٹنے کا وقت قریب آ جائے تو بہنے تک انتظار کریں اور اس پر نظر رکھیں اور بہنے میں اس کی مدد کریں۔ سیان مثانہ کی طرف ہو تو مدر بول چیزوں کا استعمال کرائیں۔ اور اگر مقعد کی جانب پھوٹا ہو تو مسور اور پوست انار کے جوشاندے کا استعمال کرائیں۔ اگر رحم کے جانب پھوٹے تو روغن گل اور سفید موم سے حقنہ کریں اور روغن زیتون یا روغن جمبلی یا باسلیقون سے اس کو پھاڑ دیں۔ اگر رحم سے بہنے والی رطوبت متعفن ہو تو کسی کبھٹی کیسی چیزوں سے حقنہ کرائیں اگر ورم تحلیل نہ ہو رہا ہو تو پوری کوشش کریں کیونکہ اگر تاخیر کی گئی تو اس میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے لہذا پھوڑنے والی اشیا سے حقنہ کریں اور کبھی کبھی متعفن مقام پر نشتر لگایا جاتا ہے۔

رحم کا تعفن زیادہ تر عسر ولادت سے، ردی خون سے یا گندے پھوڑے سے ہوتا ہے۔ عفونت رحم کی پہچان اس سے بہنے والی رطوبت سے ہوتی ہے اگر رحم میں طفوننت موجود ہوگی تو رطوبت بدبودار ہوگی اور اگر تعفن کم ہے تو زخم گند نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ تعفن، درد اور

بخار باعتبار تائکل اور حرارت ہوا کرتا ہے۔

نرم کرنے والے دواؤں سے ہیجان پیدا ہوتا ہے اور قابض دواؤں سے سکون ملتا ہے اگر زخم کے ساتھ ورم جار ہو تو ورم کا علاج کریں اگر خارج ہونے والی رطوبت گندی اور غلیظ ہو تو ماء العسل اور ماء الشعیر کا فرزجہ رکھیں۔ نیز آرد کر سنہ و ایرسا وغیرہ جیسی چیزوں سے گوشت پیدا ہوتا ہے لہذا ان سے حقنہ اور حمل کریں نیز لسان الحمل، عصی الراعی اور آب کاسنی سے حقنہ کریں لیکن اگر نہ ورم ہو نہ درد ہو تو اشیاء قابضہ جیسے انار کی چھال، سرو، سفرجل، حب الّاس، اذخر کا جوشاندہ ڈالیں یا حمل کریں جس میں پکنے کے بعد کیلی شراب اور آخیر میں شب یمانی اور قرظ ڈالا گیا ہو۔ اگر اس سے صحت یابی نہ ہو تو کاوی دوائیں ڈالیں جیسے سرکہ اور پانی اس کے بعد صرف سرکہ حتی کہ زخم جب صاف ہو جائے تو مریضہ کو حمام کرنے کے لئے کہیں اور مختلف قسم کی غذاؤں کا مشورہ دیں اور شراب پلائیں تاکہ جلد گوشت آجائے اور زخم بھر جائے اور پیڑ و اور اس کے ارد گرد گوشت لانے والی دوائیں رکھیں (کیونکہ پیڑ کی قوت اندرون مجاری چھپی ہوتی ہے) یہ دوائیں اقلیمیا، صبر، کندر، اور اسی طرح کی دوسری اشیاء ہیں۔ (بولس)

سرطان:

سرطان رحم ایک سخت قسم کا ورم ہوتا ہے جس کی جڑ پتھر جیسی سخت ہوتی ہے، سرخی مائل ہوتی ہے اور نفم رحم میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے جنگا سوں میں شکم کے زیریں حصہ، پیڑ و اور ریڑھ میں شدید درد ہوتا ہے جس کو ہاتھ سے چھونا بھی گراں گذرتا ہے۔ ساتھ یہ متعفن ہوتا ہے تو اس سے زرد آب بہتا ہے اور ورم حار کے تمام اعراض لاحق ہوتے ہیں اور اس کا کوئی شافی علاج نہیں ہے۔ لیکن میتھی، خبازی کے جوشاندہ میں بیٹھنے سے درد کم ہو جاتا ہے اور مرخی ضادوں سے اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے۔

کزبرہ، افیون، زعفران، اکلیل الملک اور بطخ کی چربی سے تیار شدہ ضاد مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح میخ، انڈے کی زردی، زعفران، اجوائن (بنج)، روغن گل، موم اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا ضاد بھی اس کے لئے بنایا جاتا ہے اور خارجی طور پر لگایا جاتا ہے۔ اندرونی درد کو بھی اس کے حقنہ سے سکون ملتا ہے۔ نیز دودھ اور عصارہ لسان الحمل کے حقنہ سے بھی درد کو سکون ملتا ہے۔

قاطع دم ادویہ:

لسان الحمل، کندر، گل مختوم۔

مسکن درد:

زعفران، نشاستہ اور افیون کا شافہ اور عورت کے دودھ کا حقنہ۔ حریف چیزوں اور زیادہ کھانوں سے پرہیز کیونکہ ایسی مریضہ کے پیٹ میں کھانا جلدی خراب ہوتا ہے۔ سقیروس یعنی ورم حارم کے بعد ہونے والا ورم صلب اکثر فم رحم میں پیدا ہوتا ہے۔ سرطان کی طرح یہ بھی متحجر ہوتا ہے لیکن اس کا درد ہلکا ہوتا ہے اس سے عورت کو کمزوری بہت ہوتی ہے۔ پنڈلیوں اور سارے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے اور کبھی کبھی مرض استسقاء بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ لہذا مرض میں اس کا علاج رگوں کی فصد کھولنا، اسہال، ملین ضمادات، محلل اشیاء فرز جات اور نظرون آمیز گرم پانی سے کیا جاتا ہے۔

رجاء (حمل کا ذب):

یہ سخت قسم کا گوشت رحم کے اندر ہوتا ہے جو بالائی اعضاء پر اثر انداز ہو کر انھیں بوجھل بنا دیتا ہے دونوں پیر کمزور ہو جاتے ہیں اور سارا جسم دبلا ہو جاتا ہے کھانے کی خواہش جاتی رہتی ہے اور خون حیض رک جاتا ہے۔ چھاتیاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ جس کو دیکھنے سے عورت کو حاملہ ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے جیسے اسے استسقاء کا مرض ہو لیکن استسقاء اور اس کے درمیان علامت فارقہ یہ ہے کہ امتحان کرنے پر استسقاء کی طرح اس میں آواز نہیں آتی یہ مرض جلدی اچھا ہونے کا نام نہیں لیتا۔ بسا اوقات بعض مریضاؤں کو حیض بھی جاری ہوتا ہے۔

اس کا علاج یہ ہے کہ مریضہ کو ایک چھوٹے تاریک مکان میں جس میں کسی قدر ٹھنڈک ہو چار پائی پر لٹا دیا جائے اور حرکت سے بعض رکھا جائے کیونکہ حرکت سیلان مواد کا موجب بنے گی۔ چار پائی کو پاؤں کی طرف سے اونچا رکھا جائے اور اورام جاسیہ (سخت اورام) کے اصول پر علاج کیا جائے اور مرخیات دیئے جائیں تاکہ مواد تحلیل ہو کر جلد خارج ہو جائے۔ (بولس)

نفخ رحم:

نفخ رحم کا سبب اسقاط، نزف، عسر ولادت یا فم رحم کا بند ہو جانا یا خون کا جامد ہو جانا

ہوتا ہے بسا اوقات ریا ح جوف رحم میں ہوتی ہے اور کبھی اس کے طبقات میں موجود ہوتی ہے جس سے پیڑ و اور زیریں شکم میں ورم پیدا ہو جاتا ہے اور دوجع ناخس، چھین والا درد، حجاب حاجز، معدہ، فم معدہ، اور جنگا سوں کے نیچے تک پھیل جاتا ہے۔ امتحان بالقرع کرنے پر مقام ماؤف سے صورت طبعی سنائی دیتی ہے۔

پہلے اسکا علاج فصد سے کیا جائے اور درد کی باری کے اوقات میں کھانے سے روک دیا جائے روغن سداب سے نطول کیا جائے۔

سداب، پودینہ، برنجاسف، سلینہ وغیرہ کے جوشاندہ میں مریضہ کو بٹھایا جائے تخم کرفس، زیرہ، اجوائن دیسی سے تیار کر کے ضماد لگایا جائے۔ سینگیہاں پچھنے کے ساتھ اور پچھنے کے بغیر لگائی جائیں۔ اگر مرض مزمن ہو تو فیکر ایا ایا رجا رکا غانیس سے اسہال کرایا جائے اور ضماد سرخ اور حار حقنہ کرایا جائے۔ اور لیڈی ڈاکٹر اپنی انگلی میں روغن سوسن لگا کر فم رحم کے اندر داخل کر کے وہاں منجمد خون کو صاف کر دے۔ نظرون، افسنین، حب الغار کا ضماد استعمال کیا جائے اور کاسر ریا ح تخمیات کے فرز جے بطور حمل استعمال کئے جائیں اس سے نطول رحم ٹھیک ہو جاتا اور رحم اپنی اصل جگہ واپس آ جاتا ہے۔

اگر رحم کے کسی حصہ میں تعفن پیدا ہو جائے تو اسے کاٹ کر نکال دینا چاہئے اس عمل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رحم کاٹ کر نکال دینے سے عورت مرقی نہیں ہے۔

رحم کا بند ہو جانا:

کبھی رحم یعنی فم رحم سخت ورم سے یا ورم رحم کے بعد یا اس کی ابتداء میں بند ہو جاتا ہے اس کا علاج ملین پانیوں سے نیز روغن اور پانی سے اور میتھی کے جوشاندہ سے کیا جاتا ہے اور اسی طرح کی اشیاء کا ضماد کیا جاتا ہے۔ جیسے مقل، بطخ کی چربی اور ہڈیوں کے گودے وغیرہ سے بنائے ہوئے ملین فرز جے استعمال کئے جاتے ہیں اور اگر یہ مرض پرانا ہو جائے تو خوشبودار دواؤں (افاویہ) کی دھونی دی جاتی ہے۔

فم رحم بند ہو جانے میں مستعمل فرز جہ کا ایک نسخہ:

زوقا، نظرون، علك البطم، اس فرز جہ سے بہت جلد منہ کھل جاتا ہے۔

شفاق رحم شروع میں چھپا رہتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ظاہر ہوتا ہے یہاں تک کہ چھوٹنے پر اور جماع کے وقت خون بھی نکلتا ہے۔ اگر فرج کو کشادہ کر کے دیکھا جائے تو شفاق

دکھائی بھی دیتا ہے۔ اس طرح کے مرض میں لاذع دواؤں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ ملین پانی اور فرزجہ استعمال کریں۔ باسلیقون کو روغن گل میں تر کر کے اس کے اندر ڈالنا موزوں ہوتا ہے اگر شقاق سے زخم پڑ گئے ہوں تو اسفیداج استعمال کریں۔

نواصیر:

کبھی رحم میں نواصیر بھی ہو جاتی ہے جو نم رحم کو کھولنے پر نظر آتی ہے۔ درد کی شدت کے وقت ان میں خون کی طرح سرخی ہوتی ہے اور سکون کے وقت اس میں سے تلچھٹ کی مانند سیاہ رطوبت بہتی ہے لہذا اس کا باقاعدہ علاج کیا جائے اور راحت کے اوقات میں قالب (آلہ) سے پکڑ کر کاٹا جائے اور ان پر قابض دوائیں ڈالی جائیں جو ان کو مندل کر دیں یا ان سے رطوبت کا بہاؤ روک دیں، یاد رہے کہ ایسا بہاؤ کبھی بوا سیری بھی ہوتا ہے۔ (بولس)

اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ (مؤلف)

نزف کو ٹھیک کرنے کے لئے ساڑھے تین گرام کبریت باریک پسی ہوئی ہمراہ شراب طلاء نہار منہ پلائیں دو پہر تک کچھ نہ کھلائیں پلائیں پھر شور بہ اسفیز باج پلائیں تین دن ایسا کرنے سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ (طیب یا معلوم)

حمل نہ ہونے کی صورت میں نفخ بطن کا علاج:

فصد کھولیں، اسہال کرائیں، محلل ریاح دوائیں پلائیں۔ اس کیلئے ایارجات کا استعمال بہتر ہوتا ہے۔

رحم پر جند بیدستر اور محلل ریاح تخمیات جیسے ہینگ، انجدان، زیرہ وغیرہ کا ضاد کرائیں۔ رحم پر سینگی اور پچھنے لگا کر خون خارج کریں۔ (شمعون)

پتلا خون زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑھا خون رحم میں جمع ہو رہا ہے جس سے صلابت، دبیلہ یا سرطان ہو سکتا ہے۔ صلابت کا علاج ہڈی کے گودے اور رونیات سے کیا جائے۔ مثلاً روغن شبت، روغن سوسن، روغن نرگس، روغن ارنڈ، روغن بابونہ، میتھی، بطخ کی چربی، پچھڑے کی ہڈی کا گودا اور مقل وغیرہ۔ دبیلہ کے علاج دیگر دیلات کے اصول پر کیا جائے۔ سرطان کا علاج نرم مرہموں سے کیا جائے۔ اگر درد زیادہ ہو تو ایک بار گرم اور دوسری بار بارد بخور سے سکون پہنچایا جائے، اور فصد کھولی جائے لطیف اور مرطوب غذائیں جو مولد

سوداء نہ ہوں کھلائیں۔ اگر مریضہ کے چہرے پر کثرت نطفہ سے تنہج ہو گیا ہو تو جب نطفہ رک جائے تو انڈے کی زردی، اونٹ کے بچے کا گوشت، کباب اور کھجی کھلائیں اور تازہ گاڑھی میتھی شراب پلائیں اور تر حلوہ کھلائیں اس سے جسم میں زیادہ خون پیدا ہوگا اور مریضہ عورت اپنی پرانی طبعی حالت پر آجائے گی۔ پرانی شراب نہ پلائیں جو سیلان خون کا محرک بنے۔ البتہ تازہ شہد کی بنڈ لیں۔ مریضہ میں تولید خون کے لئے عمدہ و بہتر ثابت ہوگی اور بوا سیر والے اصحاب کے لئے یہی تدبیر کریں۔ (الاختصارات)

سیلان خون روکنے کے لئے قرص بسد کا نسخہ:

اجوائن خراسانی، کندر، آٹھ آٹھ، گل ارمنی، بسد، گیر، افیون ہر ایک چودہ گرام، کبریا، گلنار ہر ایک سات گرام۔ سب سفوف کر کے عصارہ بارتنگ میں گوند کر اس سے مکھیہ بنالیں۔ (بولس)

لطف اور طلاء کرنے والی دوائیں کبھی قاطع طمٹ ہوتی ہیں۔ خاص طور سے گائے کی کھال کا سریشم، اس میں سے تھوڑا صاف ستھرا حصہ لے کر پانی ملے سرکہ میں حل کر کے سوتی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لتھیڑ کر ناف پر چپکا دیں، میں نے اپنے تجربے میں اس کو قوی ترین ضاد پایا ہے۔ (اور بیاسیوس)

خون حیض روکنے کے لئے ہاتھوں اور پیروں کو سخت کپڑے سے باندھ دینا چاہئے اور شکم پر سرکہ پر بھگویا ہوا کپڑا رکھ دینا چاہئے پھر مازو، شراب، کندر کے آٹے سے تیار کئے ہوئے شیاف کا حمول کرنا چاہئے۔ اور عورت کو ٹھنڈا پانی پلانا چاہئے۔ اگر اس تدبیر سے نہ رکے تو چھاتیوں میں سنگھیاں (محاجم) لگانا چاہئے، ضروری ہے کہ محرق دواؤں سے حمول نہ کریں کیونکہ اس جگہ اعصاب ہوتے ہیں۔ (میسوس)

در و رحم کے اسباب:

ورم و حبساء، سرطان، سقیروس، دبیلہ، گوشت خورہ، ریاح، سل، انقلاب، انسداد، مہاسے، مے، سیلان خون، شقاق، خراج، عرق رحم سے جنین کی نال تک آنے والا گوشت، رتق رحم، رحم کا جگہ سے ہٹ جانا، خلع، اختناق، سیلان منی، رحم کا اوپر اٹھنا، نم رحم کا کھل جانا اور احتباس طمٹ۔

رحم کے گرم اور ام کی علامات :

لرزہ کے ساتھ حمیات حادہ اور اگر ورم پورے رحم میں ہے تو ناف کے مقام میں درد اور اگر ورم رحم کے کسی ایک طبقہ میں ہے تو جنگا سے ران اور ماؤف جانب کی پنڈلی میں درد ہوگا، فم رحم میں ورم ہوگا تو مریضہ درد کو دانی کی انگلی کے نیچے محسوس کرے گی۔

علاج :

عورت کو کم سونے اور کم کھانے کی تاکید کریں اور تین دن تک معتدل شربت جو غشیان میں نافع ہوں پلائیں اور ہلکی غذائیں کھلائیں اس کے بعد پہلے فصد کھولیں پھر بستہ مواد نکالنے کے لئے حقنہ کریں اس کے بعد میتھی، خیار، تخم کتاں کے جوشاندہ میں بٹھائیں۔ خشخاش، اکیل الملک، خیار، تخم کتان کا ضماد بنا کر لگائیں یا خشخاش، اکیل الملک، اور آب شہد کا ضماد لگائیں۔ جب ورم کم ہو جائے تو بٹخ کی چربی، گھی، بارہ سنگھا کی ہڈی کا گودایا اور روغن سوسن کا شافہ بنا کر رکھیں تاکہ وہاں سقیر وس باقی نہ رہے۔ رحم کی سختی کا علاج ملین پانیوں سے کریں اور ان ضادوں سے کریں جو روغن حنا، بٹخ کی چربی، بارہ سنگھا کی گودے کی ہڈی، مقل، آرد حلبہ و تخم کتاں سے تیار کئے گئے ہوں۔

سقیر وس کی علامت :

یہ سخت ورم ہے جو اچھا نہیں ہوتا۔ یہ صرف عورت کو ہوتا ہے اور اسکی علامت یہ ہے کہ رحم میں محسوس نہیں ہوتا جبکہ ورم جاسیہ ظاہر ہوتا ہے اور اگر زیادہ مدت تک گزر جائے تو دونوں پیر اور دونوں پنڈلیاں سوج جاتی ہیں اور احتباس طمث ہو جاتا ہے۔ ورم حار کا مادہ جمع ہو کر دبیلہ بن جاتا ہے جس کے نتیجہ میں تیز بخار لرزہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر لرزہ نہ ہو تو پیپ نکلتی ہے۔ حرارت کی شدت اور ٹیس اس کی خاص پہچان ہے۔ لہذا مریضہ کو برنجاسف، مرزنجوش، فراسیون، میتھی، خیار، تخم کتاں کے جوشاندہ میں بٹھائیں اور داخلیوں کا حمل کرائیں تاکہ پیپ جلدی خارج ہو۔ جب درد اور بخار کو سکون ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپ پوری نکل گئی اب دبیلہ کو خشک کرنے کے لئے انجیر، چربی، موم، مر، روغن سوسن اور روغن حنا ۳۵ گرام کا استعمال کرائیں۔ کمر پر میتھی اور گیہوں اور تخم کتاں کے سفوف کا ضماد کریں۔ اس میں رات بچ، علق البطم، برنجاسف، مشطرا مشیع، فراسیون مرزنجوش، نظرون، شہد، روغن زیتون بھی ملا لیں۔ جب دبیلہ پھوٹ جائے تو رحم کے اندر حقنہ سے ماؤ العسل پہنچائیں تاکہ جلد تنقیہ

ہو جائے اگر پیپ غلیظ اور بدبودار ہو تو ماء العسل کے کئی بار تنقیہ کریں جب پیپ کا آنا کم ہو جائے تو زخم بھرنے کی تدبیر کریں۔ مریضہ کو قابض پانیوں میں بٹھائیں اور مرحم سرخ، اور مرحم سفید اج کا حمل کرائیں۔ دہیلہ پھوٹنے کے بعد مد رجیض اشیاء دے سکتے ہیں کیونکہ اس سے تنقیہ ہوتا ہے۔ مثلاً جڑوں کا جوشاندہ پھوٹنے سے پہلے اس کا استعمال بالکل ممنوع ہے کیونکہ اس سے ورم بڑھ جاتا ہے۔

سرطان: (رحمی کی علامات)

سخت ورم ہے جسے ورم جاسیہ کہتے ہیں اگر قریبی حصہ میں نہیں ہوتا تو آگے کا حصہ سوکھا ہوا نظر آتا ہے اس میں پیپ موجود ہو یا نہ ہو۔ نکلی کی چھن جیسا درد ہوتا ہے۔ اگر پیپ ہوتی ہے تو اس سے بدبودار رقیق زرد آب نکلتا ہے۔

علاج:

مسور کا جوشاندہ، گدھی کا دودھ، اور آب لسان الحمل کا حقنہ کرنے سے درد میں تسکین ہوتی ہے۔ اسی طرح لعاب اسپغول، مکوء اور اجوائن خراسانی بے فائدہ ہوتا ہے۔

آکلہ: (آکلہ (گوشت خورہ) اور سرطان (کینسر) میں فرق):

سرطان میں ٹیس مستقل ہوتی ہے اور آکلہ میں کبھی سکون بھی ہوتا ہے۔ آکلہ کی مدت طویل نہیں ہوتی اور سرطان کی مدت طویل ہوتی ہے۔

نفخ: (رحمی کی علامات):

پیڑ وکا ابھار اور درد کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔

علاج:

پیڑ و کے مقام پر ناری، کچھنے اور مبرد ریاح ضما د لگائیں۔ مثلاً جکو سداب، زیرہ، قنطاریون، برنجاسف وغیرہ سے بنایا گیا ہو اور اذخر، چراستہ، برنجاسف اور اکلیل الملک کے جوشاندہ میں بٹھائیں۔ سنبل، مرزنجوش، شگوفہ اذخر، عود بلساں، چراستہ، قسط اور زعفران کا حمل کرائیں اس کے بعد روغن ناردین و رازیقی کا استعمال کریں۔

رحم کا مستقل رسنا:

پہلے فراسیون یا ایرسا اور کرسنہ کے جوشاندے کو رحم کے اندر حقنہ سے پہنچائیں پھر پوست انار، آس اور اذخر جیسی بکھٹی اشیاء کا جوشاندہ استعمال کریں اور اسہال کے ذریعہ پورے جسم کا تنقیہ کریں۔ مریضہ کے ہاتھوں اور پیروں کی روغن اذخر، عاقر قرحا اور فلفل سے مالش کریں۔ یہ عمل رنے والی رطوبت کو جذب کر لے گا اور شفا حاصل ہو جائے گی۔

نتوء رحم کی علامات:

چھونے سے کوئی نرم چیز باہر نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے نرم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا اندورنی حصہ رباطات وغیرہ ٹوٹے بغیر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یا تو پیدائش کے وقت بچہ اچانک خارج ہونا ہے یا پھر دوڑنے اور کودنے سے یا مشیمہ کی سختی سے یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ شدید درد اور تیز بخار عارض ہوتے ہیں ایسی مریضہ کو حمام سے دور رکھیں نمکین چیزوں سے پرہیز کرائیں اور تمام مسخّنات سے بھی دور رکھیں۔ قابض اشیاء کا استعمال ضروری ہے اذخر، آس اور گلاب کے جوشاندہ میں بٹھائیں پھر نرمی کے ساتھ رحم کو اندر کر دیں اور ملائم گدی رکھ کر باندھ دیں۔ اس گدی کو اقا قیا کے پانی میں پہلے سے ڈبولیں، ناف پر پچھنہ لگائیں اور کچھ زیادہ دیر تک لگا کر اس پر چھوڑ دیں۔ ایسا کرنے سے رحم اوپر کھنچے گا اور دوبارہ نیچے نہیں گرے گا اور عورت کی حالت معمول پر آ جائے گی۔

بواسیر اور رحم کے مسے:

آئینوں کو تلے اوپر اس طرح رکھیں کہ یہ چیزیں دیکھی جاسکیں۔ اگر شدید درد ہو تو مرخی ادویہ کے جوشاندہ میں مریضہ کو بٹھائیں اور شیافات کے استعمال سے درد کو سکون پہنچائیں۔ اس کا باقاعدہ علاج یہ ہے کہ مسوں کو کاٹ دیا جائے اور کاٹ کر حالبس دم دوائیں لگا دی جائیں۔ جیسے پھنکری یا مازو کا سفوف چھڑکیں پھر زخم کا علاج مرحم توتیا سے کریں اگر رحم کی گہرائی میں اندر مسے ہوں تو ان کا کاٹنا عورت کے لئے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا اس عمل سے دور رہیں بلکہ اس کا علاج قابض پانیوں سے کیا جائے یہاں تک کہ سوکھ کر ختم ہو جائیں۔

بواسیر کا خون تکلیف کے ساتھ خارج ہوتا ہے اور خون حیض بغیر کسی درد کے اس صورت میں خارج ہوتا ہے جب کہ اس کی کثرت ہو۔ بواسیر کی شکایت میں جو خارج ہوتا ہے

وہ شرائین سے آتا ہے یا وریدوں سے، اگر رطوبت گہری سرخ ہے تو اس کا مخرج شرائین ہے اور اگر سیاہ ہے تو اس کا مخرج وریدیں ہیں اگر سیلان آکلہ سے ہوتا ہے تو تلچھٹ جیسا سیاہ خون درد اور چھین کے ساتھ آتا ہے۔

حیض اور بواسیر کے خون میں علامات فارقہ :

بواسیری خون مسلسل جاری نہیں رہتا یہ درد کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ خون حیض باریوں کی دوروں کی شکل میں جاری ہوتا ہے مسلسل آتا ہے اور بلا درد کے آتا ہے۔ عورت بواسیری خون جاری ہونے سے دہلی ہو جاتی ہے لیکن حیض سے کمزور نہیں ہوتی۔ جس عورت کو حیض آنا بند ہو جائے اس کو بواسیری خون جاری ہونے سے فائدہ ہوتا ہے۔

اگر بواسیر رحم کی گہرائی میں ہے تو اچھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ عضو مکمل طور سے عصبی ہوتا ہے تاہم اگر رحم میں ہو تو ٹھیک ہونے کا امکان ہوتا ہے عورت کی بواسیر کا علاج اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح مردوں کی بواسیر کا۔ مریضہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے دونوں پیر کچھ دیر کے لئے دیوار پر ٹکا کر رکھے پھر اس کی ریڑھ اور شکم پر قابض ضماد کریں اور قابض پانیوں میں بٹھائیں اگر اس تدبیر سے خون نہ رکے تو چھاتی اور ریڑھ پر کچھنے لگائیں اور طراہیٹ واقایا کے عصا رہ میں روئی کا ٹکڑا ڈبو کر مقام ماؤف پر رکھیں یہاں تک کہ زنف میں سکون ہو جائے پھر مرہم لگائیں۔

شقاق :

شقاق رحم جنین کے خارج ہونے یا ورم رحم کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے معائنہ کے لئے مریضہ کی شرم گاہ کے سامنے نیچے اوپر آئینے رکھے جائیں اس طرح شقاق یا پھٹا ہوا رحم نظر آجائے گا اگر شقاق اتنے قریب ہو کہ دوا لگائی جاسکے تو تو تیا کو انڈے کی زردی میں پیس کر لگائیں۔ اگر شقاق خاص جرم رحم میں ہو تو تانبہ کا برادہ یا مازو یا پھٹکری کا باریک سفوف مقام ماؤف پر لگانے سے شقاق ٹھیک ہو جاتا ہے۔

قروح (زخم) :

رحم میں زخم گرم فرزجوں سے یا حکہ رحم وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر زخم کے ساتھ ورم ہو تو ملین اشیاء سے علاج کریں، زخم پر زیادہ میل ہو تو آب شہد یا جو شانڈہ ایرسایا مرخی مرہم سے صاف کریں پھر زخم اگر گہرا ہو تو اسفیداج یا مردار سنگ اور روغن گل اور موم سے بنے

ہوئے مرہم سے زخم بھر دیں۔ جب زخم کچھ بھر جائے تو توتیا استعمال کریں تاکہ بحسن و خوبی مندمل ہو جائے۔

رتقاء (رحم کا بند ہو جانا):

رتقہ رحم یا تو پیدائشی ہوتا ہے یا زخموں کا علاج کرنے سے ہو جاتا ہے۔ شرم گاہ کو کھول کر معائنہ کرنے پر ایک عضلہ نما چیز شرم گاہ کے منہ کو ڈھانکے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ کبھی سامنے کے رخ پر ہوتا ہے اور کبھی فم رحم پر ہوتا ہے جب تک عورت کو حیض جاری نہیں ہوا ہے تب تک کوئی خطرہ کی بات نہیں ہوتی لیکن جب حیض جاری ہو کر بند ہو جاتا ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو مریضہ جلد ہی ہلاک ہو جاتی ہے کیونکہ پھر وہ خون اس کے بدن کی طرف لوٹ کر سیاہ ہو جاتا ہے اور اس سے اختناق عارض ہو جاتا ہے اور مریضہ مر جاتی ہے۔ اگر یہ زائد گوشت شرم گاہ کے منہ پر نکلا ہو تو اس مریضہ سے جماع نہیں کیا جاسکتا۔ نہ اس کو حیض آتا ہے اور نہ خواہش ہوتی ہے ہاں اگر فم رحم میں ہو تو قابل مجامعت ہوتی ہے لیکن حمل قرار نہیں پاتا۔ بسا اوقات یہ گوشت پورے مقام میں پھیلا ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سوراخ ہوتا ہے جس سے خون حیض خارج ہوتا ہے اور کبھی بالکل بند ہوتا ہے۔ خون و حیض خارج ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو ایسی حالت میں مریضہ اور جنین ہلاک ہو جاتے ہیں۔

علاج رتقہ:

اگر گوشت شرم گاہ کے منہ پر ابھرا ہوا ہو تو شفرتین (Labiae) پر دونوں جانب گدیاں رکھ کر شفرتین کو پھیلائیں یہاں تک کہ عضلہ یا گوشت باہر نکل کر ظاہر ہو جائے پھر اسے کاٹ کر اس پر روغن زیتون اور شراب میں روئی تر کر کے رکھ دیں تین دن کے بعد شہد و پانی میں بٹھائیں پھر مندمل کرنے کے لئے مرہم لگائیں۔ اگر اندر فم رحم کی گہرائی میں ہو تو صناعہ داخل کر کے شفرتین کھینچ کر پھیلا دیں اور مہضع نشتر سے گوشت کو چیر دیں پھر شراب عفص میں روئی تر کر کے اس جگہ رکھیں اور پھر خشک و مندمل کرنے والے مرہموں کو اندر تک پہنچائیں۔ جب ٹھیک ہو جائے تو جماع کریں۔

میلان رحم:

انگی داخل کرنے پر اگر فم رحم سیدھا محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ رحم کا میلان کسی جانب ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں انگی کو بطخ وغیرہ کی چربی میں لت کر کے اندر داخل کریں اور

جائے یا مٹانے کی طرف سیلان کا رخ ہو تو ملیں تخمیات سے علاج کریں حتیٰ کہ اس کی صفائی ہو جائے۔ اگر اس میں بدبودار اور گنداپیپ ہو تو قابض اشیاء اور گل ارمنی وغیرہ کا استعمال کرائیں۔

ورم رحم کو ٹھیک کرنے والی دوا:

میٹھی کو دھو کر پکائیں اور اس کے جھاگ نکال لیں اور پھر انکو مرغابی کی چربی میں ملا لیں اور ٹھنڈا کر کے روغن گل کے ساتھ اس کا حمول کریں اگر ٹیس نہ ہو تو روغن حنایا روغن سوسن میں ملا لیں اور جب گندے زخم ہوں تو رحم کے اندر اسفیداج، کندر، دم الاخوین وغیرہ بذریعہ حقنہ پہنچائیں۔

سرطان الرحم:

یہ کبھی قرحہ کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی بغیر قرحہ کے۔ اس کے ساتھ جنگا سے یا عانہ یا ریڑھ میں درد اور سوزش ہوتی ہے اور سخت ورم بھی موجود ہوتا ہے۔ عروق میں مرض دوا لی جیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کبھی دواؤں کے استعمال سے درد میں شدت آ جاتی ہے اگر قرحہ بھی ہو تو اس میں سے بدبودار سیاہ رطوبت مستقل بہتی رہتی ہے۔ اس صورت میں صرف میٹھی اور خطمی کے جو شانہ میں بیٹھنے سے سکون ملتا ہے اور مسکن ضداد جو خشخاش، کبر، مکوء اور روغن گل سے تیار کئے گئے ہوں لگائے جائیں۔ اگر خون کثرت سے خارج ہو تو اسفیداج، گل ارمنی اور اقا قیا کا استعمال کرنا چاہئے۔ (مؤلف)

سرطان رحمی میں رگ باسلیق کی فصد کھولیں، سوداء کا اسہال کرائیں لطیف اور مرطوب غذائیں پلائیں مسکن درد فتلہ رکھیں تاکہ درد کا امالہ ہو جائے اور اگر ضرورت ہو تو رگ صافن کی فصد کھولیں۔

خون حیض کی زیادتی:

خون حیض یا خون کی کثرت کی وجہ سے زیادہ خارج ہوتا ہے یا اس کی رقت سے زخم کے بعد ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں کمزوری اور فساد ہضم لاحق ہوتا ہے۔ اگر وجہ کثرت خون ہو تو فصد کھولیں اور مقام ماؤف کو تقویت دیں، اگر وجہ حدت خون سے ہو تو معتدل غذائیں کھلائیں اور کپڑے کا ٹکڑا اندر داخل کر کے دیکھیں اگر اس پر خون خالص کی علامت ہو تو اس کا استفراغ کریں۔ اگر صفاوی رطوبت کی علامت ملے تو صفا کا استفراغ کریں اور اگر ٹکڑا سیاہ

ملے تو سوداوی کا استفراغ کریں اگر پانی کی طرح سفید ملے تو مُسہل بلغم کے ذریعہ بلغم کا استفراغ کریں۔ اسہال ہونے کے بعد قابض اور مغزی دوائیں جیسے ایلو، کندر، دم الاخوین، کبرباء، نشاستہ، اسفیداج، گلنار، مازو وغیرہ استعمال کرائیں گل ارمنی، قرص گل، گل انار اور فلو نیا فارسی بھی مفید ہیں۔

فم رحم کی کھجلی کا مجرب نسخہ:

برگ پودینہ، پوست انار، عدس مقشر کو شراب میں پکا کر کپڑے میں لت کر کے حمل کریں عجیب النفع ہے۔ (مؤلف)

کسکلا وند نام کی بیماری غلیظ ریاہ اور رحم کی لیسیدار رطوبتوں سے ہوتی ہے جس سے نفخ شکم ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ بیماری ایک سال یا اس سے بھی زائد عرصہ تک رہتی ہے اور کبھی ولادت وغیرہ ہونے سے ریاہ اور رطوبات خارج ہو جاتی ہیں۔ کثرت سے خون نکلتا ہے کیونکہ اس دوران حیض بھی بند ہو چکا ہوتا ہے۔ پستانوں سے تھوڑا سا گندادودھ نکلتا ہے اس میں روغن کلکانج کو غازیہ کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ گرم تخمیات کے ساتھ ضاد کیا جاتا ہے اور شتر نایا پلایا جاتا ہے۔ ناری کچھنے مقام رحم پر لگائے جاتے ہیں اور ماء الاصول پلایا جاتا ہے۔

(یہودی)

خون طمث اگر آنتوں کی مشارکت سے ہو تو اس کو روکنے کے لئے ایسا دودھ پلائیں جس میں گرم لوہا بچھا کر ابالا گیا ہو۔ مقدار خوراک ۱۰۵ ملی لیٹر روزانہ ایک ہفتہ تک دیں۔ عجب النفع ہے۔ (مؤلف) ایک تجربہ۔

نسخہ قرص برائے نزف:

اقاقیا، گلنار، مازو، طراہیٹ، سماق منقی، کندر، افیون، مر، تیز اور لطیف سرکہ میں گوندہ کرٹکیہ بنالیں۔ مقدار خوراک پونے دو گرام ہے اگر نزف زیادہ ہو تو فرج میں دوائی حقنہ کریں۔ (جور جس)

زاج الاساکفہ (پھٹکری کی ایک قسم) جفت البلوط، کندر اور افیون کی گولیاں بنالیں۔ ساڑھے تین گرام کھلائیں۔ سیلان کتنا ہی قوی ہو رک جاتا ہے اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو چھاتیوں کے نیچے بڑے بڑے کچھنے لگائیں۔ (سرایون)

خرفہ کھانا نزف کے لئے مفید ہے۔ (مفردات جالینوس)

اگر نرف کے ساتھ پیاس اور شدید سوزش ہو تو کوئی دوا نہ دی جائے۔ (مؤلف)
 زراوند مدحرج ایسے قروح رحمی کے لئے مناسب ہوتا ہے جن میں گوشت پیدا ہو گیا ہو۔ یہ اس کا تنقیہ کرتا ہے اور عفونت سے روکتا ہے۔ برنجاسف فم رحم کے قروح کے لئے مفید ہے۔ گلنار نرف کے لئے مفید ہے۔ لاذن نفع پیدا کرتا ہے، تحلیل مادہ کر کے خشکی لاتا ہے اور اس کے ساتھ رحم کے دردوں میں مفید ہوتا ہے۔ سوسن سفید بستانی رحم کی ختی میں مفید ہے۔ رسوت نرف کو روکتا ہے۔ گل ارمنی بہت فائدہ مند ہے۔ (جالینوس)

ایر سا کا جوشاندہ درد رحم میں مفید ہے یہ صلابت میں نرمی لاتا اور اگر فم رحم چپک کر بند ہو گیا ہو تو اسے کھول دیتا ہے۔ وج کے جوشاندہ میں بیٹھنا درد رحم میں مفید ہے۔ لسان الحمل کا پانی رحم کے سیلان مزمن میں مفید ہے۔ حضض (رسوت) کا حمل قاطع نرف مزمن ہے۔ روغن سوسن درد رحم میں اپنی افادیت میں کوئی نظیر نہیں رکھتا۔ کندر کی چھال سیلان مزمن میں مفید ہے۔ جوشاندہ طرفا میں بیٹھنا رحم کے نرف دم میں مفید ہے۔ قاقیا کا حمل نرف مزمن کو روکتا ہے۔ جوشاندہ مازو میں بیٹھنے سے عورتوں کا مزمن سیلان بند ہو جاتا ہے۔ غاریقون کا پینا ریا ح رحمی کے لئے مفید ہے۔ سداب کو روغن زیتون میں پکا کر اس سے فرج میں حقنہ کرنے سے غلیظ ریا ح تحلیل ہو جاتی ہے۔ جاؤ شیر کو شہد میں ملا کر پینا اور حمل کرنا رحمی صلابت کو تحلیل کرتا ہے اور ریا ح کو توڑتا ہے۔ میتھی، بزرکماں، نمام، مرزنجوش، شیخ، پودینہ، بابونہ، اکلیل الملک، برنجاسف اور خیری کے مطبوخ میں بیٹھنا رحم کے دردوں اور سخت ورموں میں مفید ہے۔ آب زیرہ پینا اور حمل کرنا مزمن نرف کو روکتا ہے۔ خطمی کو بیج اور پانی میں یا عصارہ انگور میں یا عصارہ بیر میں پکا کر اس میں بٹخ کی چربی ملا کر حمل کرنے سے رحم کے درد اور سوزش میں سکون ہوتا ہے۔

(دیسقوریڈوس)

درونج کی خاصیت غلیظ ریا ح تحلیل کرنا ہوتی ہے خاص طور سے جب وہ ریا ح رحم میں ہو۔ اس سلسلہ میں یہ لاثانی دوا ہے۔ (خوز، ماسرجویہ، قلعمان)

زرباد رحم کی غلیظ ریا ح کو خاص طور سے تحلیل کرتا ہے اس معاملہ میں یہ دوا لاثانی ہے۔ (بدیفورس، مسیح، ابن ماسویہ، ماسرجویہ، خوز)

سنبل کو پینے سے کثرت حیض میں فائدہ ہوتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

سنبل کی خاصیت خون حیض بند کرنا ہوتی ہے کبھی اس کے ساتھ اسخان کی بھی ضرورت پڑتی ہے لہذا سنبل، زیرہ اور کندر وغیرہ دینا چاہئے۔ طمٹ کو روکنے والی چیزوں میں ان دونوں

سے کم گرم اور کوئی چیز نہیں ہے۔ (مؤلف)

صمغ الجوز ۳۵ گرام کا تین خوراک میں استعمال قاطع طمٹ ہے۔ (ابن ماسویہ)

روغن زیتون درد رحم میں مفید ہے۔ اسی طرح روغن زنگس و روغن سوسن بھی۔

(ابن ماسویہ)

میں نے بہت سی نرف خون کی مریضوں کو دیکھا اور ان کا علاج مذکورہ تمام چیزوں سے کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میں نے اندازہ کیا کہ نہ تو یہ بو اسیری ہے اور نہ ہی خون حیض ہے۔ اس لئے پہلے ان دونوں میں فرق کریں پھر اس کا مناسب علاج کریں۔ (مؤلف)

طمٹ مفرط کی شکایت میں بلوط کا افراط کے ساتھ استعمال کرائیں۔ (مسلمیہ)

درد رحم میں جند بید ستر سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہے آب انگور خام حالبس دم

ہوتا ہے۔ (خوز)

کثرت حیض:

ساق اور ایک مٹھی بھر کسیرہ ایک مٹھی بھر کو پانی میں ابال کر نہار منہ چند روز تک پلائیں،

سندروس حالبس دم ہوتا ہے۔

غدا تھوڑی کھانے یا زیادہ محنت کرنے سے خون حیض میں کمی آتی ہے۔

(کتاب الاغذا)

اگر ولادت وغیرہ سے رحم باہر آجائے تو حجاب رحم کو ایک دم سے قطع کر دیں یہاں تک کہ اپنی طبعی ساخت پر واپس آجائے اور منہ میل سے اس کو ملیں تاکہ خروج والے حصے سے فاصلہ رہے۔ روغن بان اور روغن زفت میں صاف رومال کو لت کر لیں۔ اسفنج سے بھی ملیں پھر شراب ڈالکر اسفنج رکھ کر باندھ دیں پر اس طرح باندھیں کہ چٹائی کندھوں کی طرف ہو اور دونوں پیر اونچے رہیں کھانا کم کھلائیں۔ (بقراط)

رحم میں ادھیڑ عمر والی موٹی عورتوں کو قونج کی طرح درد ہوتا ہے اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی اس میں تبد بالخاصیت فائدہ کرتا ہے۔ میں نے اس عضو کے لئے اس سے زیادہ کارآمد دوا نہیں پائی۔ تبد کے ساتھ اترنج ملانے سے یقیناً دوا کو مدد ملتی ہے تنہا تدبیر سے میں نے کئی بار نقصان محسوس کیا ہے۔ (قسطا)

صلابت رحم کے لئے اقحوان کے جوشاندہ میں مریضہ کو بیٹھایا جاتا ہے۔ گل اقحوان محلل

صلابت رحم ہے۔ اس میں بیٹھنے سے صلابت رحم تحلیل ہو جاتی ہے۔ جوشاندہ اُشنہ درد میں مسکن ثابت ہوتا ہے۔ اذخر کی جڑ تمام اور ام صلب کے لئے بہت مفید ہے۔ روغن بلساں اور جوشاندہ اقوان میں بیٹھنا ورم صلب میں مفید ہے۔ چکنی اور سرخ کلیاں اور جو کما فیتوس کی طرح ہوں انکو پیس کر روغن گل میں ملا کر حمل کرنے سے صلابت رحم میں نرمی آتی ہے۔ (جالینوس)

عورت کے دودھ میں روئی تر کر کے اس سے حمل کیا جائے تو درد رحم میں فائدہ ہوتا ہے۔ روغن بلساں میں موم اور روغن گل ملا کر حمل کرنے سے رحم کی بردوت چلی جاتی ہے۔ جوشاندہ فنجکشت میں بیٹھانے سے درد و صلابت رحم میں سکون ہوتا ہے۔ عصارہ خرفہ کا حقنہ کرنے سے رحم کے درد دور ہوتے ہیں نیز اس کے زخم میں فائدہ ہوتا ہے اور مواد رک جاتا ہے۔ (اطہور سفس)

رحمی زخموں میں برنجاسف عمدہ چیز ہے اسی طرح سرخ اور سفید اجوائن کے عصارے درد رحم میں مفید ہیں۔ (اوریباسیوس)

روغن بزرالنج درد رحم کے لئے عمدہ چیز ہے۔ (دیسقوریڈوس)

جاو شیر شہد میں ملا کر حمل کرنے سے نفخ و صلابت رحم تحلیل ہوتی ہے۔

(جالینوس و دیسقوریڈوس)

جوشاندہ درونج میں بیٹھنا درد رحم میں مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس اور بدیغورس)

روغن گل کے حقنہ سے سوزش رحم میں فائدہ ہوتا ہے۔ زعفران درد رحم کے لئے عمدہ دوا

ہے۔ روغن زعفران قروح رحمی کے لئے عمدہ چیز ہے۔ موم اور زعفران کو انڈے کی زردی میں ملا کر دو گنے روغن زیتون میں ملا لیا جائے تو رحم کے زخموں کو نفخ دیکر سکون دیتا ہے۔

(دیسقوریڈوس)

زر واند طویل رحم کے زخموں میں مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس)

تازہ مکھن کو بذریعہ حقنہ فرج میں پہنچانا سخت درد رحم میں مفید ہے (اوریباسیوس)

فرزجہ حماما کا حمل یا جوشاندہ حماما یا جوشاندہ میتھی میں بیٹھنا درد و ورم یا انضمام رحم میں

مفید ہے۔ روغن میتھی صلابت رحم کے لئے اچھی چیز ہے اور روغن حنا درد رحم میں مفید ہے۔ روغن

عصیر رحم کے تمام دردوں میں مفید ہے۔ تخم کتاں کے مطبوخ کا حقنہ سوزش رحم میں اور فضلات

رحم کے اخراج میں کارآمد ہے۔ اور اس میں بیٹھنا نفخ کو دور کرتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

کرنب اور چقندر کھانے سے درد رحم میں فائدہ ہوتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

کرنیب شامی کے پتے نمک اور پانی کے ساتھ جوشاندہ بنا کر اس میں بیٹھنا یا اس کا حقنہ کرنا صلابت کو تحلیل کرتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

مذکورہ جوشاندہ میں بیٹھنے سے صلابت تحلیل ہوتی ہے۔ اس کا ضما د کرنے سے رحم کا ورم بلغنی تحلیل ہوتا ہے اور اس کی دھونی دینے سے بھی ورم تحلیل ہوتا ہے۔ نیز اس کے پتے کو خصوصاً نمک ملا کر جوش دیکر اس میں بیٹھنے سے بھی سخت ورم تحلیل ہوتا ہے، روغن بادام تلخ درد رحم، انقلاب رحم اور ورم صلب کے لئے مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

ہر طرح کے دودھ کو بذریعہ حقنہ رحم کے اندر ڈالنے سے اس کا زخم، سوزش اور حدت دور ہوتی ہے خاص طور سے جب اس میں مغری و مسکن و دوائیں مثلاً سفوف، توتیا مغسول وغیرہ شامل کر لی جائیں۔ اگر زخم سرطانی ہو تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ مرکوپیس کرشہد میں معجون بنا کر کھانے سے درد رحم میں فائدہ ہوتا ہے۔ مصطکی سے تیار کیا گیا تیل رحم کے سارے دردوں میں مفید ہے کیونکہ یہ ہلکا سا مسخن اور ملین ہوتا ہے۔ آب کبر رحم کے دردوں میں مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس و جالینوس)

بارہ سنگھے کی ہڈی کا گودا داخلہ حمل کرنے سے اور خارجہ طور مروح استعمال کرنے سے سختی میں نرمی آتی ہے۔ (روفس)

جوشاندہ نار دین میں بیٹھنا اور ام صلب میں مفید ہے۔ (جالینوس)
روغن نرگس درد رحم کے لئے بہترین چیز ہے کیونکہ صلابت کو دور کرتا ہے۔
(دیسقوریڈوس)

جوشاندہ نسرین درد صلابت رحم کے لئے عمدہ چیز ہے۔ (دیسقوریڈوس)
روغن نسرین درد کے لئے مفید ہے اور سعد کا جوشاندہ بار درد کے لئے مفید ہے۔
(بولس، ابن ماسویہ)

سلیخہ اتساع رحم میں مفید ہے جبکہ اس کے جوشاندہ میں بٹھایا جائے یا اس کے تیل کی مالش کی جائے۔ روغن سفرجل کا حقنہ قروح رحم کے لئے مفید ہے۔ ایرسا کا جوشاندہ درد رحم کو دور کرتا ہے، صلابت کو زائل کر کے فم رحم کو کھولتا ہے۔ روغن سوسن سختی اور ورم صلب کو تحلیل کرتا ہے۔ درد رحم میں افادیت میں اپنی مثال آپ ہے۔ روغن ایرسا درد کو دور کرتا ہے نرمی لا کر زخم کا منہ کھولتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

روغن زیتون کے ساتھ سداب کا جوشاندہ بذریعہ حقنہ رحم کے اندر پہنچانا فائدہ مند

ہوتا ہے۔ (جالینوس)

حب الغار درد رحم کے لئے عمدہ چیز ہے، پودینہ بڑی درد کے لئے مفید ہے۔

(دیسقوریڈوس)

قسط کے جوشاندہ کا پینا یا اس میں بیٹھنا درد رحم میں مفید ہے۔ قناری کا ضاد بھی فائدہ مند ہے۔ قصب الذریرہ کا جوشاندہ پینا اور اس میں بیٹھنا درد رحم میں مفید ہے۔ ماسر جو یہ بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ اس کے مطبوخ میں بیٹھنا درد رحم میں مفید ہے۔ ورم رحم کے نسخہ تکمید میں قصب الزیرہ کو شامل کر لینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ (روفس)

روغن قيصوم اور ام رجمی کے لئے عمدہ چیز ہے اور بقول دیسقوریڈوس لازن بھی مفید ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ محلل اور ام ہے۔ اس میں تلہین، ہلکی قبضیت اور اس کے جوہر میں لطافت ہے۔ تازہ کدو کا ضاد رحم کے گرم دردوں میں سکون دیتا ہے۔

(جالینوس)

قنطوریون کی جڑ سات گرام، کا شراب کے ساتھ شرباً استعمال درد رحم میں مفید ہے۔ اگر مریض کو بخار بھی ہو تو شراب کے بجائے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ (دیسقوریڈوس)

زراوند رحم کے دردوں میں مفید ہے، راعی الحمام کا بار یک سفوف روغن گل اور بطنج کی چربی میں مخلوط کرنے سے درد رحم میں سکون ہوتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

سوئے کے جوشاندہ میں بیٹھنے سے درد رحم میں فائدہ ہوتا ہے اور سوئے کے تیل سے سختی میں نرمی آ جاتی ہے۔ (دیسقوریڈوس)

زوفارطب، مکھن یا بطنج کی چربی اور اکلیل الملک میں مخلوط کر کے لگانے سے قرصہ رحم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مرغابی اور مرغی کی تازہ چربی درد رحم میں مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس)

خنزیر کی چربی مسکن درد رحم ہے۔

برنجاسف کے جوشاندہ سے سکائی کرنا رحم کے لئے بے حد مفید ہے۔

زفت رطب رحم کی سختی اور اوندھے پھوڑوں کو تحلیل کرتا ہے۔ (بولس)

خشک انجیر جو کے آٹے کے ساتھ پکا کر اور میتھی ملا کر ورم رحم کی شکایت میں اس سے

سکائی کی جاتی ہے۔ (دیسقوریڈوس)

انجیر کا دودھ سختی رحم کو دور کرتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

غار کے پتوں کے مطبوخ میں بیٹھنے سے درد رحم میں فائدہ ہوتا ہے۔ خردل درد رحم میں

مفید ہے۔ (دیسقوریدوس)

خیری زرد کے جوشاندہ میں بیٹھنے سے رحم کی سختی اور ام میں فائدہ ہوتا ہے۔ بقول دیسقوریدوس خیری کا جوشاندہ زیادہ تیز نہ ہو۔ ورم رحم خاص طور سے سخت اور پرانے ورم پر اس کا نطول کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ خطمی کو شراب میں پکا کر چربی اور بطم کا گوند ملا کر حمل کرنے سے رحم کا سخت ورم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بقول دیسقوریدوس اس کے جوشاندہ سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے۔۔ نیز ملوخیا کے جوشاندہ میں عورت کو بیٹھانے سے رحم کی سختی دور ہوتی ہے۔ نیز اس کا حقنہ کرنے سے رحم کی سوزش میں فائدہ ہوتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

خریق سفید کو حمل کرنے سے رحم میں جو کچھ بھی ہو باہر آ جاتا ہے۔ (بقراط)

اگر درد رحم حرارت کے ساتھ ہو تو عصی الراعی (لال ساگ) اور جی العالم (سدا بہار) کا عصارہ اور روغن گل سفید کپڑے میں لت کر کے حمل کریں اور اسی جیسی دوسری غذا اور تدبیر اختیار کریں۔ لیکن اگر درد برودت کے ساتھ ہو تو مسخن صمغیات، قطران اور مشطر امشیع سے حمل کیا جائے۔ (مجبول)

علاج ورم صلب بحوالہ تذکرہ عبدوس:
نسخہ حمل:

مرحم داخلون یا باسلیقون، مرغابی کی چربی، بارہ سنگھے کی ہڈی کا گودا، بکری کے دودھ کا مکھن، خرگوش کا پنیر، صبر، جند بیدستر، روغن رازقی۔ یہ حمل نیلے رنگ کے کپڑے سے کیا جائے۔ صلابت رحم کے لئے مفید ہے۔

نسخہ مرہم:

بارہ سنگھے کی ہڈی کا گودا، بطخ کی چربی، موم زرد، روغن سوسن، مر، زعفران، اقحوان، جند بیدستر ہم وزن ایرسا، علك البطم اور آب میتھی سب کو ملا کر مرہم بنا لیا جائے اور آسمانی کپڑے کے ذریعہ حمل کیا جائے یہ بھی ورم صلب میں مفید ہے۔

ورم صلب اور سرطان رحم کے لئے ایک نسخہ:

پہلے رحم کو ضادوں کے ذریعہ نرم کریں پھر مدربول اشیاء استعمال کرائیں تاکہ اندرونی مادوں کا استفراغ ہو جائے اسے بار بار استعمال میں لائیں۔

جراحت اور شدید درد رحم و مثانہ میں دھارے کے لئے ایک نسخہ:

آب بزر قطونا و برسیان دارا، ماء الشعیر، انڈے کی سفیدی، عورت کا دودھ، روغن کدو اور شیا ف بیض ۱۰۵ گرام رحم کے اندر بذریعہ حقنہ پہونچائیں اور چند قطرے مثانہ میں بھی ٹپکائیں۔ مریضہ کو رب سوس، کتیرا، گوند، تخم خیار، تخم تربوزہ اور نشاستہ پلائیں۔ گکڑی یا خر بوزہ کھلائیں یا تیج پلائیں، شیرہ انجیر یا سوسن کی جڑ کے مطبوخ سے بنا ہوا لعوق عرصہ دراز تک چٹائیں یہ بہت فائدہ مند ہے۔ (الکمال التمام)

ایک نسخہ جس کو رحم میں ڈالنے سے جامد خون خارج ہو جاتا ہے اور درد زہ جیسے درد کو تسکین ملتی ہے۔

نسخہ:

بابونہ، اکلیل الملک (ناخونہ) چقدر کی جڑ، بنفشہ، مشکطرا مشع، فراسیون ہر ایک ۳۵ گرام، مر ۱۴ گرام، شب یمانی، نمام، شیخ، تخم کتاں، میتھی قیصوم ہر ایک ۳۵ گرام۔ سب کو دو لیٹر پانی میں اتنا پکائیں کہ ۴۰۰ ملی لیٹر رہ جائے پھر تین دن تک اسکا نیم گرم حقنہ کرائیں۔ (تذکرہ عبدوس)

ضماد کا ایک نسخہ جو رحم کے شدید درد، بلغمی اور دموی ورم اور دبیلہ میں مفید ہے۔

نسخہ:

تخم کرات نبطی ساڑھے ۵۲ گرام، میتھی، تخم کتاں ہر ایک ستر گرام، اکلیل الملک ۱۰۵ گرام، بابونہ، بنفشہ ہر ایک ستر گرام، میعہ یا بسہ ۳۵ گرام، صندل، بنغ عطلی ہر ایک ستر گرام، سویا ساڑھے ۸۵ گرام سندروس ساڑھے ۵۲ گرام، کرات نبطی کی جڑ چلی ہوئی ساڑھے ۵۲ گرام، باقلہ کا آٹا ۱۰۵ گرام، راتیج ساڑھے ۵۲ گرام، مقل ۱۰۵ گرام، تیج میں بھگوئے ہوئے انجیر دس عدد۔ پہلے خشک ادویہ کو پیس لیا جائے، مقل کو تیج میں بھگو دیا جائے اور انجیر کو خوب باریک پیس کر مقل میں ملا یا جائے اور حسب ضرورت سفوف سوسن کوٹ کر شیرہ میں ملائیں پھر اس میں راتیج، چھڑے اور مرغابی کی چربی ۱۰۵-۱۰۵ گرام اور موم ۴۰۰ گرام میں حل کر لیں تمام دواؤں کو اچھی طرح ملا لیا جائے اس ضماد کو پوری رات لگا کر چھوڑ دیا جائے اور کچھ دنوں تک استعمال کیا جائے۔ تو اس سے عجیب و غریب فائدہ ہوتا ہے۔ (مؤلف)

رحم میں ورم جیسی سختی کے لئے ایک نسخہ:

روغن میتھی، زرگس، زعفران، روغن شبت سے مانس کی جائے لاذن کا حمول کیا جائے اس سے رحم کا ورم صلب نرم ہو جاتا ہے یا برگ خطمی پس کر مرغابی کی چربی اور گوند مادام کے ساتھ ملا کر مقام ماؤف پر لگایا جائے۔

رحم کی پھنسیاں:

خشک گلاب، ۷۰ گرام، سنبل ساڑھے ۷۰ گرام، سوسن کی جڑ ساڑھے ۷۰ گرام، قیہولیا اس کے برابر۔ سب کو کوٹ پس کر مطبوخ ریحانی میں گوند لیا جائے اور لمبی بنا کر حمول کیا جائے۔

رحم کا بارود درد:

جاوشیر، جند بید ستر ایک گرام مطبوخ ریحانی کے ساتھ پیا جائے۔

درد رحم:

برنجاسف کے جو شانده سے نطول کیا جائے۔ (تذکرہ عبدوس)

نم رحم میں پیدا ہونے والے گوشت کو رجا کہتے ہیں اس میں روح نہیں ہوتی

(العلل والاعراض)

کبھی رحم میں سوء مزاج عارض ہو کر قوت میں زوال آ جاتا ہے۔ اس میں سے خارج ہونے والا خون زیادہ مقدار میں ہو اور صاف ہو تو یہ کسی رگ کے کھل جانے کی علامت ہے اس میں درد نہیں ہوتا اور اگر پیپ شامل ہے تو دبیلہ کی علامت ہے اگر سیاہ رنگ تھوڑا تھوڑا رہا ہو تو آکله ہے۔ اگر رحم میں ورم حار ہے تو اس کے ساتھ تیز بخار ہوگا اگر یہ ورم آگے کی جانب ہے تو درد عانہ میں ہوگا اور احتباس بول کی شکایت ہوگی اور اگر موخر رحم میں ہے تو درد گردن میں ہوگا اگر رحم کی گہرائی میں ہے تو کمر درد پیٹھ میں ہوگا اور اجابت رک جائے گی لہذا پہلے رگ باسلیق کی فصہ کھولیں اس کے بعد صافن کی اور خیار شہر ہمراہ آب مکو و روغن بادام پلائیں اور جب ورم کم ہو جائے تو روغن ارنڈ ہمراہ ماء الاصول کے پلائیں اور ابتدا میں ورم کو روکنے والی دواؤں سے حمول کریں بعد میں کرنب اور مرغیرہ کے عصا رے سے حمول کریں۔ ابتدائے مرض میں آب کاسنی و عنب مکوء، روغن گل، انڈے کی سفیدی وغیرہ استعمال کریں۔ (یہودی)

نسخہ جو جالینوس سے منسوب کتاب السموم میں مذکور ہے :

جند بیدستر خاستری سیاہ رنگ کا ۲۵۰ ملی گرام کی مقدار میں استعمال درد رحم میں مفید

ہوتا ہے۔

رحم کے ورم حار کی علامت :

اختلاج، حرارت، گرانی، کمر، عانہ اور جنگا سوں میں کھنچاؤ، لرزہ، چھین والا درد، ہاتھ

پیروں میں ٹھنڈ، اور سن کا احساس، پسینہ کی کثرت، نبض صغیر۔

معدہ سے مشارکت کی بنا پر ہچکی گرند میں اور سر کے سامنے کے حصے میں درد

ہوتا ہے۔ اگر ورم نم رحم میں ہوتا ہے تو درد سخت اذیت ناک ہوتا ہے اور جنگا سوں میں بہت

شدید ہوتا ہے اور اگر رحم کے کسی ایک جانب ہو تو ورم کی جانب ران اور جنگا سے میں درد

ہوتا ہے اگر زیریں حصہ میں ہو تو درد معاء مستقیم میں ہوتا ہے اور پیش ہوتی ہے اگر اوپر کی جانب

ہوتا ہے تو درد کمر اور کھولے میں ہوتا ہے۔ اگر رحم کسی ایک جانب مائل ہو جائے تو اس جانب

شدید درد اور کھنچاؤ ہوتا ہے پیشاب پاخانہ بند ہو جاتا ہے۔ ورم رحم میں سختی اور شدید خشکی ہوتی

ہے۔ اگر اس میں دبیلہ ہوتا ہے تو شدید کھنچاؤ اور بغیر متعین باریوں کا بخار لرزہ کے ساتھ

ہوتا ہے۔ مخالف جانب مریض کو کچھ آرام ہوتا ہے۔ کمر کے نچلے حصہ میں ورم ہوتا ہے جب

قرحہ رحم پھوٹ جاتا اور اس میں سے زرد آب بہنے لگتا ہے اور بدن سوکھنے لگتا ہے تو اس وقت

مرخی دوائیں نقصان پہنچاتی ہیں اور قابض دوائیں فائدہ کرتی ہیں۔ نم رحم میں زخم کی تکلیف

شدید ہوتی ہے۔ جب اس میں عفونت پڑ جاتی اور زخم گندہ ہو جاتا ہے تو زرد آب کثیر مقدار میں

ہوتا ہے۔

کبھی پورا رحم متورم ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور پیٹ مریض استسقاء کے شکم کی طرح

پھول جاتا ہے۔ پورے جسم میں کمزوری اور لاغری آ جاتی ہے۔ اس میں درد نہیں ہوتا۔ ضعف کا

سبب سیلان خون حیض، شہوت کی کمی اور قلت اسہال ہوتی ہے۔ اگر زیریں شکم میں ورم رخو

عارض ہو جائے تو تنگی تنفس، احتباس حیض اور قراقرہ ہوتا ہے۔ خاص طور سے جب عورت چلتی

ہے یا کوئی زوردار حرکت کرتی ہے تو اس سے مائی رطوبت نکلتی ہے۔

ورم رحم میں عورت کو خوشبودار جگہ رکھیں اور تین دن تک تغزیہ کریں اور جتنا ممکن

ہو سکے جاگنے کو کہیں پھر سلائیں اور رحم کے اندر دوا بذریعہ حقنہ پہنچائیں۔ معتدل مشروبات

پلائیں جو قے کو روکنے والے ہوں۔ تین دن کے بعد اسے ہلکی غذا دیں رحم کو سینک پیچائیں اور پھر جو کے جوشاندے اور روغن سے حقنہ کرا کے اسہال کرائیں۔ اگر درد شدید ہو تو کسی رگ کی فصد کھولیں اور ملین ضاد اور فرزجہ کام میں لائیں۔ ملین پانی میں بٹھائیں سختی ہو تو پچھنہ لگائیں۔ درد میں سکون ہو جائے تو ملین ضاد جیسے ضاد بزور، ضاد مرزنجوش اور ضاد اکلیل الملک وغیرہ کام میں لائیں۔

جساء (سخت ورم) کا علاج:

مریضہ کو میتھی اور تخم کتاں کے جوشاندہ میں بٹھائیں اور مرغابی کی چربی، بارہ سنگھے کی ہڈی کے گودے اور روغن حنا میں آٹا گوندہ کر ضاد کریں اور حمل کریں۔

رحم کا ورم سقیر وس:

یہ ورم ایسا سخت ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا ورم نہیں ہوتا۔ یہ لا علاج ہوتا ہے۔ فوراً عورت کے قلب پر خوشبودار دوائیں لگائیں اور مرطب چیزوں سے تدبیر شروع کریں اگر اس میں دبیلہ ہوتا ہے تو التهاب اور بخار، جاڑا اور اس سے پہلے لرزہ عارض ہوتا ہے۔ ملین اشیاء سے علاج کریں تاکہ جلد سے جلد دبیلہ کھل جائے۔ پھر مریضہ کو آب میتھی، نمام، مرزنجوش، مسور، مر، روغن سوسن، روغن حنا، اُشق، بھنگ وغیرہ میں بٹھائیں۔ آرد گندم، روغن میتھی، آرد تخم کتاں کو چربی، راتیج، علك البطم، برنجاسف، مشکطرا مشیع، مرزنجوش، ملح درانی، شہد اور روغن زیتون میں گوندہ کر کو لہے اور کمر پر ضاد کریں۔ جب اس سے غلیظ بدبودار پیپ نکلے تو فراسیون کو آب شہد میں پکا کر حقنہ کریں۔ اگر اس سے راحت نہ ہو تو مرہم باسلیقون بذریعہ حقنہ اندر پہنچائیں۔ جب پیپ کم ہو جائے تو پھوڑے پر حتی الامکان گوشت لانے کی تدبیر کریں اور مریضہ کو قابض پانیوں میں بٹھائیں اور مرہم اسفیداج کا حمل کریں۔ جب دبیلہ کا فحش نہ ہو رہا ہو تو مریضہ کو منضج پانیوں میں بٹھائیں جیسے آب میتھی و بزرتاں جب دبیلہ پھوٹ جائے تو مدر اور منقی رحم چیزیں جیسے افادہ کا استعمال کریں۔ دبیلہ کے پھوٹنے سے پہلے اس کا استعمال قطعی طور پر ممنوع ہے کیونکہ اس سے درد میں اضافہ ہوگا۔ دبیلہ کا جلد فحش کرنے کے لئے ملین اور مفتوح مرہموں کو اندر تک بذریعہ حقنہ لگائیں۔

اگر رحم میں سخت ورم محسوس ہو اور فرج خشک اور سیسہ کے رنگ سے مشابہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سرطان پیدا ہو گیا ہے اگر چھوٹے سے سرطان نہ ملے تو علامت

یہ ہوگی کہ مریضہ چھین کے ساتھ درد محسوس کرے گی۔ کسی طرح کا سیلان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرطان بغیر قرحہ کے ہے اور اگر سیلان موجود ہے تو سرطان قرحہ کے ساتھ ہے۔ یا پھر سرطان میں حریف رطوبت ہے۔ لیکن اس حالت میں درد عارض نہیں ہوتا بہر حال درد کو تسکین دینے کیلئے مسور کا جوشاندہ یا گدھی کا دودھ اور بارتنگ کے جوشاندہ سے حقنہ کریں۔ ایسا کرنے سے سرطان متفرج سوکھ جائے گا اگر متفرج نہ ہو تو انڈے کی زردی، اسپغول، اجوائن، مکو، اور روغن گل سے حقنہ کرائیں اور اس میں بٹھائیں۔ ایسا کرنے سے مذکورہ چھین والا درد دور ہو جائے گا۔

رحم میں کبھی آکلہ بھی ہو جاتا ہے جس کا علاج سرطان کے اصول پر کیا جاتا ہے۔ ان میں علامت فارقہ یہ ہے کہ آکلہ میں نہ سختی ہوتی ہے اور نہ صلابت اور اس کا درد کبھی ساکن ہوتا ہے جب کہ سرطان کے درد میں چین نہیں ملتا۔ رحم میں نفخ بھی ہو سکتا ہے جس کی علامت یہ ہے کہ رحم پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے اور درد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ناری پچھنے عانہ پر لگائیں اور مبر دریا حمرہم استعمال کریں جیسے سداب اور زیرہ ملا کر بنایا ہوا مرہم۔ اسی طرح عود بلساں، مقل اور روغن ناردین کا شافہ استعمال کریں۔ اگر ضرورت ہو تو اس کا ضماد اور شافہ بھی لگائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رحم پر خراب رطوبتیں گرنے سے درد رحم عارض ہوتا ہے۔ جس سے جرم رحم دبلا ہو جاتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ رحم کا تحقیق منقی دواؤں سے کیا جائے اور فراسیون اور کرسنہ کا شافہ رکھ کر رطوبت خارج کی جائے جب تحقیق ہو جائے تو کیلی چیزوں کا جوشاندہ اور شافہ استعمال کریں اور تحقیق بدن سے غفلت نہ برتیں۔ عاقر قرحا، فلفل اور روغن زیتون اور روغن اذخر سے پچھڑوؤں کا تحقیق کرنے کے بعد پنڈلیوں کی مالش کریں۔ ایسا کرنے سے رطوبتوں کا انجذاب نیچے کی طرف ہو جائے گا اور راحت ملے گی۔

کبھی عورت کی فرج میں رحم الٹ جاتا ہے اور اس کی جھلیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ جنین اچانک خارج ہو جس سے رحم کی گردن فرج کی طرف خارج ہو جائے یا پھر مشیمہ کی ابتدائی حرکت اس کے خارج ہونے کا سبب ہوتی ہے یا پھر کسی بھی حرکت سے، چوٹ یا دوڑنے پھرنے یا رحمی رطوبتوں کے تعفن سے انقلاب رحم واقع ہوتا ہے۔ اس حالت میں ہاتھ لگانے سے رحم محسوس ہوتا ہے اور اس میں نرمی ہوتی ہے لیکن فرج کے منہ میں یا اس کے وسط میں اس سے شدید درد ہوتا ہے اور تیز بخار عارض

ہوتا ہے۔ لہذا ایسے میں مریضہ کو حمام اور نمکیات سے دور رکھیں اور قابض پانیوں میں بٹھائیں۔ خاص طور سے اذخر، گلاب، مازو، جوارش السرو کے جوشاندہ میں۔ پھر آہستہ آہستہ رحم کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور فرج کو نرم کپڑے سے آہستہ آہستہ گرفت میں رکھیں۔ جس کپڑے سے فرج کو پکڑنا ہے اس کو مذکورہ دواؤں سے تر کر لیں اور اس پر اقا قیا چھڑک لیں اور ممکنہ حد تک اس کے اندر کر دیں اور پھر ناف پر پچھنہ لگائیں تاکہ ہوا اوپر کی جانب جذب ہو۔ پچھنہ زیادہ عرصہ تک لگائیں حتیٰ کہ رحم اپنی جگہ لوٹ آئے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عورت کی پنڈلیاں باندھی جائیں لیکن اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔

کبھی رحم کا منہ بند ہو کر اس پر کھال چڑھ آتی ہے اس میں نہ درد ہوتا ہے نہ کوئی رطوبت بہتی ہے۔ اس کا علاج یہ کہ عورت کو ملین پانیوں میں بٹھائیں جیسے بزرکتاں اور میتھی کا جوشاندہ۔ پھر پچھنہ (پچکاری) سے ان چیزوں کا حقنہ کریں اور پچھنہ کی نلی کو ان دواؤں سے لت کر دیں ایسا کرنے سے فم رحم کھل جائے گا اور اسہال شروع ہو جائے گا حتیٰ کہ اپنی طبعی حالت پر آجائے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ ان دواؤں سے ایسا فیتلہ بنائیں جس کی شکل دونلیوں کی طرح ہو اور جو رحم میں جا کر قالب (ایک آلہ) کی شکل اختیار کر لیں ایسا کرنے سے بھی مذکورہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔

کبھی رحم میں بوا سیر بھی عارض ہوتی ہے۔ عورت کے نیچے آسنہ رکھنے سے اسے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ عورت کو ملین اور مرخی پانیوں میں بٹھایا جائے مثلاً بزرکتاں، میتھی، روغن زیتون کے جوشاندہ میں۔ نیز روغن سوسن اور اکلیل الملک کا حمل کریں اگر درد کو سکون مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے قوی ملین شافہ کو استعمال کریں۔ جیسے مرغابی کی چربی، بارہ سنگھے کی ہڈی کا گودا اور مقل کا شافہ۔ اگر اس سے بھی سکون نہ ہو تو وہ آلہ استعمال کریں جس سے بوا سیر کے مے کاٹے جاتے ہیں اگر باہر کی جانب مے ہیں تو کاٹے جائیں گے اور اگر اندرون میں ہیں تو کیسلی دواؤں سے علاج کیا جائے گا۔ ملحوظ رہے کہ اس کی تشخیص اس طرح ہوتی ہے کہ رحم کو چھونے سے فم رحم میں کچھ ابھرتی ہوئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس میں تھوڑا تھوڑا خون رطوبت اور زرد آب بہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت کے رحم میں بوا سیر ہے جس کے باعث دائمی سیلان خون فساد رنگ کے ساتھ عارض ہوتا ہے۔ یہ بوا سیر بہت خراب ہوتی ہے اور تلچھٹ کے مانند گدلا سیاہ خون نکلتا ہے۔ وہ رگوں سے آتا ہے کیونکہ رحم سے آنے والا خون ہلکا اور ست ہوتا ہے اور اس میں دکھن نہیں ہوتی اور

اگر بوا سیر خارجی ہو تو پھر وہ عورت کے نیچے آئینہ رکھنے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ خون حیض اور خون بوا سیر میں علامت فارقہ یہ بھی ہے کہ خون حیض ایک نظام کے تحت آتا ہے۔ جبکہ خون بوا سیر نظام حیض کی طرح نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل نہیں ہوتا بلکہ رک رک کر آتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ خون حیض سے لاغری نہیں ہوتی الا یہ کہ خون زیادہ مقدار میں خارج ہو جائے۔ جبکہ خون بوا سیر فساد اور لاغری کا باعث ہوتا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ خون حیض بغیر درد کے خارج ہوتا ہے جبکہ بوا سیر کا خون درد کے ساتھ آتا ہے۔

جس عورت کا حیض رک جاتا ہے اس کو بوا سیر جاری ہونے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا علاج مشترک ہوتا ہے۔ اگر رحم میں تنگی ہو خاص طور سے رحم کی گہرائی میں تو اس قالب کو (ایک آلہ) سے بوا سیری مسوں کی طرح قطع کیا جائے گا پھر مریضہ کو ٹھنڈے پانی میں داخل کر کے اس کے پیروں کو دیوار کے سہارے دو گھنٹے تک اونچا کر دیا جائے گا اور ایک کپڑے کو برف کے پانی میں بھگو کر عانہ یا دونوں پیروں پر رکھا جائے اور اسی طرح کمر پر بھی اور کٹی ہوئی جگہ پر پھٹکری وغیرہ لگائی جائے اور قابض پانیوں میں مریضہ کو بٹھائیں اور عانہ اور ریڑھ پر قابض ضماد کریں۔ اگر خون نہ ر کے تو عانہ، چھاتیوں اور ریڑھ پر کچھنہ لگائیں اور افاقیا کے کپڑے سے حمول کریں۔ جب خون رک جائے تو بوا سیر کا باقاعدہ علاج کریں حتیٰ کہ صحیح ہو جائے۔

شقاق:

رحم میں شقاق اس حالت میں ہوتا ہے کہ جنین یا مشیمہ یا خون حیض یا ورم اچانک خارج ہو جائے۔ یہ شقاق عورت کے نیچے آئینے رکھے جائیں اور نم رحم کو اچھی طرح کھولا جائے تو دکھائی دیتا ہے لہذا اگر یہ حلقہ رحم میں ہو تو توتیا اور انڈے کی زردی سے علاج کریں۔ اور شقاق دور ہونے کے بعد ملینات لگائیں لیکن اگر گہرائی میں ہو تو تانے کا برادہ اور پھٹکری حمول کریں۔ اس سے شقاق دور ہو جاتا ہے۔

قروح رحم:

اگر قروح رحم ورم کے ساتھ ہو تو ملینات سے علاج کریں حتیٰ کہ ورم کم ہو جائے اور اگر زخم زیادہ گندا ہو تو آب شہد یا مطبوخ سوسن سے دھو کر منقی مرہموں سے حمول کریں جب رحم کا تحقیق ہو جائے تو روغن گل کے ساتھ تیار کے لئے مراہم زخم میں بھر دیں۔ اس کے بعد توتیا سے بنے ہوئے مراہم استعمال کریں تاکہ اندام بحسن و خوبی ہو جائے۔ توتیا کا مرہم زخم کو خشک کرتا

اور مندل کرتا ہے۔ کبھی داخل رحم یا فم رحم میں سرخ رنگ کا گوشت پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ گوشت یا تو گولائی میں ہوتا ہے یا طول میں اور اس میں درد نہیں ہوتا۔ اطباء اس کو کاٹ دیتے ہیں میرا بھی یہی معمول ہے۔

کبھی رحم کسی ایک جانب ہٹ جاتا ہے لہذا انگلی داخل کر کے پتا لگائیں کہ کس جانب مائل ہوا ہے پھر اسے پیچ کر محاذ فرج میں لائیں اور ملین پانی ملین فرزجے اس طرح استعمال کریں کہ رحم محاذ فرج میں رہے کیونکہ سیدھا رکھنے سے ہمیشہ سیدھا رہے گا۔ تاہم اگر عنق رحم میں استرخاء واقع ہو چکا ہے تو یہ نہ کھلے گی اور نہ بند ہوگی لہذا پانی میں قابض دوائیں ڈال کر رحم میں پہنچائیں اور ریاضت کریں، فصد بھی کریں اور پانی کے اخراج اور طمث جاری کرنے والے شافوں کے ذریعہ پابندی سے علاج کریں۔ خربق ابیض (سفید رائی) کے حمل سے پانی بکثرت خارج ہوتا ہے۔

جس گوشت کو رجا کہتے ہیں وہ گولائی میں ہوتا ہے اس میں سختی ہوتی ہے۔ اس میں اور سرطان میں علامت فارقہ یہ ہوتی ہے کہ عورت اس میں جنین کی طرح جنتی ہے اور جنین اور اس کے درمیان علامت فارقہ یہ ہے کہ جنین کی طرح اس میں حرکت نہیں ہوتی۔ اس کا علاج مرخی دواؤں سے اتنے عرصہ تک کیا جاتا ہے کہ رحم کو تخریک ہو کر مادہ جلد خارج ہو جائے۔

کتاب الاعضاء والالامہ:

اگر بدن میں اضطراب، ثقل، لرزہ، قائل، متلی، کم خوابی، گندی اشیاء کے کھانے کی رغبت پائی جائے تو دوائی سے کہیں کہ مریضہ کے فم رحم کا امتحان باللمس کرے اگر صلابت ہے اور منہ چپکا ہوا ہے تو یہ رحمی بیماری کی دلیل ہے۔ چنانچہ اگر اوپر کی جانب مائل ہو یا کسی ایک جانب مائل ہو گیا ہو تو جس جانب ایسا ہوا ہے اسی جانب کی بیماری کی دلیل ہے۔ بعض مریضائیں اس جگہ درد اور گرانی محسوس کرتی ہیں۔ یہ درد کولہوں تک پہنچتا ہے اور جب مریضہ چلتی ہے تو ماؤف جانب سے لنگڑا کر چلتی ہے۔ رحم میں اگر عمل بٹ گیا جائے تو اس کے زخم کا بھرنا مشکل ہوتا ہے۔

(میسوسن)

ورم رحم ضربہ وسقطہ، احتباس طمث، بعد ولادت اور جماع مفراط سے واقع ہوتا ہے۔ رحم میں ورم ہو جانے کے بعد تیز بخار، درد سر، درد مفراط، درد اوتار، آنکھوں کی گہرائی میں درد، کلائیوں اور انگلیوں اور سر کی گدی میں تشنج، درد فرج، رحم میں ٹیس و درد عارض ہوتے ہیں

اور متاثرہ مقام پر درد محسوس ہوتا ہے۔ ورم اگر پیچھے کی جانب ہو تو تکلیف و درد کمر میں محسوس ہوتا ہے ورنہ پھر آگے کی جانب ہوتا ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس آنت پر مادہ گر رہا ہے اس پر ورم امعاء کے دباؤ سے براز آگے نہیں گذر پاتا اور وہیں رک کر درد کا باعث بنتا ہے لہذا اگر ایسا ہو تو اس صورت میں کچھلی جانب ورم محسوس ہوتا ہے لیکن اگر ورم کے سامنے والی جانب میں ہے تو درد پیڑ و میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تقطیر بول یا عسر بول کی شکایت ہو جاتی ہے کیونکہ ورم مثانہ پر دباؤ ڈالتا ہے اور جب رحم کا کوئی ایک کنارہ متورم ہوتا ہے تو اس جانب کے جنگا سے میں کھنچاؤ اور پنڈلی میں گرانی ہوتی ہے ورم اگر خاص رحم میں ہو تو فم رحم موٹی اور سخت محسوس ہوگی اگر زیادہ ورم ہو تو حیمی حادہ اور نفخ شکم، شدید التهاب، پسلی، کولہے، سرین اور کلائیوں کی عروق میں گرانی ہوتی ہے۔ نبض کثیف اور تنفس صغیر ہو جاتا ہے بول و براز بند ہو جاتا ہے اگر یہ کیفیت طول پکڑ جائے تو متلی ہونے لگتی ہے۔

علاج:

مادہ کو اوپر کی جانب جذب کرنے کے لئے بغل میں فصد کریں پھر بھی اگر فضلہ رہ جائے تو رگ صافن میں فصد کریں تیز مسہل دوائیں استعمال کریں اور رحم کے نزدیک قابض ضاد لگائیں یہاں تک کہ مادہ جب پوری طرح جمع ہو جائے تو محلول دوائیں شامل کریں۔ مثلاً ابتداءً ورم حار میں مسور، انار کی چھال، لسان الحمل، مکو، پوست کدو اور گلاب وغیرہ استعمال میں لائیں اور درجہ انتہاء میں ان دواؤں کے ساتھ میتھی، حطمی، بابونہ، اکلیل الملک، پھٹکری اور زعفران شامل کریں جب تحلیل ہو چکے تو اُشق، میعہ، قنہ (بھنگ)، چربیوں اور ہڈیوں کے گودوں کے ساتھ ملا کر رحم پر ضاد کریں لطیف ہلکے گرم روغنات جیسے روغن ایرسا، روغن سوسن، روغن بابونہ، روغن حنا وغیرہ شامل کریں۔ اگر دوران علاج مرض کا اعادہ ہوتا ہو محسوس ہو تو انجیر کا آٹا، کبوتر کی بیٹ کا حمول کریں نیز زوفار طب اور گھی سے تیار کیا ہوا فرزجہ رکھیں۔ پھر جب پیپ پھوٹ جائے اور اس کا رخ مثانہ کی جانب ہو تو دودھ، اسپغول، تخم خربوزہ، کیترا، نشاستہ، اور شکر پلائیں۔ لیکن اگر مادہ کا بہاؤ مستقیم کی جانب ہو تو مسور، گلاب، گلنار اور چاول کے جو شانہ سے حقنہ کریں اور اگر فرج کی جانب سواد کا بہاؤ ہو تو مرہم باسلیقون اور گائے کا گھی فرج میں بذریعہ حقنہ لگائیں۔ یہ سب علاج اس صورت کا ہے جب کہ پیپ سفید

رنگ کی اور گاڑھی ہو لیکن اگر مواد بد بودار اور رقیق ہو تو قابض دوائیں استعمال کریں۔
 اور ورم نیچے کے حصے میں ہو تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو پھوڑنے کی کوشش کریں۔
 درد و رحم کو سکون دینے والی اور ورم کو پھوڑنے والی دوائیں:
 میتھی کو پانی میں بھگو کر تین بار دھوئیں پھر اسے پکائیں یہاں تک کہ زرد ہو جائے پھر
 اس کے لعاب میں مرغابی اور مرغ کی چربی ڈال کر آگ پر پکائیں یہاں تک کہ چربی پکھل
 جائے پھر جب یہ جم جائے تو کپڑے پر تھوڑا روغن گل ملا کر لت کریں اور اس کا حمولہ کرائیں۔
نسخہ دیگر:

خشخاش کو انگور کے عصارہ میں اتنی دیر تک پکائیں کہ وہ پھول جائے پھر اس پانی کو
 صاف کر کے اس میں بٹخ کی چربی اور پچھڑے کا بھیجہ اور گودا ملا کر حمولہ کریں۔
نسخہ دیگر:

انگور کے عصارہ میں میتھی پکا کر اس میں مرغابی کی چربی، صمغ خوز اور روغن گل ملا کر
 حمولہ کریں۔
نسخہ دیگر:

خشخاش کو پانی میں پکائیں پھر اسے چھان لیں پھر اس میں ساڑھے تین گرام مر اور
 افیون ڈالیں (انہیں پس کر) چودہ گرام بٹخ کی چربی اور ساڑھے تین ملی لیٹر روغن گل ملائیں
 اور استعمال کریں۔

سخت اور ام کے لئے دیا خلیون، دودھ اور روغن سوسن کے ساتھ لگائیں تیز باسلیقون،
 زوفا رطب، شراب حلوا و زردی بیضہ کا استعمال موافق حال ہوتا ہے۔
ورم صلب کے لئے فرزجہ کا نسخہ:

مرغابی کی چربی، قیروطی ہمراہ روغن سوسن، انڈے کی زردی ایک ایک جز، مرچو تھائی
 حصہ، افیون دسواں حصہ ملا کر استعمال کریں۔

دھن الکرم (روغن انگور)، آب شہد میں ترکی ہوئی روٹی یا پانی میں بھگوئے ہوئے انگور
 کے پتے خیساندے کے ساتھ انگور کے پتوں کو پانی میں بھگو کر پس لیں اور اسی طرح روٹی کو پس
 لیں اور اس میں ۳۰۵ گرام باسلیقون ملا کر بطور فرزجہ استعمال کریں۔

داخلیون کو روغن گل میں اور آب باریتک و آب مکوء میں ملا کر حمل کریں۔ یہ ورم حار اور ورم صلب میں از حد مفید ہے۔

سرطان رحمی نفخ یا سوجن کے بھی ہوتی ہے اور سوجن کے بغیر بھی۔ سرطان نفخ کے ساتھ ہو تو گنداسیہ اور بدبودار سیلان بھی ہوتا ہے اور اگر غیر مقرر ہو تو اس میں شدید درد اور سختی ہوتی ہے جو ہاتھ پھیرنے سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کو سکون پہنچانے کے لئے میتھی کا مطبوخ اور عظمی، بزرکتاں، خشخاش، روغن گل، اور مکوء کا ضماد استعمال کریں نیز ان دواؤں اور انڈے کی سفیدی کو بذریعہ حقنہ اندر داخل کریں تاکہ درد میں حیلان نہ ہو۔ یہ تکلیف ختم ہو جانے کے علاوہ اس میں مزید فائدہ نہیں ہوتا اگر زیادہ خون پھوٹ پڑے تو اس دوا میں اسفیداج، گل ارمنی اور قاقیا وغیرہ کا اضافہ کر دیں۔ (ابن سرائیون)

آس کا جو شانہ رحم کے مزمن سیلان کے لئے بہت اچھی چیز ہے اسی طرح شربت حب الّاس کا پینا بھی مفید ہے۔ قاقیا ۱۲ گرام کتیرا کے ساتھ استعمال کرنے سے سیلان رحم رک جاتا ہے۔ بعض پنیر مایہ بھی ۹۱ گرام کی مقدار میں استعمال کرنے سے رحم کے سیلان مزمن میں فائدہ ہوتا ہے۔ (دیسقوردیدوس)

کہا جاتا ہے کہ خرگوش کا پنیر مایہ سرکہ کے ساتھ پینے سے سیلان دم بند ہو جاتا ہے لیکن میں نے اسے استعمال نہیں کیا کیونکہ میری رائے میں دوائے حار کے ساتھ کوئی قابض دوا شامل کرنا ضروری ہے۔ (جالینوس)

جفت بلوط اور اس کا مطبوخ بطور فرزجہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

(جالینوس)

خرفہ سیلان طمث میں مفید ہے۔ اس کا عصا رہ زیادہ فائدہ مند ہے۔

اجوائن خراسانی ۵۴ گرام میں ایک حصہ خشخاش ملانے سے سیلان رحم میں فائدہ

ہوتا ہے۔

مغز اخروٹ کو جلا کر پیس کر شراب کے ساتھ حمل کرنا مانع سیلان طمث ہے۔

(جالینوس)

سرکہ کی گاد اور حب الّاس کو اچھی طرح پیس کر پیڑ و اور شکم پر ضماد کرنے سے کثرت

طمث رک جاتی ہے۔ جنگلی زیتون کے پتوں کا عصا رہ مانع سیلان و نزف ہے۔ جبکہ اس کا حمل کیا جائے۔

بکری کی میٹنی خاص طور سے پہاڑی بکری کی خشک میٹنی کندر کے ساتھ پیس کر روٹی میں فرزجہ بنا کر رکھنے سے مزمن سیلان طمث بند ہو جاتا ہے۔

رسوت کا حمل کرنے سے رحم کی مزمن رطوبات کا سیلان بند ہو جاتا ہے۔

(کتاب الخلاف از ابن ماسویہ)

سومقثران احمر نرف رحمی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ (دیسقوریدوس)

حماض کی جز کا حمل مزمن سیلان اور رطوبت کو ختم کرتا ہے۔ (جالینوس)

شمر الطرفاء کا حمل مزمن سیلان رحمی کو بند کرتا ہے۔ حب الطرفاء کے جوشاندہ میں بیٹھنا

مانع سیلان مزمن ہے۔ طرفا کی شاخ کا سویق بنا کر بطور مشروب پینے سے سیلان فوراً رکتا ہے۔

طحال کے مریض اس کا پانی پیتے ہیں۔ (دیسقوریدوس)

طراہیٹ زبردست مانع سیلان دم ہے۔ گل منخوم اس معاملہ میں عجیب النفع ہے۔ مانع

سیلان دم ہے طین ساموس (کوکب) اس معاملہ میں مفید ہے۔ طین لاتی اور طین ارمنی افادیت

میں تقریباً یکساں ہے۔ (بولس)

جنگلی انگور کا پھل سیلان دم کے لئے بہت عمدہ چیز ہے۔ (بولس)

پوست کندر سیلان رحم میں مفید ہے اور کندر کی فشور سیلان مزمن میں زیادہ فائدہ مند

ہے۔ (دیسقوریدوس)

پرانے روغن زیتون کے ساتھ زیرہ کا حمل قاطع کثرت حیض ہے۔

کرنب مانع نرف ہے۔ کراث مبطی کا پوست کندر کے ساتھ حمل قاطع نرف دم ہے۔

(ابن ماسویہ)

تخم بارتنگ قاطع سیلان دم ہے خواہ شوربا استعمال کیا جائے خواہ اس کا حقنہ کیا جائے

اور بقول دیسقوریدوس اس کو بطور غذا کھانے سے سیلان خون اور فضلات رحم بند ہو جاتے

ہیں۔ نجث الہد یک حصہ، سورنجان دو حصے، سرکہ شراب میں فکیلہ بنا کر حمل کرنے سے خون

کا بہنا بند ہو جاتا ہے۔

لحیہ التیس کی جز قوی درجے کی قابض دوا ہے اور نرف دم میں مفید ہے۔ (مجبول)

درخت مصطکی کی جز کا عصارہ اور اس کی چھال کو پکا کر پلایا جائے جیسا کہ نفس الدم

کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ نرف دم کے لئے بہت مفید ہے۔ اس معاملہ میں یہ طراہیٹ

کا بدل ثابت ہوتا ہے۔ (دیسقوریدوس)

نار دین کا فرجہ قاطع نفس دم ہے۔ کچی کھجور کو کیلی شراب کے سرکہ میں ملا کر پینے سے مزمن سیلان رطوبت بند ہو جاتا ہے۔ اس معاملہ میں نیق کی لکڑی کا برادہ اور اس کا مطبوخ دونوں عمدہ چیزیں ہیں۔ (دیسقوریدوس)

نیلوفر کی وہ قسم جس کا پھول اور جڑ سفید ہوتی ہے اپنی قوت قابضہ سے مریضہ کے سیلان دم کو روک دیتی ہے۔ اس کی جڑ اور اس کے تخم کو شراب اسود کے ساتھ پینا مزمن سیلان رحم میں مفید ہے۔ سفرجل کا پھول شراب کے ساتھ پینے سے مزمن سیلان رحم میں فائدہ ہوتا ہے۔ (جالینوس)

سوسن کی جڑ سختی رحم میں ملین ہوتی ہے۔ سحاق الد باغہ رحم کی سفید رطوبت کو روکتی ہے۔ کھانے والی ساق کو قابض شراب کے ساتھ پینے سے سیلان طمث اور دیگر سیلان رحم بند ہو جاتے ہیں۔ (دیسقوریدوس)

تیز پات (ساذج) (۱) کی لکڑی کا مطبوخ پینے سے یا حقنہ کرنے سے سیلان رطوبت کا فائدہ ہوتا ہے۔

عورت اگر حیض آنے سے طاقت محسوس کرے اور اس کے رنگ میں نکھار آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فضلات تھے جس کو طبیعت مدبرہ بدن جسم سے خارج کرنا چاہتی تھی۔ اس لئے ایسے فضلات کو روکنے کی تدبیر نہیں کرنی چاہئے اور اس کا رنگ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ کون سی خلط غالب ہے۔

اگر سیلان دم زیادہ اور حرارت کے ساتھ ہے تو مانع طمث اور مخدر دوائیں پلائیں۔ فلو نیا اور قرص کھرباء کا طلاء کریں۔ حرارت کے ساتھ نزف کی صورت میں قرص طباشیر کا فوری تخم حماض، رب رحماض اترجی کے ہمراہ استعمال کرائیں۔

اگر نزف کے ساتھ ضعف رحم ہو تو مقوی قابض گل صفت دوائیں دیں مثلاً مازو، گل مختوم، گل ارمنی، شب، دم الاخوین ہر ایک ساڑھے تین گرام، کافور ۶۴ ملی گرام، شک ۵۰۰ ملی گرام، ۳۵ ملی لیٹر شربت آس میں مل کر پلائیں۔

قرحہ رحم میں مغری، قابض اور مخدر دواؤں کا مرکب استعمال کرائیں۔ مندرجہ ذیل مرہم سے حمل کریں۔

سفیدہ، گلنار، مردار سنگ، قیروطی، روغن گل میں ملا کر حمل کریں۔

(۱) اصل نسخے میں لفظ ساج موجود ہے۔

حیض اگر امتلاء کے باعث جاری ہو تو رگ اکھل کی فصد کریں اور دونوں بازو باندھ دیں اور دونوں کولہوں کے بیچ میں پچھہ لگائیں۔ خون حیض پتلا اور مائی ہو تو قابض چیزیں استعمال کرائیں۔ اور لمبا شافہ رکھیں اور رحم پر طلاء کریں۔ (یہودی)

حاملہ کو خون جاری ہو جائے تو فصد کریں مسہلات نہ دیں ایسا حاملہ عورتوں کو اکثر ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے کم خون پیدا کرنے والی غذاؤں اور کم خوراک سے علاج کریں۔

(کتاب الرحم۔ ابن ماسویہ)

خبردار زنف دم میں محرق دوائیں نہ استعمال کریں کیونکہ یہ عضو عصبی ہوتا ہے خاص طور سے حاملہ کو محرک دوائیں کبھی مت دو یہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ (میسوسن)

حیض کے دوران زیادہ خون جاری ہونے سے عورت کا جسمانی رنگ بدل جاتا ہے۔ دونوں پیروں اور پورے جسم میں سوجن آ جاتی ہے، اور سوء ہضم و ضعف ہضم کی شکایت لاحق ہوتی ہے۔ کبھی کبھی زیادہ خون نکل جانے سے اس طرح جسم کی صفائی ہو جاتی ہے جس طرح پیشاب سے۔ ایسے میں کبھی زرد آب، زردی مائل یا سرخی مائل یا پانی کی سط جیسا خارج ہوتا ہے لیکن اگر خون کا رنگ خون فصد کی طرح ہو تو رحم کی بیماری کی دلیل بنتا ہے۔ (الاعضاء الآلمہ)

حقنہ برائے زنف:

قلقطار، اقا قیا اور پوست کندر کی ٹکیاں بنالی جائیں پھر گل ارمنی، صمغ عربی اور کبر بام ہر ایک ۵۔۴ گرام، کی ٹکیہ بنا کر ملا کر دن میں دو بار بذریعہ حقنہ استعمال کرائیں اور مریضہ کو پس گردن سیدھا اور چت سلائیں اور ایک گھنٹے تک اس کے کولہوں کو اونچا رکھیں۔ اسی شکل پر سرطان کے لئے مسکن درد حقنہ استعمال کریں۔ (منج)

کثرت حیض کے لئے ایک نسخہ:

افیون، کندر کی چھال، گل ارمنی، کبر بام، اقا قیا ہموزن لے کر ٹکیہ بنالیں اور آب انگور خام کے ساتھ پلائیں۔ (مجبول)

اکثر کثرت حیض کا سبب رگوں کی کمزوری ہو تو قابض ضما د استعمال کریں۔ اگر حدت خون کا سبب ہے تو مسکن اور حدت کو ختم کرنے والی دوائیں کام میں لائیں اور اگر سبب امتلاء دموی ہو تو فصد کریں۔ خلط غالب کا پتہ رطوبت کے رنگ سے چلتا ہے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا فرج میں حمول کر کے نکال کر معائنہ کریں اگر رنگ زرد ہو تو صفرا ویت خون پر غالب ہے۔ اگر رقیق

مانگ ہو تو بلغمیت غالب ہے اور اگر گہرا سرخ ہو تو خون کا غلبہ ہے۔ لہذا جو خلعت غالب ہو اسی کا استفرغ بذریعہ فصد کریں پھر قابض شربت پلائیں اور قابض ضما د اور آبزین کام میں لائیں۔ شکم اور قابض دواؤں کو سرکہ میں ملا کر ضما د کریں۔ فرز جون میں کافور اور افیون ملائیں۔ جو شانہ مازو میں آبزین کرنے سے مزمن سیلان بند ہو جاتا ہے۔ انگور کی تیل کے جو شانہ کو حقنہ کرنے سے اور آبزین کرانے سے سیلان رحم بند ہو جاتا ہے۔ (سرایون)

آب انگور خام کا حقنہ رحمی صلابتوں میں مفید ہے۔ لال ساگ کا عصا رہ رحم کو بند کرتا ہے۔ (دیسقوریدوس)

مسور کو دو بار ابال کر تیسری بار سرکہ میں پکائیں اس کو کھلانے سے زنف بند ہو جاتا ہے اور اس کو مستقل پینا عورتوں کو سیلان مزمن سے نجات دیتا ہے۔ (جالینوس)

کلوہ کا عصا رہ رحم کے مزمن سیلان کو روک دیتا ہے بشرطیکہ اس کو فرج کے اندر ڈالا جائے۔ (دیسقوریدوس)

زرد طلائی رنگ کا زاج، قلع طار اور زاج کی ایک قسم قلعہ یس کا آب کراث کے ساتھ استعمال قاطع زنف ہے۔ (ابن ماسویہ)

دانہ اناردس کا جو شانہ رحمی سیلان میں مفید ہے۔ (دیسقوریدوس)

گلنار کو سارے اطباء اس بیماری میں استعمال کرواتے ہیں۔ نیز شاد نہ خون حیض روکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ (جالینوس)

لحیہ التیس بالخصوص سرخ رنگ کی عورتوں کے مرض سیلان میں مفید ہوتی ہے۔ خشخاش کو اچھی طرح پیس کر شراب کے ساتھ پینے سے سیلان رطوبت رک جاتا ہے۔

(دیسقوریدوس و جالینوس)

رحم کے خونی سیلان میں کچھ مفید دوائیں:

سنبل الطیب ۱۴ گرام کو مازو کی شراب میں گوند کر بطور حمل استعمال کیا جائے۔

طراشیٹ کا عصا رہ سوادس ملی لیٹر کسی آسمانی کپڑے میں جذب کر کے لگانے سے سیلان طمٹ بند ہو جاتا ہے۔

اقاقیا ۳۰۵ گرام پیس کر رکھیں پھر ایک کپڑے کو آب آس میں تر کر کے اس میں اقا قیا کا سفوف لت کریں اور اس کا حمل کریں۔ زاج (پچٹکری) کو گھول کر رکھ لیں اس کو ایک

کپڑے میں لت کر کے حمل کرنے سے خون حیض بند ہو جاتا ہے۔
خون بوا سیر اور دائمی خون حیض روکنے کی تدابیر:

مستقل پسینہ لانے کی تدبیریں اور کھانے کے بعد قے کرانا اور خون کو روکنے والی غذائیں جیسے بکری کا گوشت، سرکہ، شراب مبرد، دہی، مطبخن شوکر دناک جو سب بارد ہیں کھلائیں۔ گرم غذائیں خواہ وہ گرم بالفعل ہوں یا گرم بالقوت ہوں نہ کھلائیں۔ تازہ مچھلی کھلائیں۔ صدف محرک سات گرام پانی، کچی کھجور، آب ساق اور سفرجل شامل کر کے کھلائیں۔ عوج مع پتوں اور جڑ کے اور آس اور گلاب مع ٹہنیوں کے اور خرنوب ٹبلی، انار کی چھال و گلنار، سبز مازو اور لحیہ التیس کا جو شانہ بنا کر اس میں مریضہ کو بٹھائیں نیز ان دواؤں کی کٹھلیوں کا ضاد بنا کر ناف، کمر، مقام فرج اور مقعد پر ضاد کریں اور فرزجہ رکھیں۔

سات گرام اقاقیا، ۳.۵ گرام مازو اور لحیہ التیس کا عصارہ ہموزن مذکورہ، کچی کھجور اور آب انار ترش میں ملا کر پلائیں۔

سیلان دم زیریں کا فرزجہ۔

تور کی پکی ہوئی ٹھیکری، کاغذ سوختہ، روشنائی، عصارہ لحیہ التیس اور اقاقیا کا آب مازو خام کے ساتھ فرزجہ بنائیں۔

نسخہ دیگر:

رامک مازو، مسک، عقص، پوست انار، اقاقیا اور خرنوب کا آب خرنوب کی مدد سے فرزجہ بنائیں اور مسور کو سرکہ اور حماض اترج میں پکا کر کھلائیں اور بھون کر بھی کھلائیں۔ یہ زنف دم اور بوا سیر کے لئے بہت مفید ہے۔

نسخہ جات برائے استرخاء فم رحم، سیلان مزمن اور قرحہ رحم:

اقاقیا، مازو، گلنار، دم الاخوین، گلاب مع ٹہنی، شمر، عوج، ٹہنی انار، کھجور کی شاخوں کا چھلکا۔ پہلے روئی کے ایک ٹکڑے کو آب آس میں تر کریں اور پھر ان دواؤں کا سفوف اس کپڑے میں لت کر کے رات کو حمل کر کے چھوڑ دیں نیز مازو کا جو شانہ، جفت بلوط، جبث الحدید، شب اور زاج میں آبزین کرائیں۔

ایک نہایت عمدہ فرزجہ:

شب، زاج، اقا قیا اور مازو خام کو کچی کھجور کے پانی میں گوندھ کر فرزجہ کے طور پر استعمال کریں نیز نرف دم کی مریضہ کو مندرجہ ذیل دوا دیں۔

شتر مرغ کے انڈے کا چھلکا اتا جائیں کہ سفید ہو جائے پھر سات گرام رب حصرم کے ساتھ کھلائیں۔

سفید پانی کی شکایت میں مستعمل نسخہ:

مدر بول اشیاء کھلائیں اسی سے سفید رطوبت کا بہنا رک جاتا ہے۔ انیسون اور سماق کا حمول کرائیں۔

نرف دم مع بخار:

مازو خام، گلنار، نشاستہ، افیون، زراوند چینی، گلاب، حب الّاس، سماق، لحيۃ التیس، حب حصرم، کاغذ سوختہ، صندل سفید، قشر کندر، گل مختوم، کلی انار، شاذنہ، لوہے پر کی ٹھیکری، دھنیہ خشک ۴ گرام، ایک سبز کپڑے کو آب آس میں بھگو کر مذکورہ دواؤں کا سفوف لت کر کے رات کو حمول کریں۔

مانع خون حیض اور مانع خون بواسیر:

اقا قیا، گلنار، دم الاخوین، عفص، زاج، آملہ، صدف محرق، (پٹی سوختہ)، برگ اثل، قرن الایل سوختہ، افیون، اجوائن، کافور۔ ساری دواؤں کو آب برگ بید سادہ میں گوندھ کر سفید کپڑے کا فرزجہ بنائیں اور رات میں حمول کرائیں۔ مریضہ کو گرم مقام پر رکھیں اور ٹھنڈا پانی آب حصرم پلائیں اور خوب ٹھنڈے پانی میں آبزین کرائیں۔ آبزین ایک دن میں کئی بار کرائیں۔ غذا کم کر دیں۔ شراب اور گوشت بالکل ترک کرادیں۔ مسور، جمار اور سرکہ البتہ کھلائیں۔ گلزی، کھیرا کھلائیں کمر اور شکم پر صندل کا فور سے طلا کر دیں۔ برگ بید سادہ پر بستر بچھا کر ہوا دار مقام میں مریضہ کو سلائیں۔ حمام میں جانے سے منع کریں۔ یہ بہت کامیاب عمل ہے۔

دیگر نسخہ فرزجہ:

گلنار، وسخ السفود، شب، وج، سرمہ، زیرہ جسے سرکہ میں بھگوا گیا ہو، گل ارمنی، رب

قرظ۔ سب دواؤں کو آب بید سادہ اور آب کشیز میں گوندھ کر رات میں حمل کریں۔ حمل سے پہلے روغن گل میں کاغذ سوختہ ملا کر لگائیں۔ (ابن ماسویہ)
قسط طمٹ نسخہ:

عورت کی ناف اور کمر آہستہ آہستہ سرکہ اور جیسن ملیں اور ضمغ عربی، کثیرا، تخم کتاں گرم پانی کے ساتھ پلائیں۔ آب لسان الحمل، زاج، دم الاخوین اور قرطاس محرک ملا کر رحم کے اندر حقنہ کریں اور گل ارمنی اور سادہ اور از استعمال کرائیں۔
دیگر:

گلنار، سماق، تخم خرفہ، افیون، عصارہ، لحیہ التیس، طین ارمنی، پنیر مایہ، خرگوش اور کھربا ساڑھے ۱۴ ملی لیٹر پلائیں۔ (کتاب التذکرہ)

سیلان طمٹ رگوں کو منہ کھل جانے سے یا مواد کی کثرت سے یا گرمی مادہ سے عارض ہوتا ہے۔ لہذا اگر گرمی اور فضلات سبب ہوں تو یہ دونوں اشیاء سارے جسم سے منتقل ہو کر رحم کی طرف لوٹتی ہیں۔ اس صورت میں رطوبت سرخ خون کے رنگ میں ہوتی۔ اگر بلغھی فضلات ہوں تو باہر خارج ہونے والی رطوبت سفید ہوتی ہے۔ اگر مرہ صفراء غالب ہو تو رطوبت یا مادہ زرد ہوتا ہے۔ (العلل الاعراض)

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ قابض روغنوں کی مالش سے نہ صرف نواحی رحم میں خشکی آتی ہے بلکہ سارا جسم سوکھ جاتا ہے اور یہ مرض نزف غلبہ رطوبت سے عارض ہوتا ہے۔

اگر زیادہ عرصہ تک دواؤں سے فائدہ نہ ہو تو کھانے پینے میں کمی کی ہدایت کر دیں اور سب سے مفید چیز یہ ہے کہ مائی اسہال کرائیں۔ اس کے بعد قوی مدربول کچھ دن تک استعمال کرائیں۔ اس کے بعد پھر ایک بار انھیں دواؤں کا اعادہ کریں اور خشک غذائیں، یں مثلاً پہاڑی پرندوں کا گوشت کھلائیں اور پہلے نرم کپڑے سے مالش کریں اس کے کھردرے کپڑے سے مالش کریں اور اس مالش کو معمول بنالیں کچھ عرصہ تک۔ (جالینوس، نوادر تقدیمہ المعرفہ)
 چھاتیوں میں پچھنے لگانے سے خون حیض رک جاتا ہے جہاں تک ممکن ہو بڑے پچھنے لگائیں تاکہ رحم اور چھاتی کی مشترک عروق سے خلط غالب جذب ہو جائے۔

(کتاب الفصول)

اگر سیلان طمٹ کے بعد تشنج اور غشی طاری ہو جائے تو یہ خراب علامت ہے۔

قلت وکثرت طمث دونوں امراض کے موجب ہوتے ہیں۔

سیلان طمث کے اسباب خواہ خون طبعی سے زیادہ پتلا یا گرم ہو یا قوۃ کا ضعف ہو، جس کی وجہ سے خون اس پر بوجھ بن جائے۔ اگر طبعی اعتدال سے تجاوز نہ ہو تو رحم کی جانب دفع ہو جاتے ہیں۔

جب کبھی حاملہ کو خون آجائے تو اس کا علاج آسان ہے۔ مریضہ کو عصارہ بزرقطونا اور بلج (کچی کھجور) کا عصارہ، گل مختوم، صمغ عربی، رب الآس، فلو نیا فارسی، رسا مطن، قرص کاکنج، قرص کھرباء، طباشیر اور افیون دیں۔ نیز لسان الحمل کا عصارہ پلائیں، لحيۃ التیس جفت بلوط، زاج، دم الاخوین، قاقیا، مازو، آس، کافور، کاغذ سوختہ، گلنار، رسوت اور حبث الحدید کے عصاروں کا فرزجہ رکھیں۔ (ابن ماسویہ۔ کتاب الجام)

اصطبرک اور ختم انگن کو طلاء (ایک قسم کی شراب) میں ملا کر پینے سے فم رحم کھل جاتا ہے۔ اسی طرح حب وعود بلساں دونوں کے جو شانہ سے فم رحم کھلتا ہے۔ یہ دوائیں اس کی رطوبتیں جذب کر لیتی ہیں۔ برنجاسف، روغن زعفران، برگ کراٹ شامی کو پانی اور نمک میں پکا کر ضاد کی طرح لگانے سے فم رحم کھل جاتا ہے۔ (دیسقور دیوس)

مر رحم بند منہ کو نرم کر کے کھولتا ہے مقل یہودی کو پینے سے یا دھونی دینے سے فم رحم کھلتا ہے۔ روغن شب بندش فم رحم کو کھولتا ہے۔ اسی طرح کا فاندہ جو جو شانہ بنی خطمی سے حاصل ہوتا ہے۔ انقلاب رحم کی شکایت میں ارٹڈ کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ خطمی کو شراب میں پکا کر اس میں مرغابی کی چربی اور صمغ بطم ملا کر حمل کیا جائے۔ (دیسقور دیوس)

فم رحم میں رتھ (قرحہ) کبھی زخم لگنے سے عارض ہوتا ہے اور کبھی پیدائشی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں نالی کے نیچے اور اوپر ایک زائد گوشت اُگ آتا ہے۔ (العلل والاعراض)

رتھ فرج زن میں زائد گوشت یا تو پیدائشی ہوتا ہے یا قرحہ سے عارض ہوتا ہے لہذا فرج کا معائنہ کر کے دیکھنے سے ایک عضلہ نما چیز خون کے راستہ کو بند کئے ہوئے نظر آتی ہے۔ اسی لئے اگر فم رحم اوپر کی جانب سے بند ہو تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے اور مقام ماؤف میں درد ہوتا ہے جو رتھ کی علامت ہے۔ (میسون)

اگر رتھ گہرائی میں ہو اور خون طمث جسم میں پھیل کر جسم کو کالا کر دے تو علاج میں جلدی کریں ورنہ اختناق ہو کر مریضہ ہلاک ہو جائے گی۔ اور اگر یہ لحم زائد فم فرج کے اوپر ہوتا ہے تو اس میں جماع کا عمل کیا جاسکتا ہے مگر اس سے نہ تو حمل قرار پا سکتا ہے اور نہ ہی حیض جاری

ہو سکتا ہے اور اگر یہ لحم زائد فم فرج کے اندر واقع ہوتا ہے تو جماع کا عمل ممکن نہیں ہوتا۔
 کبھی رتھہ میں ایک چھوٹا سوراخ موجود ہوتا ہے۔ جس سے پیشاب اور خون حیض
 باسانی خارج ہوتا رہتا ہے لیکن اگر دونوں جمع ہو جائیں تو حاملہ اور جنین دونوں ہلاک ہو جائیں
 گے۔ بات متفق علیہ ہے۔

سدہ اگر فم رحم کے اندر ہے تو اپنے انگوٹھے پر کپڑا لپیٹ کر شفر تین کو زور سے پھیلائیں
 یہاں تک کہ وہ عضلہ باہر نکل آئے پھر ایک کپڑا روغن زیتون اور شراب میں بھگو کر شفر تین کے
 درمیان رکھیں۔ تین دن کے بعد آب شہد میں بٹھائیں اور اچھا ہونے تک مرہم لگاتے رہیں اور
 اس کو تنگ ہونے کے لئے نہ چھوڑ دیں۔

اگر سدہ اندرونی جانب ہے تو صنارہ لیکر اندر داخل کریں اور موجود عضلہ کو باہر کی
 طرف کھینچ لائیں، مبضع سے چیرا لگائیں پھر روئی کا ایک ٹکڑا شراب مازو میں بھگو یا ہوا اس مقام
 پر رکھ دیں اور مریضہ کو مریخیات سے آہن کرانیں اور مرہموں اور ذروقات (دوائی
 پچکاریوں) کے ذریعہ علاج کریں۔ گوشت لانے کے لئے مذکورہ بالا فیتیلے کام میں لائیں اور
 تھوڑا سا بھی اچھا ہو جانے پر اس سے جماع کریں۔

(میسون)

دوسرا باب

اختناق الرحم، سقوط رحم، اطراف کی جانب مائل ہو جانا،
اور فم رحم کا بند ہو جانا۔

میں نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جن کا حمل ساقط ہو گیا تھا اور جو ہوش میں نہ تھیں اور ان کی نبض بہت ضعیف اور صغیر تھی۔ بعض کی نبض تو واضح ہی نہ تھی۔ بعض عورتوں کو دیکھا کہ وہ ہوش میں رہیں حرکت کرتی رہیں۔ ان پر غشی طاری نہیں ہوئی لیکن سانس دشواری سے آتی تھی بعض عورتوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں تشنج تھا۔ میں نے ان سارے مشاہدات سے یہ اندازہ لگایا کہ اختناق الرحم نام کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی تو یہ نوبت آ جاتی ہے کہ عورت زندہ ہے یا مردہ یہی جاننا مشکل ہو جاتا ہے جس کا پتہ آلات کے ذریعہ ہی ممکن ہوتا ہے۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ اختناق رحم کی بیماری صرف بیوہ عورتوں کو ہی ہوتی ہے۔ خاص طور سے وہ عورتیں جن کو حمل جلدی جلدی ہو جایا کرتا ہے اور جن کا حیض منقطع ہو گیا ہو۔ اس لئے ممکن ہے کہ اس بیماری کا سبب احتباس حیض یا احتباس منی ہو۔ زیادہ تر منی کے احتباس کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ منی والے جسم کی عورتوں میں جب منی رک جاتی ہے، باہر نکل نہیں پاتی تو اسی طرح کے اعراض سامنے آتے ہیں جیسا کہ بہت زیادہ منی رکھنے والے جسم کے مردوں کو جماع کا عمل چھوڑ دینے سے لاحق ہوتے ہیں مثلاً اضطراب و پریشانی، سر میں بھاری پن، طاقت میں کمی اور شہوت میں کمی۔ لہذا اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ایسی عورتوں کو اس طرح کے شدید امراض لاحق ہوتے ہیں۔

رحم کا اطراف کی جانب مائل ہو جانا یا اوپر کی جانب سکر جانا۔ خون حیض کے عروق کی طرف جاری ہونے سے اور ان عروق کا منہ بند ہونے سے عارض ہوتا ہے کیونکہ یہ عروق تجویف رحم میں خون حیض کو لوٹا نہیں پاتیں۔ اس لئے رحم ایک جانب مائل ہو جاتا یا سکر جاتا ہے جس کے باعث رحم میں تشنج اور تمدد (کھنچاؤ) کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ اگر رحم سیدھا ہو تو اوپر کی جانب سکر جاتا ہے اور کسی جانب مائل ہو تو اسی جانب سکر جاتا ہے۔ رحم میں احتباس طمث اسی طرح پیدا ہوتا ہے۔ رہا احتباس منی کا معاملہ تو اس سے عورت کو شدید برودت لاحق ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے شدت درد میں سانس نہیں لے پاتیں اور بنض بھی محسوس نہیں ہو پاتی۔ اگر احتباس حیض کی شکایت ہو تو دائی سے نم رحم ٹٹول کر دیکھنے کو کہیں۔ اگر نم رحم بند ہو اور اس میں سختی طبعی حالت سے زیادہ ہو تو دائی اس بات کا پتہ لگائے کہ رحم کس طرف مائل ہے۔ وہاں درد بھی محسوس ہوگا۔ بعض عورتوں میں دیکھا گیا ہے کہ جس جانب رحم سکر رہا ہے اس جانب بوجھ محسوس ہوتا ہے اور درد بھی گھٹنوں تک پہنچتا ہے اور عورت جب چلتی ہے تو لنگڑا کر چلتی ہے۔

(العلل والاعراض۔ باب ۶)

اندر رکا ہوا مادہ منویہ بلغھی کیفیت کا ہو اور بہت زیادہ درد پیدا کرے تو اختناق الرحم کے ساتھ حس و حرکت اور تنفس کا بطلان ہوتا ہے لیکن اگر مادہ منویہ گرم اور لاذع کیفیت میں تبدیل ہو گیا ہو تو اختناق رحم کے ساتھ تشنج ہوگا اور تنفس کا بطلان اسی صورت میں ہوگا کہ مادہ منویہ میں غایت درجہ کی برودت ہو۔

اگر مادہ منویہ سودا کی کیفیت میں بدل گیا ہو تو مایخو لیا عارض ہو جائے گا۔ اس صورت میں اگر مادہ میں برودت کم رہی تو مرض شدید نہیں ہوگا بلکہ حس و تنفس کا معمولی بطلان ہوگا۔

(جوامع الاعضاء الآلمہ)

مادہ منویہ جسم میں مقبض ہو کر خلط جسم کے اعتبار سے تغیر پذیر ہوتا ہے مثلاً اگر جسم پر برودت کا غلبہ ہے تو غایت درجہ کی برودت میں متغیر ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری خلطوں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے۔ (مؤلف)

اختناق الرحم باکرہ عورتوں میں بھی اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ ان کی خواہش باہ کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ (جامع الاعضاء الآلمہ)

اگر اختناق رحم کی مریضہ کے منہ میں جھاگ آجائیں تو فوری سکون ہو جاتا ہے۔

(کتاب الاخلاط)

اختناق رحم سے حلق کا ورم اور ذات الریہ بھی ہو جاتا ہے۔ نسوار لینے سے اختناق رحم دفع ہو جاتا ہے کیونکہ نسوار طبیعت کو جگا دیتی ہے اور اس میں تنقیہ کا عمل ہو جاتا ہے اور اس سے چکی ہوئی اخلاط پھسل جاتی ہیں۔

اختناق رحم کے اعراض تبرغش، ابلیمیا اور سکتہ سے مشابہ ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ میں غشی ہوتی ہے، قوت ختم ہو جاتی ہے، آواز بند ہو جاتی ہے، عمل تنفس کمزور ہو جاتا ہے اور نبض ضعیف ہو جاتی ہے، نیز دانتوں کا کٹکٹانا اور اطراف بدن میں تشنج، نفخ شرا سیف، ارتفاع رحم اور سینہ میں ورم عارض ہو جاتا ہے۔

مرگی اور اختناق رحم میں علامت فارقہ یہ ہے کہ اختناق رحم میں (عام طور سے) منہ میں جھاگ نہیں ہوتے، درد نہیں ہوتا اور ہوش و حواس بحال رہتے ہیں افاقہ ہونے کے بعد مریض اپنے ارد گرد پیش ہوئے واقعات کو بتا سکتی ہے۔ جب کہ مرگی میں ایسا نہیں ہوتا سکتا۔ میں زوردار خراٹے نہیں ہوتے اور سکتے کا مریض اپنے گرد و پیش کی چیز سے بے خبر ہوتا ہے جب کہ اختناق رحم میں حس موجود ہوتی ہے بے خبری نہیں ہوتی۔ (کتاب العلامات)

اختناق رحم میں دھرتا کو آب لوبیا سرخ کے ساتھ مستقل پینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا سداب اور چند قطرے روغن جوز کے بھی شامل کر کے کچھ دن تک پلائیں۔ صافن کی فصد کریں یا پنڈلی میں سنگھی لگائیں تاکہ رحم نیچے کی طرف کھینچ آئے اور ایسا حیض جاری ہونے سے ہو سکتا ہے۔ اور قاطع منی اشیاء مستقل استعمال میں لائیں مثلاً سداب، پودینہ، (فوذنج) فجنکشت حار نہ کہ بارد۔ کیونکہ یہ قاطع منی اور مد رطمت ہوتی ہیں یا پھر انکو ماء الاسمول کے ساتھ پیا جائے۔

قرص اختناق رحم:

برگ فجنکشت، برگ سداب خشک، تخم حرمل، پہاڑی پودینہ، سا سالیوس اور زراوند کی اقراص بنا کر پودینہ و سداب کے جو شانہ کے ساتھ کھلائیں۔ (مؤلف)

اختناق رحم عروق رحم کے خون حیض سے بھر جانے سے عارض ہوتا ہے جس سے رحم کا طول گھٹ جاتا ہے اور عرض بڑھ جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ رحم اوپر چلا گیا ہے۔ اختناق رحم کی ایک وجہ پیپ کی مستقل موجودگی ہوتی ہے۔ یہ مرض بہت زیادہ شہوت زدہ غیر شادی شدہ عورتوں کو بھی ہوتا ہے جب ان کی خواہش جماع بڑھ جاتی ہے اور جماع کا عمل پورا نہیں ہو پاتا

تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ رگ صافن کی فصد کرنے سے پہلے یہ پتہ لگانا ضروری ہوتا ہے کہ رحم کس جانب مائل ہوا ہے اگر دائیں جانب ہے تو فصد دائیں پیر میں کریں ورنہ اس کے برعکس۔ تاہم اگر بغیر کسی جانب مائل ہوئے اوپر کی جانب اٹھ گیا ہے تو جس طرف چاہیں فصد کریں۔

اختناق رحم کا علاج بھی یہ ہے کہ پنڈلیوں کو باندھ دیں اور روغن رازقی میں نمک ملا کر پیروں اور کولہوں کی مالش کریں۔ جند بید ستر سنگھائیں اور مریضہ کے نتھنوں میں کندس کا نفوخ کریں۔ روغن بان اور روغن زنبق رحم کی جگہ چڑھ دیں۔ عود، مشک اور میسون کی دھونی کسی قبف نما برتن کے ذریعہ دیں۔ تمرخ کے بعد رحم پر خوشبوئیں لگائیں اور نخلخہ کریں۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو دائی سے کہیں کہ ہم رحم میں انگلی ڈال کر دیر تک آہستہ آہستہ دلك کریں پھر شتر نایا اور روغن غار کا حمل کریں۔ ران کے اندرونی جانب ناری حجامت بلا شرط کئی بار کریں۔ مریضہ کو کاشم اور میتھی کے جوشاندہ میں آبن کرائیں۔ جب معاملہ شدت اختیار کر جائے تو عورت کے سر پر روغن بان ڈالیں جو بہت اچھے قسم کا ہونا چاہئے۔ عورت کی ناک اور تنفس کو روک کر اس کے حلق میں کسی چیز کا پر داخل کریں تاکہ اسے قئے ہو جائے یا وہ قئے کرنے پر مائل ہو جائے۔

مریضہ کو مجفف منی اور مد رجیض دوائیں کھلائیں۔ جوارش کمونی آب سداب کے ساتھ کھلائیں۔ (یہودی)

میری رائے میں ایسی اشیاء سے حمل کرنا چاہئے جو رحم میں دغدغہ اور چھین پیدا کریں مثلاً سیاہ مرچ، سرمہ کی مانند سونٹھ، شہد یا کزما زج کو بطور حمل استعمال کریں جو بہت عجیب اثر رکھتی ہے اور اگر اس سے بھی زیادہ قوی دوا درکار ہو تو فریون کا حمل کریں کیونکہ یہ فوراً حیض جاری کرتی ہے اور اس سے زنف کا بھی امکان رہتا ہے۔ (مؤلف)

شحم حنظل ۱.۱۶ گرام، سقمونیا ۵۰۰ ملی گرام، مصطکی ۵۰۰ ملی گرام یہ سب ملا کر ایک خوراک ہوا جس سے اختناق رحم میں فائدہ ہو جاتا ہے۔

پنڈلیوں کو اوپر سے نیچے تک مضبوطی سے باندھ دیں اور گرم روغنوں کی مالش اور حمل کریں مثلاً روغن رازقی اور بودار چیز سنگھائیں تاکہ چھینک آئے۔ جوارش کمونی مازو کے جوشاندہ کے ساتھ بھی مفید ہے۔ (مجبول)

اختناق رحم کی بیماری میں عانہ پر سنگھی لگانا مفید ہے۔ (طبری)

اختناق رحم کی بیماری احتباس حیض سے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ عروق متلی ہو کر عرض میں پھیل جاتی ہے اور طول میں چھوٹی ہو جاتی ہے اور اوپر کی جانب سکڑ جاتی ہے۔ غلظت کی وجہ

سے رحم کی بالائی جانب سمٹ کر رحم کو اوپر کی جانب کھینچ لیتی ہے اور حجاب حجاز کو ڈھکیل دیتی ہے جس کی وجہ سے تنگی تنفس اور غشی ہوتی ہے۔

اختناق رحم کی تمام قسمیں رحم کے بالائی جانب ورم آ جانے سے ہوتی ہیں اور یہ ورم یا تو احتباس دم سے یا مادہ منویہ کے احتباس سے پیدا ہوتا ہے جس سے رحم اوپر کی جانب سکر جاتا ہے اور حجاب حجاز سے مزاحم ہوتا ہے جس سے تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج اس طرح شروع کریں کہ دونوں پنڈلیوں کو پٹی سے اچھی طرح باندھیں اور دونوں پیروں پر روغن رازقی سے زوردار مالش کریں۔ مالش پنڈلیوں، کولہوں اور کمر تک ہونا چاہئے اور بودار اشیاء سوگھائیں اور کندس بھی سنگھائیں۔ خوشبودار شافے حمل کرائیں مثلاً رازقی اور نار دین کے شافے، مشک اور عود کی دھونی دیں۔ ایک پتھر کو گرم کر کے اس پر میسون اور نضوج وغیرہ گرم کر کے رحم کے قریب کریں۔ رحم کے مقام پر خلوق اور خوشبودار اشیاء کا طلاء کریں دائی سے کہیں کہ کوئی لطیف روغن نم رحم پر آہستہ آہستہ لگائیں۔ مثلاً روغن بابونہ، روغن غار، روغن قیسوم، روغن سوسن۔ ران کے اندرونی جانب بغیر کچھنے کی سینگھی لگائیں اور مریضہ کو منزل حیض پانیوں کا آبز ن کرائیں۔ مثلاً ابھل، مرزنجوش، سویہ، قیسوم کا جو شانہ۔ اور یہ پانی پیڑ پر بھی دھاریں۔ مناسب حقنہ کریں اور مجفف منی اور مدر حیض دوائیں دیں۔ مثلاً مندرجہ ذیل دوائیں۔

زیرہ کو آب سداب کے ساتھ یا آب فنجکشت یا آب کرفس کے ساتھ پلائیں اور مندرجہ ذیل حمل مول کریں۔

بطخ کی چربی اور روغن بلساں پہلے چربی کو روغن سوسن میں ملا کر اس میں خوشبودار دوائیں ڈالیں یا پھر اسی طرح سے دوسرے حمل بھی استعمال کئے جاسکتے ہیں مثلاً مر، حماما، زعفران، لبنی اور علك الانباط۔ (أھرن)

درد کے ساتھ کبھی ضیق النفس اور ذبحہ (۱) کی بھی شکایت ہوتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ رحم سے حجاب حجاز کی مشارکت ہوتی ہے اور حجاب حجاز سے خلق کی مشارکت ہوتی ہے۔

اختناق رحم کے مرض میں راحت کے دوران خراب سوچ، کسل و ماندگی، پنڈلیوں میں کمزوری، چہرے میں پیلاہن اور آنکھوں سے پانی بہنے کی شکایت لاحق ہوتی ہے اور جب دورہ پڑتا ہے تو غشی، حس و حرکت غائب اور عمل تنفس غیر طبعی ہو جاتا ہے۔ پنڈلیوں میں کھنچاؤ ہوتا ہے

(۱) اصل نسخے میں لفظ ذبحہ موجود ہے۔

اور چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کا اثر ہونٹوں پر بھی ہوتا ہے جب دورے سے راحت ہونے والی ہوتی ہے تو رحم سے رطوبت ظاہر ہوتی ہے۔ شکم میں قراقر ہوتا ہے جو آنتوں سے آتا ہے اور رحم ڈھیلا ہو کر تھوڑا سا نیچے کو آنے لگتا ہے پھر عقل اور حس و حرکت واپس آ جاتی ہے۔ اس مرض کے مرگی کی طرح دورے ہوتے ہیں۔ دورے کے درمیان اچانک موت کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ نبض متواتر، مختلف اور منقطع ہو جاتی ہے۔ ہلکا پسینہ جسم پر آتا ہے۔ سانس پہلے سے کمزور ہو کر رکنے لگتی ہے۔ یہ مرض زیادہ تر موسم سرما و خریف میں ہوتا ہے۔ زیادہ شہوت والی عورتوں کو ان کی خواہش جماع کے مطابق ضرورت پوری نہ ہونے کے سبب ہوتا ہے۔ دورہ کے وقت پنڈلیوں کو باندھ دینا چاہئے اور ہلکی ہلکی مالش کرنا چاہئے اور غشی کو دور کرنے کے لئے جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں وہ کرنا چاہئے تاکہ سانس لوٹ آئے بودار چیز سنگھائیں۔ کنجران اور شکم کے زیریں حصہ پر پچھنے لگائیں اگر دور طول پکڑ جائے تو مخرج ریاہ اشیا سے فائدہ ہوتا ہے مثلاً کمون اور انیسون۔ دورہ طویل ہونے کی صورت میں مندرجہ ذیل فتیلہ دبر میں حمل کریں اور اسی طریقہ سے براز کو خارج کرنے والے حقنہ دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے رحم اپنی جگہ آرام سے پھیل جاتا ہے۔ خوشبودار روغن رحم میں ڈالیں تاکہ وہاں نرمی آئے اور کھنچاؤ میں کمی آئے۔ روغن اقحوان، روغن ساج نیز خردل کا سعوٹ کریں۔ پیروں پر مالش کرنے کے بعد خردل کا لیپ کریں۔ کانوں میں زور سے چیخیں، ناک میں کندر کا نفوخ کریں اور ہوش آنے کا پر فلفل کا نفوخ کریں۔ کھانے سے قبل قے کرائیں۔ ہفتے میں ایک بار ایارج شحم حصل سے اسہال کرائیں۔ تین دن بعد ریڑھ اور پیٹ (مراق) پر پچھنے لگائیں اور جند بیدستر ایک بار پانی کے ساتھ اور ایک شربت شہد کے ساتھ پلائیں۔ ملین فرزجہ اور آبز ن استعمال کریں اور فصد کریں۔ ایارج فیرا اور شحم حظل ہر تیسرے روز دیکر تعقیہ کریں۔ گرم پانی اور ضامحمرہ استعمال میں لائیں۔ (بولس)

ایسی اشیا استعمال کریں جو خون کو صفراء کی طرف مائل کر دیں۔ (مؤلف)
اختناق میں سنگجین مفید ہے، پنڈلیوں کا باندھنا مفید ہے، کنج ران اور رانوں پر سنگھی لگانا مفید ہے، بدبو سنگھانا مفید ہے، اور خوشبودار اشیا کے شافوں سے حمل کرنا مفید ہے۔
(اسکندر)

اختناق رحم کی مریضہ کو میٹھی، کاشم اور عطمی کے جوشاندہ میں آب زن کرائیں۔ بدبو سنگھائیں اور رحم کو خوشبو سے بسائیں۔ مریضہ کا سانس روکیں اور کسی پر کو حلق میں ڈال کر

قئے کرائیں۔ اس عمل سے اس کے ہوش و حواس فوراً واپس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ مسخن، ملین روغنوں مثلاً روغن سوسن میں کپڑے کو تر کر کے حمول کرائیں اور ایک گھنٹہ میں کئی بار رحم کی تکمید کریں۔ اگر مریضہ پر غشی طاری ہو تو چھینک لانے والی دوا استعمال کریں۔ قئے کرائیں اور سانس روکیں بلکہ اگر اس سے ہوش نہ ہو آئے تو سر پر خوب گرم تیل ڈال کر سخت ہاتھ سے درمیان سر کو رگڑیں اور جھکلیں نہیں عورت کی ناک کو دبا کر اس کا عمل تنفس روک دیں۔ اس سے وہ بہت جلد ہوش میں آ جائے گی۔ (شمعون)

اس معاملہ میں سیلان رحم کی علامات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

عورت مردہ کی طرح دکھائی دیتی ہے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور جب غشی سے سکون ہوتا ہے تو سر میں، گدی میں، کمر میں اور کوکھ میں درد محسوس ہوتا ہے۔ مریضہ کا رنگ گوشت کی دھون جیسا ہو جاتا ہے اور سیاہی مائل جیسا دکھائی دیتا ہے اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو دیکھیں کہ احتناق کا سبب کیا ہے۔ احتباس طمث ہے یا فقدان جماع اور اگر احتباس طمث اس کا سبب ہے تو مدرات کا استعمال کرائیں کیونکہ مد رطمث اور مد ر مادہ منویہ کی دوائیں مشترک ہیں لہذا لذیذ چیزوں، چربیوں و گودوں، روغن سوسن، روغن قسط، روغن زرخس اور روغن ارنڈ کا حمول کریں نیز حب سکنج یا روغن ارنڈ کو آب میتھی اور آب حسک کے ساتھ پلائیں۔ (شمعون)

احتناق رحم اگر احتباس طمث کی وجہ سے ہو تو فوراً عمل فصد کر دینے سے آرام مل جاتا ہے لیکن اگر یہ سبب نہ ہو اور جسم میں امتلا کی کیفیت بھی موجود نہ ہو تو فصد ہرگز نہ کی جائے کیونکہ فصد کرنے سے مرض بڑھ جائے گا بلکہ غشی کے اصول علاج پر حرارت کو بیدار کرنا مقصود ہونا چاہئے۔

جیسے ہی عورت کو مرض کے آثار ظاہر ہوں اس کے ہاتھ پیروں کو باندھ دیں۔ دونوں گھٹنوں کی خوب مالش کریں یا باندھ دیں۔ اسی طرح پنڈلیوں کی مالش کریں، بدبو سنگھائیں، حالبین پر اور رانوں پر اور شراسیف کے قریب کچھنے لگائیں اور مقعد میں محلل ریاح دواؤں کی بتی رکھیں مثلاً سفوف سداب کو ہمراہ شہد ملا لیں اور اس میں تھوڑی مقدار زیرہ اور بورق کی بھی شامل کر دیں۔ اس کی بتی بنا کر استعمال کریں۔ نیز مقعد پر اس کا طلاء بھی کریں اور خوشبودار فرز جوں کے حمول بھی کریں۔ مریضہ کے کانوں میں زور سے چیخیں اور چھینک لانے کی تدبیر کریں۔ دورے کے درمیان رگ صافن کی فصد کریں۔ ایک ہفتہ بعد شحم حنظل کا ایارج کھلائیں اور چند بید ستر دیں۔ میتھی اور بزرگتاں کے مطبوخ میں آبز ن کرائیں۔

غار یقون کو کسی مشروب کے ساتھ پینا یا اظفار الطیب کو کسی مشروب کے ساتھ پینا یا سرکہ پیاز کا بار بار گھونٹ گھونٹ لینا بھی مفید ہے۔ (اور بیاسیوس)

چونکہ اس اختناق میں برودت کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے گرم اشیاء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پنڈلیوں کو باندھنا حالبین پر کچھ نہ رکھنا تا کہ رحم نیچے کی جانب کھینچ آئے مفید ہے اور بہتر ہے کہ کچھ نہ اس جنگا سے پر رکھے جس کی جانب رحم مائل ہے اور یہی اصول بندش میں بھی ملحوظ رکھیں۔ (کتاب جوامع اغلو قن)

شراب سے قطعی پرہیز کریں لیکن ہاتھ پیروں کو گرمی پہنچائیں اور باندھیں۔

(رسالہ فیلگر یوس)

میرے پاس ایک مریضہ بیہوشی کی حالت میں لائی گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ پیروں کے دبانے کا حکم دیا اور شکم کے زیریں حصہ میں کچھ نہ لگایا۔ مریضہ کو اس سے فائدہ ہو گیا اور وہ ہوش میں آ گئی۔ (رسالہ فیلگر یوس درد در شکم)

مرض اختناق رحم میں عورت کی بچے دانی اوپر کی جانب کھینچ جاتی ہے اور قلب و دماغ کی دموی پرورش کرنے والی شریان سباطی متاثر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نبض اور تنفس باطل ہو جاتے ہیں یا بہت ضعیف ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب مادہ منویہ کا داخلی طور پر تھپس ہو جانا ہے نیز یہ احتباس طمث سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب دورہ پڑنے والا ہوتا ہے تو عورت کے اندر سستی، ضعف عقل اور ایک یا دونوں پیروں میں کمزوری ظاہر ہوتی ہے اور چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ پھر جب درد کا دورہ پڑتا ہے تو مریضہ کی حس و حرکت اور آواز زائل ہو جاتی ہے اور اس کے تنفس کی رفتار اتنی صغیر ہو جاتی ہے کہ محسوس نہیں ہوتی۔ نبض صغیر ہو جاتی ہے، پنڈلیوں میں تشنج اور ہتھیلیاں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اگر دورہ ختم ہوتے ہوتے مریضہ کی فرج سے رطوبت خارج ہو جائے تو اس کے ہوش حواس بحال ہو جاتے ہیں۔ مرض بڑھ جانے پر اس کا دورہ مرگی جیسا ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ پنڈلیوں کو باندھا جائے اور ہلکے ہلکے مالش کی جائے۔ اسی طرح رانوں اور کولہوں کی بھی مالش کی جائے۔ بدبو سنگھائی جائے اور خوشبو کا حمل کیا جائے۔ سب سے بہتر تدبیر غالبہ کا استعمال ہے۔ ہر مخن ملین فرز بے رکھیں جائیں تا کہ رحم نیچے کی جانب آ جائے۔ اور اگر ضرورت پڑے تو جنگا سوں اور زیریں شکم میں پچھنے لگائیں اور دانی سے کہیں کہ اپنی انگلیوں میں روغن بان، روغن سوسن و روغن حنا لگا کر رحم تک پہنچائے اور اس میں دغدغہ کرے اور مریضہ کے کان میں زور سے چیخیں۔ ناک میں کندس کا نفوخ کریں۔ جب دورہ ختم

ہو جائے تو وقفہ سے قئے کرائیں۔ کاسرریاح اور مادہ منویہ کو کم کرنے والی تدابیر اختیار کریں۔ فرزجہ اندر رکھیں اور بابونہ، مرزنجوش، برنجاسف، عظمی کی جڑ، قنطاریون وغیرہ کے جوشاندہ کا حمول کریں۔ آبزین کے دوران سر پر سرکہ ملا ہوا روغن گل جس میں سداب، برگ غار اور تھوڑا جندبیدستر ڈال کر پکالیا گیا ہو، لگائیں۔ باری کے ساتویں دن شاز ریطون یا آب شواصرا پلائیں۔ اس سے ان مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ سرکہ اشقیل گھونٹ گھونٹ پینا اور دھرتا بہت مفید ہوتا ہے اس میں سے ۳.۵ گرام لے کر آب مرما حور اور آب شواصرا کے ساتھ پلائیں یا کسی ایسی دوا کے ساتھ جو مجفف منی اور مد رجض ہو جیسے حب فقہ، سداب، فجنکشت تازہ کا پانی اور کالج ہمراہ آب انیسون و قرفل پلائیں۔ اسی طرح روغن ارنڈ آب اصول کے ہمراہ پلانا بھی بہت مفید ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔

جاوشیر ۳.۵ گرام، جندبیدستر ایک گرام تیز شراب کے ہمراہ پلائیں اگر مریضہ متحمل ہو سکے تو رگ صافن کی فصد کریں اور پنڈلی کی حجامت سے علاج شروع کریں۔ خاص طور سے اس صورت میں جب کہ احتباس طمث کی علامت ہو اور جسم میں امتلائی کیفیت ہو۔ ایارج روغن اور ایارج فیقر اسے اسہال کرانا بہت مفید ہے۔ ۳.۵ گرام لے کر جوشاندہ سداب و شبث میں گوندھ کر استعمال کریں۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو رحم اور اریات کا ضما د کریں۔ رانوں، پیڑوں، پیروں اور کوکھ پر فریون، عاقر قرحا، رازقی، فلفل، موم، روغن سوسن ملیں۔ اگر مذکورہ ضما د کا متحمل نہ ہو تو اس روغن کو پکا کر تمرخ کریں اور گرم ہتھوں اور گرم و ملین شافوں سے علاج کریں۔ اگر اس سے کامیابی نہ ہو تو دوبارہ مذکورہ تدابیر کا اعادہ کریں اور بار بار بتحقیق وغیرہ کرائیں۔ اگر مریضہ اس کو برداشت کر لے تو مذکورہ علاج کا پھر اعادہ کریں سوائے فصد اور اسہال کے۔ (سرا بیون)

اختناق رحم میں حرارت عزیز یہ جو پھیپھڑوں کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ برودت سے مغلوب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عدم تنفس لاحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تنفس اتنا کم ہو جاتا ہے کہ سینہ میں خفیف حرکت بھی محسوس نہیں ہوتی ہے جو شرا سیف تک محدود رہتی ہے۔ باقی اجزاء جسم میں حرکت اسلئے نہیں ہوتی کہ وہ حرکت کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ مرض مردوں کو بھی ہوتا ہے لیکن اکثر و بیشتر عورتوں کو ہی لاحق ہوتا ہے اور خاص طور سے بانجھ عورتوں کو ہوتا ہے کیونکہ وہ دودھ نہیں پلاتیں۔ (علل تنفس۔ باب اول)

اس مرض میں نسوار لینا مفید ہے خواہ اختناق کا سبب کچھ بھی ہو۔

(کتاب الفصول - باب ۵)

یعنی اختناق بالذات ہو یا اس کا کوئی حادث ہو۔ (مؤلف)

اختناق کی اس قسم میں فصد کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر مریضہ غیر شادی شدہ ہو

جلدی ہی اس کی شادی کا انتظام کریں۔ (بقراط - کتاب اوجاع العذاری)

اختناق رحم عشی سے زیادہ شدید مرض ہے کیونکہ عشی کا مریض اگر اس کے کان میں چیخا

جائے تو سن لیتا ہے لیکن اختناق میں نہیں سنتا۔ اس مرض میں پنڈلیوں کو باندھ دیں اور جنگا سوں

کو بچھنے لگائیں۔ اگر (رحم) کسی ایک جانب مائل ہو گیا ہو تو مخالف جانب میں ہچھنے لگائیں اگر

اوپر کی جانب سکر گیا ہو تو دونوں جانب ہچھنے لگائیں بد بودار اشیاء سنگھائیں اور خوشبودار اشیاء

کا بطور محمول کرائیں۔ (جوامع غلو قن)

اختناق رحم اس حالت میں بھی ہو سکتا ہے کہ رحم کسی جانب نہ سکر ا ہو لہذا اس صورت

میں مراق اور حاملین کا امتحان کیا جائے اور سبب کا پتہ کیا جائے۔ اس کا علاج عشی کے اصول پر

ہوتا ہے۔ (مؤلف)

کسی دوسرے مقام پر واضح کیا جا چکا ہے کہ اختناق رحم کا کوئی اطمینان بخش سبب موجود

ہو۔ (طیماوس طبی)

اختناق رحم کے دورے کی حالت میں پیروں کو باندھ دینا چاہئے اور کولہوں میں بچھنے

لگانا چاہئے بد بودار چیز سنگھانا چاہئے اور عطر کی پھیری اندام نہانی میں رکھنا چاہئے۔ زور سے

چیخنا اور مریض کو حرکت دینا چاہئے جب افاقہ ہو جائے تو مدر طمٹ اور مقلل المنی غذائیں اور

دوائیں استعمال میں لانا چاہئے۔ (فیلگر یوس) (۱)

غار یقون اختناق الرحم کی مانی ہوئی دوا ہے۔ اس کے علاوہ سفوف سداب کو شہد میں

گوندھ کر فرج، مقعد اور پیڑوں میں طلاء کرنے سے دورے سے نجات ہو جاتی ہے۔

جاو شیر کو کسی مشروب کے ساتھ لینا مفید ہے۔ سا سالیوس پینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔

(کتاب المفردات)

اس قسم کا اختناق حاملہ عورتوں کو لاحق نہیں ہوتا۔ (بقراط - کتاب الجنین)

مدر طمٹ اور مجفف دواؤں سے علاج کریں کثرت سے جماع کیا جائے تاکہ خون حیض

(۱) اصل نسخہ میں لفظ فیلگر یوس ہے۔ جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔

اور محبوس منی کا استفراغ ہو جائے اور حمل ٹھہرانے کی کوشش کریں کیونکہ حاملہ ہونے سے بیماری زائل ہو جائے گی۔ اس کی نوعیت عمل یہ کہ رحم نیچے کی جانب مائل ہو جاتا ہے اور اس کا رخ دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اس میں رطوبت آ جاتی ہے۔ (مؤلف)

مہبل کو روغن سوسن یا روغن حبۃ الخضر یا نرگس سے لت کر دیں اور درمیانی انگلی رحم میں داخل کر کے مذکورہ روغنیاں سے اندرونی طور پر مالش کریں۔ ملحوظ رہے کہ اگر کوئی ٹھنڈی چیز تھوڑی سی بھی خارج ہو جائے تو درد فوراً سکون پاتا ہے۔

لبے شافے حمل کریں درد میں شافوں سے یا مذکورہ روغنوں سے سکون مل جاتا ہے۔ تاہم اگر دورے میں شدت ہو جائے اور غشی طاری ہو جائے اور نیند غائب ہو جائے تو مخدرات سے حمل کریں۔ سکون کی حالت میں جب شیطرج و ممتن کھلائیں۔ تنقیہ ہو جانے کے بعد شحزنا یا دھرتا زیرہ اور فلافل دیں۔ پھر استفراغ کی طرف توجہ کریں یہاں تک کہ مرض بالکل ٹھیک ہو جائے لیکن فصد صافن اور حجامت ساق کا عمل نہ چھوڑیں۔ (سابور)

اس مرض میں پہلے یہ بات سمجھنا ہے کہ سبب مرض منی سے متعلق ہے یا حیض سے پھر اسی اعتبار سے علاج کریں۔

اگر چہرہ لٹکا ہو، شگفتگی جاتی رہے اور سفید دکھائی دے تو فصد نہ کریں اور لطیف تدابیر اختیار کریں اور مذکورہ دواؤں کو استعمال میں لائیں تاکہ اگر چہرے کا رنگ کالا سرخ مائل بہ کمودت ہو تو فصد کریں حیض جاری کریں۔ (مؤلف)

اطراف رحم پر روغن بان اور اچھی شراب ربیحانی لگائی جائے فائدہ مند ہے اور روغن ناردین و روغن بلساں سے تیار کئے ہوئے خوشبودار مسخن شافے بھی مفید ہیں۔ شراب قطعانہ استعمال کریں۔ کسی روئی کے ٹکڑے کو روغن ناردین اور شراب میں ڈبو کر پیڑ و اور ریڑھ پر بالمقابل کر کے رکھنا اور اطراف کا باندھنا اور مالش کرنا اور بدبو سنگھانا مفید ہے۔

(فیلغریوس رسالہ در اختناق الرحم)

جڑ سے مرض کو ختم کرنے کے لئے دورہ ختم ہونے کے بعد اطراف کی مالش کریں اور ریڑھ پر حجامت کریں۔ (ابن ماسویہ)

شحزنا یا دھرتا زیرہ روغن سوسن سے تیار کیا ہوا بندقہ کا بطور حمل استعمال اختناق و میلان رحم میں مفید ہے۔ بچہ دانی کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب پھر جاتی ہے اس سے بعض اوقات آنت اور مسانے پر دباؤ پڑتا ہے جس سے بول و براز رک جاتا ہے۔ (مسح)

حسب قاعدہ رگ باسلیق کی فصد کھولیں بشرطیکہ اختناق الرحم، احتباس طمث کے بعد عارض ہوا ہو۔ اس عمل سے سانس فوراً جاری ہوتی ہے۔ لطیف تدابیر کرنی چاہئیں۔ دورے کے دن مکمل فاقہ کرائیں۔ مریضہ نے اگر کھانا کھالیا ہو تو قے کرائیں۔ اس کے لئے زیرہ اور مرچ سیاہ کے مرکبات فائدہ مند ہیں نیز مقلل منی، مدبر حیض دوائیں مفید ہوتی ہیں۔ ایارج کے استعمال سے مادے کا استفراغ کریں اور لطیف تدابیر اختیار کریں۔ (مسح)

گرم دازی کا نبیذ اور اس کا شافہ استعمال کریں۔ (الطب قدیم)
جب عورت بلوغت کو پہنچ جاتی ہے اور شادی نہیں ہوتی تو خون رحم کی جانب مائل ہو کر اپنا منفذ ڈھونڈتا ہے۔ منفذ نہ پا کر اوپر حجاب اور قلب کی جانب لوٹ جاتا ہے جس سے جنونی کیفیت لاحق ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں فصد کریں نیز عورت کی شادی کریں چنانچہ حمل قرار پاتے ہی مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ (کتاب اوجاع العذاری)

اظفار الطیب کی دھونی سے اختناق میں فائدہ ہوتا ہے اور آدمی کے بالوں کو جلا کر دھونی دینے سے مریضہ نیند سے چونک کر اٹھ جاتی ہے۔ (بولس)
انفیہ القوقن پیڑ مایہ اختناق رحم کی مریضہ کو موافق آتا ہے جیسا کہ شروع میں مذکور ہو چکا ہے۔ نیز اشقیل کا سرکہ اختناق رحم میں مفید ہے۔ (اطہور سفس)

ہمراہ سرکہ افسنین کا شراباً استعمال مفید ہے۔ پیشاب کی تلچھت کو روغن حنا کے ساتھ جوش دیکر حمل کرنے سے اختناق رحم سے ہونے والا درد رحم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جاو شیر کو کسی مشروب کے ساتھ پینا بھی مفید ہے۔ کندر کی ہلکی دھونی با مفید ہوتا ہے۔ بادام تلخ بھی اس معاملہ میں اچھی چیز ہے۔ لسان الحمل کے پتوں کا عصا رہ بھی مفید ہے۔ اختناق الرحم میں لسان الحمل کا حمل بھی مفید ہے۔ روغن مرزنجوش جو مسخن اور ملطف ہوتا ہے فم رحم کے بند ہو جانے میں جو اختناق الرحم کا موجب ہے، مفید ہے۔ اس مرض میں شراب کی بہ نسبت پانی زیادہ مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس)

سکینچ کو سرکہ میں ملا کر سنگھانے سے اختناق رحم کی مریضہ چونک کر اٹھ جاتی ہے۔
سا سالیوس کی جڑ اور اس کا تخم بھی مفید ہے۔ (روفس)

سدا ب کو شہد میں پیس کر فرج سے مسانہ اور مقعد تک لت کرنا بھی ایسی مریضہ کیلئے مفید ہے۔ فاسفس نام کا جانور ناک میں سنگھانا مفید ہے۔ قفر کا حمل کرنا دھونی دینا اور قفر سنگھانا ہر طرح سے مفید ہے۔

قنہ کی دھونی دینے سے مریضہ ہوش میں آتی ہے، ۹ گرام غاریقون کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، خردل کو اچھی طرح پیس کر سنگھانے سے اختناق رحم کی مریضہ چونک کر اٹھ جاتی ہے۔
(دیسقوریوس)

قطران وغیرہ سنگھایا جائے اور مقام رحم اور ناف کے زیریں حصہ پر اس کا ضماد کیا جائے اور خوشبودار اشیاء کا محمول کیا جائے، اطراف کو باندھا جائے اور گرمی پہنچائی جائے۔
روغن بلساں اور روغن ناردین کا محمول کیا جائے۔ شراب سے قطعی پرہیز کرائیں اور دلہا اور نیم برشت انڈا کھلائیں۔ (فیلگریوس)

اختناق رحم میں یا تو عمل تنفس اور حس و حرکت بالکل باطل ہو جاتے ہیں جس کا سبب مادہ منویہ کی شدید برودت ہوتی ہے۔ یا پھر صغیر تنفس واقع ہوتا ہے جس کا سبب مادہ منویہ کی ہلکی برودت ہے یا تشنج کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب یہ ہے کہ مادہ منویہ میں صفراء اور حدت کا غلبہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سانس میں بدبو ہوتی ہے جس کا سبب مادہ منویہ کی سوداویت ہے۔ (اعضاء الالمہ)

کبھی یہ مرض باکرہ اور شہوت زدہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر مادہ منویہ کی کثرت ہو اور عورت غیر شادی شدہ ہو تو ایسا ہونا قرین قیاس ہے۔

علاج:

پنڈلیوں کو باندھیں اور روغن رازقی میں نمک ملا کر ریڑھ، کولہے اور رانوں پر زور دار مالش کریں نیز نتھنوں میں کندس کا نفوخ کریں اور مقام رحم پر روغن ناردین چھڑیں اور نیچے سے عود کی دھونی دیں اور وہاں پانی بہائیں اگر اس فائدہ نہ ہو تو انگلی مہبل میں داخل کر کے اچھی طرح دغدغہ کریں اور شخڑنایا کا محمول کریں۔ فم رحم میں روغن غارملیں اور ران کے اندرونی جانب حجامت بلا شرط لگائیں۔ اگر بے ہوشی ہے تو عورت پر جوش کیا ہو اور روغن بکائن ڈالیں یا اس کے نتھنوں اور منہ کو بند کر کے سانس کو روک دیں۔ لیکن یہ عمل ایک مدت کے اندر ہی ہونا چاہئے۔ حلق کے اندر پر ڈال کر قنہ کرائیں اور مجفف منی اور مدر حیض دوائیں کھلائیں جیسے جوارش کمونی، آب سداب یا آب فجنکشت کے ساتھ۔ (یہودی)

بچے دانی کے درد سے عارض ہونے والی غشی شدید اضطراب کے ساتھ واقع ہوتی ہے۔ آواز بند ہو جاتی ہے۔ حس باطل ہو جاتی ہے، دانت ککھلتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کے

اطراف ماند پڑ جاتے ہیں، شرا سیف پھول جاتے ہیں اور رحم اوپر کی جانب کھینچ جاتا ہے۔ سینے میں ورم ہو جاتا ہے حرکت نبض میں کمی واقع ہو جاتی ہے یہ تمام علامتیں بغیر بخار کے ہوتی ہیں۔

بچے دانی کے درد کی ایک دوسری قسم اسی جیسی ہوتی ہے بس فرق یہ ہے کہ یہ بخار کے ساتھ ہوتی ہے اور بخار کم ہونے پر کمزوری واقع ہوتی ہے اس کے اور مرض لیشر غش کے درمیان امتیازی علامت یہ کہ لیشر غش میں بخار ہوتا ہے جب کہ اس قسم کے درد میں بخار نہیں ہوتا نیز اس قسم کے درد میں نبض متلی بھی نہیں ہوتی ہے اور لیشر غش کے برخلاف درد بچے دانی میں ہوتا ہے سر میں نہیں۔ رحم بالائی جانب مائل ہوتا ہے اور اس کے اور مرگی کے درمیان امتیازی علامت یہ ہے کہ اس میں منہ سے جھاگ نہیں آتا نہ تشنج ہوتا ہے اور نہ بہت خراٹے آتے ہیں۔

(جالینوس - کتاب العلامات)

علامت اختناق یہ ہے کہ درد گدی اور کمر میں ہوتا ہے اور مہبل سے بہنے والی رطوبت سیاہی مائل ہوتی ہے۔ اس طرح گویا کہ تازہ گوشت کی دھوون میں توڑے کی سیاہی ملا دی گئی ہو۔

عسر البول کی شکایت ہوتی ہے اور مریضہ میں مرگی کے مریض جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

سانس رک جاتا ہے اور نبض ڈوبنے لگتی ہے۔ (جورجس)

یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اس مرض میں کوئی علامت بالکل معتبر نہیں ہوتی۔

(طیباؤس)

چھینک Sneezing (عطاس) اس مرض کی ایک واضح علامت ہے۔

(الفصول)

ایک مریضہ کو ملاحظہ کرتے وقت میرے پاس کوئی دوا نہ تھی۔ اسے اختناق الرحم عارض تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پیردبانے کی ہدایت دی اور شکم کے زیریں حصہ میں کچھ نہ لگوا یا وہ اچانک اٹھ بیٹھی اور اس کی قوت لوٹ آئی۔ (فیلگریوس)

کچھ ناف کے نیچے لگائے جائیں تاکہ وہ پوری قوت سے رحم کو کھینچ کر نیچے کی جانب کر دیں۔ (مؤلف)

میں نے بہت سی مریضاؤں کو دیکھا جو بستر پر پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے بعض ایسی تھیں جو بمشکل سانس لے پاتی تھیں اور بعض بے حس و حرکت تھیں اور نبض اتنی صغیر تھی کہ بالکل ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ بعض میں تھوڑی بہت حرکت بھی تھی بعض ایسی بھی تھیں جو اکثر چیزوں کا احساس کرتی تھیں اور ان کو ضرر نہیں پہنچا تھا کیونکہ اس سے کچھ کہا گیا اس پر انھوں نے عمل کیا

لیکن کبھی کبھی ان کے ہاتھ پاؤں میں تشنج ہوتا تھا۔ (الاعضاء الآلمہ)

بعض عورتوں کو واردات کا احساس رہتا ہے اگرچہ ان کے ہاتھ پیروں میں تشنج ہوتا ہے اور بعض پر تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ زندہ ہیں یا مردہ۔ اور یہ کیفیات اکثر ان عورتوں پر طاری ہوتی ہے جن کے اندر منی کی کثرت ہوتی ہے۔ چنانچہ جس طرح کثیر المنی مردوں کو جماع سے رکے رہنے میں بدہضمی اور برودت بدن کا عارضہ ہو جاتا ہے اسی طرح ان عورتوں میں احتباس منی ہو کر شدید برودت بدن لاحق ہو جاتی ہے اور اس کی مضرت احتباس طمث سے زیادہ ہوتی ہے خاص طور سے ان عورتوں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے جن کے لئے رطب اور مہر مدتہ بیریں اختیار کی گئی ہوں۔ کیونکہ پہلے کثرت سے جماع کرتی رہیں پھر اچانک یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اس لئے یہ بات طے شدہ ہے کہ ان میں یہ بیماری خون حیض کے احتباس سے نہیں ہوئی بلکہ منی کے سبب سے ہوئی۔ چنانچہ ایک عورت جس کو یہ عارضہ پیش آیا تھا اس کے بارے دائی نے اطلاع دی کہ اس کا رحم اوپر کی جانب سکر گیا ہے۔ میں نے کچھ چیزوں کا حمل تجویز کیا جس سے اس عورت کو سخت عارض ہو گئی لیکن جونہی ان چیزوں کی گرمی اور ہاتھ کی ملاست فرج میں ہوئی اس عورت کو کسی قدر درد کے ساتھ ایسی لذت ہوئی جیسے جماع کرنے سے ہوتی ہے اور مہبل سے غلیظ رطوبت خارج ہوئی جس کے بعد اس کو آرام ہو گیا۔

در اصل رحم کا اوپر ہونا یا جوانب میں مائل ہونا رفتہ رفتہ عروق کے پُر از خون ہونے سے ہوتا ہے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز اوپر ہو جاتی ہے تو اس کا طول گھٹ جاتا ہے لیکن یہ طبیعیات کی بحث ہے اس لئے اس کو اسی کے تناظر میں پڑھا جائے اور یہ کیفیت احتباس حیض سے ہوتی ہے۔ (اعضاء الآلمہ)

جوارش کمونی اختناق کے لئے مفید ہے جبکہ آب سداب کے ساتھ اسے لیا جائے۔ اس کے علاوہ تمام وہ چیزیں جو منی کو خارج کریں اور مخفف ہوں مفید ہیں۔

(اقر بادین ابن سراہیون)

پنڈلیوں کو باندھ کر پیروں کی مالش کریں اور ریڑھ پر بھی کریں۔ روغن رازقی کی مالش کریں۔ کندس کا استعمال چھینک لانے کے لئے کریں اور بدبودار چیزیں سنگھائیں۔ خوشبوؤں کا حمل کریں، عانہ پر خلخلوں کا طلاء کریں، ران اور کوکھ پر چھنہ لگائیں اور صافن کی فصد کھولیں لیکن رات ہو جانے کے بعد۔ جوارش کمونی آب کرفس کے ساتھ کھلائیں۔ (مجبول)

یہ عارضہ عفونت منی سے ہوتا ہے اور مرگی کی طرح دوروں سے ہوتا ہے۔ اس میں تنفس

بے حد ضعیف ہو جاتا ہے لہذا درد کی حالت میں ضروری ہے کہ پنڈلیوں کو باندھ دیں اور تلوؤں پر دھک کریں اور اسی طرح کولہوں اور رانوں پر بھی دھک کریں۔

بدبودار اور گرم چیزوں جیسے جند بیدستر، لہسن، گندھک سنگھائیں۔ خوشبودار چیزوں کا حمل کرائیں جیسے مشک، عنبر، روغن بان، روغن سوسن، روغن بایونہ۔ کولہوں اور شکم پر کچھنے لگائیں اور مسخن چیزوں کا طلاء کریں جو کاسر ریاچ بھی ہوں۔ دائی اپنی انگلیاں روغن بان اور روغن سوسن میں ڈبو کر فرج میں داخل کرے اور خوب قوی دغندہ کرے اس سے منی گرے گی اور کندس سے چھینک لائیں۔ دورہ ختم ہو جانے کے بعد راحت کی حالت میں قے کرائیں اور ملطف و مخفف منی تدابیر کام میں لائیں۔ غذا کم دیں، پودینہ، برگ غار، برنجاسف، فجنکشت، مزرنجوش وغیرہ کے جو شانہ میں بٹھائیں اور آبزین کے دوران سر پر روغن گل، سرکہ شراب میں ملا کر لگائیں۔ ایک یا دو بار شاذ ریطوس پلائیں۔ جب اچھی طرح تنقیہ ہو جائے تو تلطیف کریں۔ اس تدبیر سے بھی مرض جڑ سے جاسکتا ہے۔ جند بیدستر، آب برنجاسف یا آب شہد کے ساتھ ہمیشہ پیتے رہیں یہاں تک کہ کامل صحت ہو جائے۔ یہ کافی شافی علاج ہو سکتا ہے۔ سرکہ اشقیل مستقلاً پیتے رہنا مفید ہے۔ جس کی مقدار خوراک ساڑھے چار ملی لیٹر ہے اور جسے آب مرما خوز یا آب برنجاسف و فجنکشت یا آب سداب یا آب عفص کے ساتھ لیا جائے۔ یہ مخفف ہونے کے ساتھ مدرطمت بھی ہے سکنج کو آب افسنین و قرفل کے ساتھ پینا بھی مفید ہے۔ اسی طرح ماء الاصول، روغن ارٹو و جاو شیرے گرام اور ۵۰ ملی گرام جند بیدستر مع شراب قوی لینا بھی مفید ہے۔ مریض برداشت کر سکے تو صافن کی فصد اور ٹخنوں پر حجامت لگائی جائے تو بہتر ہے۔ تنقیہ کے لئے ایارج فقرا، ایارج روفس مفید ہیں۔ فرابیون، عاقر قرحا، رازقی، قفل کا ضاد عانہ اور شکم پر مفید ہے۔ اسے قیروطی میں استعمال کریں۔ میتھی، سویہ اور ناخونہ کے جو شانہ سے حقنہ کرائیں۔ مسخن و ملین شافے رکھیں۔ فریبون و عاقر قرحا کا روغن نکال کر عانہ، ران، مقام رحم اور کمر پر مالش کریں۔

ایک مجرب فرزجہ:

میعہ ساٹھ ۱۰۵ گرام، کندر و قفل ۳۵، ۳۵ گرام، بظخ کی چربی ایک سو چالیس گرام، تخم اُنٹن ۱۸ گرام۔ اس مرکب سے فتلہ تیار کر کے حمل کرائیں۔ (ابن سرائیون)
اس بیمار کا اصول علاج تنقیہ جسم، تلطیف غذا، قطع منی، تسخین قفل بذریعہ دھک، ضاد و تدبیر اور تقویت راس ہے۔ (مؤلف)

تیسرا باب

حمل کی علامات، کثرت تولید اور بانجھ پن، جنس مذکر اور مؤنث کی پہچان اور ان کی تولید، اسقاط کی علامتیں، جنین کا قوی اور ضعیف ہونا اور ان کا تحفظ، تدبیر حوامل، اسقاط کے فوائد، ازالہ بکارت کے بعد اعادہ بکارت کی تدبیر، جنین کے زندہ یا مردہ ہونے کی شناخت۔

جب آپ دیکھیں کہ عورت کا حیض بند ہو گیا، سارے جسم میں ثقل خشک ہو گیا، شہوت ختم ہو گئی، اضطراب اور لرزہ، متلی اور ردی چیزوں کے کھانے کی خواہش پیدا ہو گئی تو دائی سے گردن رحم کے امتحان کرنے کو کہیں اگر وہ بغیر صلابت کے بند ہے تو یہ حمل کی علامت ہے۔

(اعضاء الملمہ)

✳ اگر حاملہ ہونے کے بعد پستان اچانک دبلے ہو جائیں تو اس سے اسقاط کا اندیشہ ہوتا ہے۔

✳ اگر جڑواں بچوں کا حمل ٹھہرا ہے تو جس جانب کا پستان دبلا ہوگا اسی جانب کا اسقاط ہو جائے گا۔ (کتاب العلامات والاسقاط)

جنین کی جنس کی علامات :

ذکر دہنی جانب میں اور مؤنث بائیں جانب میں ہوتا ہے اس کے خلاف شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔

اسباب اسقاط :

✓ (اگر دو ماہ یا تین ماہ کے اندر اسقاط ہوتا ہے تو رحم میں آنے والی عروق کے منہ بلغمی رطوبت سے پر ہو جاتے ہیں اور ان عروق کے منہ کی نرمی و ڈھیلے پن سے رحم کے اندر پیدا ہونے والی شرائین کا فضائے رحم میں آنے والی رگوں سے اتصال کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رحم جنین کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا بلکہ جنین کو بآسانی جدا کر دیتا ہے۔)

منی کو اپنی حالت اصلی پر قائم رہنے کے لئے ضروری ہے کہ قصب سے براہ راست فرج میں داخل ہو۔ (حیلة البراء للانجاب)

✓ (اگر سپاری کے نیچے والے رباط چھوٹے اور تانت کی مانند تنے ہوئے ہوں اور اس سپاری کے عقب تک متواتر ہوں تو ظاہر ہے کہ منی دور رہ جائے گی اور بانجھ رہنے کا سبب بنے گی۔ (کتاب جوامع العلل والاعراض))

حاملہ اور جنین کی مثال ایسی ہے جیسے پیڑ اور اس کا پھل۔ جس طرح جب پھل درخت میں لگتا ہے تو ابتدا میں ضعیف و ناتواں ہوتا ہے اور معمولی سبب سے گر جاتا ہے اور آخر میں پھل وزن دار ہو جانے کے باعث درخت سے تیزی کے ساتھ گر سکتا ہے۔ اسی طرح حاملہ کو ابتدائی چار مہینوں میں اور آخر میں سات ماہ کے بعد تمام حرکات اور دواء مسہل سے سخت اجتناب کرنا چاہئے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کے سبب مسہل دوا دینا پڑ جائے تو شروع کے چار ماہ کے بعد دے سکتے ہیں کیونکہ آخری ایام میں جنین قوی ہو کر لٹک جاتا ہے اور اس کے بعد بوجھل نہیں رہتا۔

(حفظ جنین۔ کتاب الفصول)

✓ (اکثر دیکھا گیا ہے فصد کرنے سے اسقاط ہو جاتا ہے بشرطیکہ بچہ بڑا ہو کیونکہ جب بچہ بڑا ہو تو زیادہ غذا چاہتا ہے اور فصد کرنے سے اس کو غذا پوری نہیں ملتی جس کی وجہ سے مر جاتا ہے۔) (کتاب حفظ جنین۔ باب پنجم)

اگر حاملہ کو کوئی مرض حادث لاحق ہو جائے تو موت کی علامت ہے۔ بقول جالینوس یہ لازمی بات ہے کہ حاملہ پر حمل کی وجہ سے تشنج، تہمد، صرع، وغیرہ جیسے شدید حادث امراض کی متحمل

نہیں ہو سکتی اور اگر مرض کے ساتھ حمی لازمہ بھی ہو تو جنین کی موت کا خوف رہتا ہے اور ہم نے غذا سے دور رکھا تب بھی جنین مر جائے گا۔ اس لئے موقعہ بہ موقعہ بچے کی رعایت سے غذا دینی ہوگی۔ (کتاب التدریس الحوامل)

علامات الحمل :-

رات کا کھانا پیٹ بھر کھانے کے بعد بوقت خواب عورت کو آب شہد تازہ بغیر گرم کئے پلائیں۔ اس سے اگر عورت کو آنتوں میں مروڑ ہو جائے تو سمجھو کہ عورت حاملہ ہے۔ ہم نے تازہ شہد جوش دادہ بھی پلایا کیونکہ ہمیں مولد ریح اور نافع چیز کی ضرورت تھی تاکہ وہ مروڑ پیدا کرے۔ دراصل مروڑ کا سبب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ رحم پر ہوتا ہے تو آنتوں پر دباؤں ڈالتا ہے اور پھر اس وقت جب ریح کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو مروڑ ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ خوب پیٹ بھرے پر اور آرام و سکون کے وقت شہد پلایا جائے کیونکہ یہ دونوں چیزیں مروڑ لانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔

علامت حمل :

افلاذ نوش نے کہا ہے کہ اگر حیض بند ہو کر بخار نہ ہو، نہ لرزہ اور اعضا شکنی تو یہ استقرار حمل کی علامت ہے۔ کیونکہ احتباس حیض اگر کسی مرض کے طور پر عارض ہو تو اس کے ساتھ یہ عوارضات ضروری ہیں۔

اگر حمل مذکر جنس کا ہے تو عورت کا رنگ نکھر او حسین ہو جائے گا اور اگر مؤنث کا ہے تو حمل سے پہلے کے مخصوص رنگ میں مزید اضافہ دکھائی دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤنث جنین میں برودت ہوتی ہے اور مذکر جنین میں حرارت ہوتی ہے۔ یہ بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مؤنث جنین کی حاملہ کسی تدبیر خاص کے ذریعہ اپنا حسن نکھار لے۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مذکر جنین کی اور بھی علامات ہیں مثلاً حرکت قوت زیادہ ہوگی۔ لیکن یہ بھی اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر مذکر جنین کمزور ہے اور مؤنث جنین قوی ہے تو مؤنث کی حرکت مذکر سے زیادہ قوی اور عظیم ہوتی ہے۔ حمل بار دہائی وقت ہوتا ہے جب کہ مرد کی منی عورت کی بچہ دانی دونوں میں بوقت خاص برودت رہی۔

میرے خیال میں یہ سب باتیں باطل ہیں کیونکہ یہ عمل سب طبیعت کے فعل پر منحصر ہے اور یہ بات مشاہدے میں آچکی ہے کہ بعض عورتیں مزاج کے اعتبار سے مردوں سے زیادہ گرم

ہوتی ہیں۔ اسلئے مرد یا عورت کا اعتبار گرمی کے لحاظ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ غلبہ نوع سے ہوتا ہے۔ (مؤلف)

حفظ جنین:

اگر بچہ بننے سے قبل رحم میں ورم اور سرخی ہو تو ملحوظ رہے کہ تمام گرم اور ام رحم جنین کو ساقط کرتے ہیں جبکہ بخار دوسرے فضلات رحم کو ساقط کرتا ہے۔

تذہیر:

اگر دہلی عورت حاملہ ہو جائے تو موٹی ہونے سے قبل حمل ساقط ہو جائے گا کیونکہ جسم دبلا ہوتا گیا تو بچہ بغیر غذا کے رہ جائے گا ویسے بھی زیادہ دہلایں جنین کے لئے پرخطر ہے کیونکہ اس میں جنین کو غذا دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔

استقاط کا سبب:

اگر کسی حاملہ پر کوئی ظاہری مرض نہ ہو پھر بھی دوسرے یا تیسرے ماہ میں استقاط ہو جاتا ہو۔ جب کہ اسے نہ بخار، نہ چوٹ، نہ خوف، نہ قلت غذا، نہ فصد اور نہ اسہال وغیرہ کا عارضہ ہو تو سمجھ لینا چاہئے کہ رحم کی طرف جانے والی عروق کے منہ رطوبت مخاطی سے پر ہیں اور ان عروق سے مشیمہ جڑا ہوتا ہے۔ ان کے منہ کو نفقہ کہتے ہیں چنانچہ مشیمہ پھیل کر اگر وزنی ہے تو ساقط ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر موٹی عورتوں کو حمل نہیں ہوتا کیونکہ ثرب میں کثرت رطوبت سے فم رحم پر پریشر ہوتا ہے جو منی کو فم رحم میں جانے نہیں دیتا اس لئے جب تک عورت دہلی نہ ہو حاملہ نہیں ہو پاتی۔

شحم مقرط دباؤ ڈال کر فم رحم کو بند کر دیتی ہے۔

نر حمل کی علامات:

ذکر (نر) کا تولد دہنی جانب اور مادہ (انثی) کا بائیں جانب ہوتا ہے۔ کتاب المنی میں اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ بچے کا نر ہونا مزاج کے تابع ہوتا ہے اگر ابتداء سے خونت موجود ہو تو نر متولد ہوتا ہے اور رحم کا داہنا حصہ مجاورت کبد کی بنا پر زیادہ گرم ہوتا ہے۔

نر کی پیدائش میں یہ بات بھی معاون ہے کہ بیضائے رحم دائیں جانب سے دہنی طرف

آئے اور بائیں جانب سے بائیں طرف آئے۔ دائیں بیضہ کی منی زیادہ گرم اور بائیں بیضہ کے مقابلہ میں زیادہ غلیظ ہوتی ہے۔ (جالینوس)

یہاں یہ بات لازمی ہے کہ عورت کی گرمی مرد کی گرمی سے متجاوز نہ ہو۔ (مؤلف)
اگر مشیمہ کا اخراج مقصود ہو تو دوائے معطس کے ذریعہ چھینک کرائیں۔ منہ اور ناک کو بند کریں ایسا کرنے سے شکم میں تمد پیدا ہوگا اور کھنچاؤ پیدا ہوگا جو اخراج مشیمہ میں معین ثابت ہوتا ہے۔

حمل کی پہچان:

فم رحم کا بند ہو جانا ہے، فم رحم اشتمال سے یا ورم سے بند ہو جاتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ورم کے ساتھ صلابت ہوتی ہے اور اشتمال سے بند ہوا ہو تو صلابت نہیں ہوتی بلکہ اپنے طبعی حال پر ہوتا ہے اور اس کا اندازہ دائی کو انگلی ڈال کر دیکھنے سے ہو جاتا ہے۔ فم رحم کا بند ہو جانا استقرار حمل کی سب سے بڑی علامت ہے۔ (جالینوس)

اسقاط کی علامت:

اگر حاملہ کی چھاتی میں دودھ جاری ہو تو بچہ کمزور ہونے کی نشانی ہے اور اگر چھاتی سخت ہو تو بچہ کے قوی اور صحت مند ہوگا۔

چھاتیوں کا دبلا ہونا جسم میں خون کی بے حد کمی ظاہر کرتا ہے۔ دودھ کا چھاتی سے جاری ہونا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ بچہ سیراب نہیں ہو پاتا۔ تاہم متوسط درجے کی چھاتی دونوں طرح کی آفتوں سے محفوظ ہونے کا پتہ دیتا ہے یعنی چھاتیاں سخت ہوں اور ان کے دودھ نہ نکلے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دودھ ٹپکے اور بچہ قوی ہو بشرطیکہ عورت انتہائی قوی ہو اور اس میں خون بڑی مقدار میں ہو۔ (جالینوس)

میں نے بہت سی عورتوں پر غور کیا جن کو کسی ادنی سبب سے اسقاط ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ کافی پہلے سے ان کے پستان دبلے ہو گئے تھے۔ اس سے یہ قیاس کیا گیا کہ پستان اور رحم کے درمیان مشترکہ عروق میں خون کم ہونے سے ایسا ہوا جس کے باعث بچے کو غذا نہ مل سکی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لئے میرا یہ قول بقراط کے قول کی تائید میں ہے کہ عورت پر جو اسقاط کے حالات آتے ہیں تو پہلے اس کی چھاتیاں دہلی ہو جاتی ہیں چنانچہ وہ کہتا ہے کہ جب عورت کی چھاتیاں صلب ہو جائیں اور اس کی چھاتیوں یا کولہے، یا آنکھوں یا رانوں میں درد ہو تو اس کا

اسقاط اسلئے نہیں ہوتا کہ اس کی چھاتیوں میں دودھ جمع ہو گیا بلکہ یہ سختی مدافعت کی وجہ سے ہے اور ایسا خون کی کثرت سے ہوتا ہے کیونکہ جب طبیعت خون کی کثرت کو بعض دوسرے اعضاء کی طرف دفع کرتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ درد ہو۔ اس صورت میں بچہ کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔

اسقاط کا سبب قلت کے دم کے علاوہ بھی ہوتا ہے مثلاً کودنا، چیخنا چلانا وغیرہ اور اس صورت میں چھاتیاں بہت لاغر ہو جاتی ہیں کیونکہ جنین جب پردہ جنین کو چاک کرتا ہے تو خون سارا رحم کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حاملہ کی پستان کسی بھی سبب سے دبے پڑ جائیں تو لامحالہ اسقاط ہو جانے والا ہے۔ اسقاط پستانوں کے دبلا ہوئے بغیر نہیں ہوتا اور پستانوں کی سختی صحت جنین کی علامت ہے لیکن یہ سختی بہت زیادہ نہ ہو بلکہ اعتدال کے ساتھ ہو۔ اگر پستان میں بہت زیادہ سختی ہوگی تو حاملہ کو پستان، کو لہے یا پاؤں یا آنکھ میں درد ہوگا جو کثرت دم کی علامت ہے اور یہ سارے درد کسی ایک عضو میں محسوس ہونگے۔ (جالینوس)

اکثر پستانوں کی سختی کے بعد اس طرح کا کوئی درد کسی عضو میں محسوس ہو تو سمجھیں کہ طبیعت کے فضلات کو اس عضو کی طرف دفع کیا ہے اور رحم جس کے اندر بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہتا۔ (مؤلف)

علامات اسقاط :

اگر حاملہ کو بخار عارض ہو اور ساتھ ہی سخت گرمی ہو جبکہ کوئی ظاہری سبب موجود نہ ہو تو ولادت مشکل سے ہوگی یا اسقاط ہوگا اور یہ عورت خطرے سے خالی نہ ہوگی کیونکہ بخار اور حرارت دونوں چھاتیوں کی خلط روی سے حادث ہوتے ہیں جو عورت کی قوت زائل کر دیتے ہیں جبکہ حاملہ کو وضع حمل کے لئے کافی قوت درکار ہوتی ہے اور جب جنین میں بخار کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی تو اسقاط ہو جاتا ہے اور یوں بھی ضعف اس کے لئے ایک خطرہ بنا رہتا ہے۔

علامات حمل :

ایک کپڑے کی دھونی عورت کو دیں اگر دھونی کی بو اس کے بدن سے سرایت کر کے نتھنوں اور منہ کے اندر پہنچ جائے تو عورت حاملہ ہے۔

مر، کندر اور میعہ وغیرہ کا بخور جس میں حرارت اور خوشبو ہوتی ہے کرایا جاتا ہے۔ یہ بخور عورت کے منہ میں شدید طور پر محسوس ہوتا ہے لیکن اس رحم کثیف جو حمل کا متحمل نہ ہو اس میں یہ بخور مؤثر نہیں ہوتا۔ اگر حاملہ کا حیض مقررہ وقت پر ہو رہا ہے تو بچے کا صحیح حالت میں ہونا نا

ممکن ہے۔ (جالینوس)

اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے اوقات پر عادت کے موافق طمٹ آتا رہے صرف ایک یا دو مرتبہ صحیح آنے سے یا ایک دو مرتبہ تھوڑا آنے ولادت کے امکانات ختم نہیں ہوتے کیونکہ حاملہ کو اکثر ایسا ہو جاتا ہے اور اس کا سبب خون کی کثرت ہوتی ہے جو جنین کی ضرورت سے فاضل ہوتا ہے تاہم زیادہ مقدار میں مسلسل خون کا آنا اور اکثر اوقات آنا بچے کی صحت کے امکانات کو ختم کر دیتا ہے۔ (جالینوس)

علامات حمل:

جب خون طمٹ مقررہ وقت پر نہ آئے اور عورت کو لرزہ عارض نہ ہو اور نہ بخار ہو بلکہ صرف ہلکا سا اضطراب و کرب، متلی اور خراب چیزوں کی خواہش ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت حاملہ ہو گئی۔

بے چینی، متلی اور خراب چیزوں کی خواہش ردی اخلاط جسمانی سے بھی عارض ہوتی ہے لیکن اس حال میں بخار ضرور ہوتا ہے خواہ لرزہ نہ ہو یا پھر اس کا سبب فم معدہ میں ہوتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ حمل کی تکلیف فم معدہ کو متاثر کر رہی ہو لہذا اگر اس تکلیف کے ساتھ حیض آنا بند ہو جائے بغیر کسی وجہ کے، تو حمل یقینی ہے۔

امتناع حمل کے اسباب:

اگر بچہ دانی کے اندر برودت و کثافت ہو تو استقرار حمل نہیں ہوتا اس طرح اگر زیادہ رطوبت ہو تو استقرار نہیں ہوتا کیونکہ رطوبت مادہ منویہ کو ناقص بناتی ہے اور اس کے حرارت کو بجھا دیتی ہے اور جب جیسا ہونا چاہئے اس سے خفیف ہو یا اعتدال سے زیادہ گرم ہو تب بھی حمل نہیں ہوتا کیونکہ مادہ منویہ کو مطلوبہ غذا نہیں ملتی اس لئے اس میں فساد واقع ہو جاتا ہے اور جب رحم کا مزاج معتدل ہوتا ہے تو عورت کے حاملہ ہونے کی زمین ہموار ہوتی ہے۔

اگر رحم میں زیادہ برودت کا غلبہ ہو، ساتھ میں ایک حد تک کمزوری ہو ان عروق کے منہ تک مشیمہ نہ پہنچ سکتا ہو جس کی وجہ سے کثافت جمع ہو گئی ہو اور اس حال میں بچہ اس سے غذا حاصل کر رہا ہو کیونکہ ایسے حال میں عورت کا طمٹ بند ہو جاتا ہے یا پھر بہت کم مقدار میں خارج ہوتا ہے اور ساتھ میں ردی بھی ہوتا ہے کیونکہ اس حال میں رحم سے صرف مائی رطوبت ہی خارج ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جس شخص کو عروقی سقم ہوتا ہے اس کے سدے بھی جلد بنتے ہیں اور

خون جمع ہونے کے بعد بلم کی طرف امالہ کرتا ہے اور ایسے رحم میں مرد کی منی اگر غایت درجہ گرم نہ ہو تو پہنچتے ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کیونکہ منی کی مثال رحم میں ایسی ہے جیسے دانے کی مثال کہ اسے خشک زمین میں دباو یا تر زمین میں یا نالے میں تو اس کے مختلف نتائج برآمد ہونگے۔ چنانچہ خشک رحم میں منی ایسی ہے جیسے دانے کو چونے یا راکھ میں ڈال دیں۔

خوشبو کا بھپارہ فساد رحم کی جملہ اقسام کی طرف رہبری کرتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ رحم بارد اور کثیف کی طرف خوشبو کا بھپارہ نہیں پہنچتا اور شدید یا بس و کثیر الرطوبت میں بھی بخارات کی خوشبو جذب نہیں ہوتی یعنی اٹھتی ہے لیکن اس میں جذب نہیں ہوتی جب کہ رحم حار میں بھپارے کی بو کا اثر منہ اور نٹھنوں تک محسوس ہوتا ہے اور چونکہ منہ اور نٹھنوں اپنے حال پر ہوتے ہیں اس لئے یہ بدبو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہذا خوشبو کی دھونی مزاج حار کے لئے کافی بہتر ہے۔ تاہم اس مزاج کے بارے میں دوسرے دلائل کو بھی دیکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ عورت میں مزاج حار بہت کم ہوتا ہے بلکہ اکثر عورتیں بارد المزاج ہوتی ہیں۔ سوائے چند دہلی پتلی زیادہ خون والی عورتوں کے۔

اگر حاملہ کو پیش ہو جائے جو شدید ہو اور زیادہ دن رہے تو اسقاط ہو جاتا ہے کیونکہ آنتوں کی مشارکت سے رحم متاثر ہوتا ہے اور عورت کی قوت کم ہو کر اسقاط کا موجب ہوتی ہے۔ (جالینوس)

منی بے ثمر یا تو نشہ کرنے والے کی منی ہوتی ہے یا بچے کی یا زیادہ عمر والے یا بوڑھے کی۔ نیز ایسے شخص کی منی سے عیب دار اولاد پیدا ہوتی ہے جس کے اعضاء صحیح سالم نہیں ہوتے۔ (کتاب المعلومات)

صحت مند اعضاء کی منی صحت مند اور بیمار کی ناقص ہوتی ہے۔

(کتاب الامنی۔ بقراط)

سرلیح الانزال عورت:

جلد منقرل ہونے والی عورتیں پندرہ سے چالیس سال تک ہوتی ہیں ان کے بدن نہ سخت ہوتے ہیں اور نہ نرم اور ان کے رحم بھی جسم کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کا نظام حیض معتدل ہوتا ہے۔ خون حیض نہ پتلا ہوتا ہے اور نہ رقیق مائی۔ خراب رطوبت خارج ہوتی ہے بلکہ وہ معتدل خون والی ہوتی ہے۔ ان کا رحم فرج سے قریب ہوتا ہے جو جوانب کی طرف مائل نہیں

ہوتا۔

فم رحم کا بعید ہونا یا جوانب میں مائل ہونا یا کم گوشت والی ہونا اور حیض کا آنا بُرا ہے کیونکہ وقت انزال انکے جنین میں یہ چیزیں دغذغہ لاتی ہیں۔ اسی طرح غیض غضب بھی دغذغہ لاتا ہے۔

نیز جلد منزل ہونے والی عورتیں نہ زرد رنگ کی ہوتی ہیں نہ نیلگوں کیونکہ زرد و نیلگوں عورتیں جنین کا اسقاط کر دیتی ہیں تاہم سیاہ آنکھ والی عورت باعتبار انزال اور ہتر بیت جنین مناسب ہوتی ہے کیونکہ اس کی حرارت معتدل ہوتی ہے۔

حمل کی علامات :

منزل ہونے کی علامات یہ ہے کہ فراغت کے بعد لرزہ، ٹھنڈک محسوس ہو اور فم رحم بغیر صلابت کے بند ہو جائے اور تھوڑی مدت میں حیض بند ہو جائے۔ کولہو میں ثقل اور چھاتیوں میں ہلکے درد کے ساتھ ابھار آجائے۔ متلی آئے، تھوڑا سینہ ابھر جائے رنگ، زرد ہو جائے، آنکھوں میں گھڑھا پڑ جائے اور چہرے پر کلف جھائیں نمودار ہو۔ آب شہد پلا کر تشخیص کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جانچ تمام عورتوں پر پوری نہیں اترتی کیونکہ بعض عورتیں ایک مہینہ تین ماہ بعد آب شہد لینے کی عادی ہوتی ہیں۔ عورت کو ردی چیزوں کے کھانے کی خواہش ہوتی ہے نیز کھانے سے بے رغبتی، متلی، درد سر اور آنکھوں میں درد وغیرہ ہوتا ہے آنکھیں دھنس جاتی ہیں۔

نرینہ اولاد کی علامات :

عورت پر حسن اور نکھار ظاہر ہوتا ہے اس کا داہنا پستان بائیں کی نسبت بڑا ہوتا ہے جب کہ اگر لڑکی ہے تو رنگ زرد ہوتا ہے اور بائیں پستان بڑا ہوتا ہے حرکت جنین دھیمی ہوتی ہے۔ سستی کے ساتھ اکثر جی متلاتا ہے۔

واضع حمل کی علامتیں :

ساتیں یا نویں مہینہ زیریں شکم میں بوجھ اور کولہوں میں درد ہوتا ہے۔ شکم گرم اور فم رحم پھول جاتا ہے نیز فم رحم میں تری آنے لگتی ہے پھر جب درد زہ کا وقت قریب آ جاتا ہے تو سرین ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور جنگا سے پھول جاتے ہیں۔ ہاتھ رکھنے سے فم رحم پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

مردہ جنین کی علامات :

اگر جنین مردہ ہے تو دروزہ کے وقت عورت کو جنین کی حرکت محسوس ہوتی ہے اور اس کے رحم سے گندگی اور بدبودار رطوبت خارج ہوتی ہے۔ (کتاب المعلومات)

حمل قائم ہونے کی علامت یہ ہے کہ رحم منی کو اپنے اندر روک لیتا ہے اور پھر اس سے کوئی قطرہ باہر خارج نہیں ہوتا ہے اور مرد کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رحم ذکر چھو سے لیتا ہے۔ اور اکثر استقرار حمل حیض جاری ہونے سے کچھ قبل ہوتا ہے۔ (کتاب المنی۔ علامات حمل)

اگر بیفتان میں بعد ہو جائے یا کچل جائیں یا شوکران سے ان کو بارد کر دیا جائے تو جاندار پیدا نہیں ہوتا۔

اگر مرد و عورت کے بیفتان شدید طور پر سرد ہو جائیں تو جاندار پیدا نہیں ہوتے۔

اگر بیضوں میں ورم صلب ہو جائے تب بھی جاندار پیدا نہیں ہوتا۔ لڑکی کا جنین داہنی جانب شاذ و نادر ہوتا ہے۔ لیکن لڑکے کا حمل پہلے داہنے بیضہ میں انتفاخ لاتا ہے اور اگر بائیں بیضہ میں انتفاخ ہے تو لڑکی ہے۔ (کتاب المنی۔ بانجھ پن)

حشفہ سے جڑا ہوا ٹھہ اگر اتنا لمبا ہو حشفہ کا سرد برتک پہنچ جائے تو اس سے منی سیدھی خارج نہیں ہوتی اور مسافت طویل کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس لئے حمل قرار نہیں ہوتا۔ اگر اس رباط کو کاٹ کر حشفہ تک سیدھا کر دیا جائے تو حمل ہو جاتا ہے۔ اس رباط کی شکل زبان کے رباط جیسی ہوتی ہے۔

اگر حاملہ کو بخار ہے اور چہرے پر سرخی ہے سر میں گرانی اور آنکھوں کے گڑھوں میں درد ہے تو اسقاط ہو جاتا ہے۔

طمث کے بعد نم رحم بہت زیادہ پھیل جاتا ہے اور منی قبول کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہو جاتا ہے۔

اگر زچہ کو بخار ہے اور رحم میں ورم ہے تو اس کو گرم پانی کا آبز ن کرائیں۔ اس سے درد ہلکا ہوتا ہے اور اس ورم رحم میں نرمی آتی ہے جو عسر و ولادت سے ہو جاتا ہے۔ نیز زچہ کو

بار بار ماء الشعیر (آش جو) پلائیں تاکہ امکانی ثقل نہ ہو۔ نیز اس کے پینے سے اس کی قوت واپس آئے گی۔ اور بدن کو تراوٹ ملے گی ماء الشعیر کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ نوخون نحاس کو بہہ نکلنے سے روکتا بھی ہے۔ (کتاب منافع الاعضاء۔ باب پنجم)

اگر حاملہ کا دودھ زیادہ تعداد میں خارج ہو تو کمزور جنین کا پتہ دیتا ہے اور اگر جسم گٹھا ہوا ہو، چھاتیاں بھی بند ہوں تو جنین صحت مند ہے اور لڑکا ہے۔ (کتاب الاخلاط)

پستان میں زیادہ دودھ کا ہونا ضعف جنین کا پتہ دیتا ہے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنین غذا حاصل نہیں کر رہا ہے اور اگر اس کے برعکس ہے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ہم نے اکثر حاملہ عورتوں میں دائیں جانب کے جنین کو لڑکا پایا۔ (جالینوس)

استقاط کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں:

تیز درد، تھمہ، جریان خون، اور دواء المسهل پینا یا دواء المسهل کا حمل کرنا۔

(حفظ الجنین)

اس کے علاوہ سقطہ، ضربہ، خوف و فزع وغیرہ اور بخار، بہت زیادہ غم اور بہت زیادہ خوشی بھی اس کے اسباب ہیں۔ (مؤلف)

رحم کے داہنی جانب سے خارج ہونے والا خون پانی کی طرح صاف ہوتا ہے لیکن بائیں جانب والا خون صاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی لئے عورت داہنی جانب زیادہ گرم ہوتی ہے اور اس جانب سے نر اولاد وجود میں آتی ہے۔

دل درمیان میں واقع ہوتا ہے اور اس کی دھڑکن بائیں جانب محسوس ہوتی ہے کیونکہ دل کا بایاں بطن ہی ہے جس سے دھڑکن اور نبض وجود میں آتی ہے۔

اولاد کے خواہش مند کو چاہئے کہ نشہ نہ کرے نہ بد ہضمی ہونے دے بلکہ کھانا اچھی طرح ہضم ہو جانا چاہئے اور جسم ہر اعتبار سے معتدل ہونا چاہئے۔

برف کا اور ٹھنڈا پانی پینے سے عورت بانجھ ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے اس کا نظام حیض بگڑ جاتا ہے۔ ٹھنڈی جگہوں پر زیادہ سکونت اختیار کرنے، عسر و ولادت اور گرم مقامات پر

بآسانی ولادت ہوتی ہے۔ محنت کی کمی، تھکن، حیض کھل کر ہونے سے بانجھ پن ہوتا ہے کیونکہ نم رحم کی رگیں لیسڈار بلغم سے پُر ہو جاتی ہیں۔ قوت جاذبہ ختم ہو جاتی ہے پھر وہ منی کو قوت کے جذب نہیں کر پاتی نہ منی وہاں ٹھہرتی ہے اور نہ پرورش پاتی ہے۔

جو عورتیں حاملہ نہیں ہو پاتیں اکثر و بیشتر ان کے بدن خون حیض سے صاف نہیں ہو پاتے بلکہ احتباس خون حیض سے فساد بدن کا شکار ہوتی ہیں۔ (کتاب الاہویہ والبلدان)

کبھی نطفہ میں کوئی خرابی واقع ہونے سے حمل نہیں ٹھہر پاتا لہذا مرد و عورت کے مزاج کو پہچانا جائے۔ عورت کے مزاج کی پہچان دم حیض کی سفیدی اور رقت اور پہلے سے اختیار کی گئی تدبیر سے ہوتی ہے۔ کبھی حیض کا خون بکثر خارج ہو جانے سے رحم سرد ہو جاتا ہے اور نطفہ خراب ہو جاتا ہے۔ حمل نہ ہونا کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ عرصہ تک عورت جماع سے محروم رہتی ہے اور کبھی حمل اس وجہ قرار نہیں پاتا کہ مرد کی منی اس قدر زیادہ گرم یا سرد ہوتی ہے کہ عورت اس کو محسوس کر لیتی ہے۔

کبھی رحم میں خشکی ہونے کی وجہ سے بھی مرد کو لذت حاصل نہیں ہوتی اور اس کی خشکی کو میاں بیوی دونوں محسوس کرتے ہیں۔ بانجھ پن کو اطباء نے عاقر باطلاق کہا ہے۔ اگر مرد کی طرف سے سستی ہو تب بھی حمل واقع نہیں ہوتا۔ زیادہ چربی اور آنتوں کے زخم سے بھی فساد نطفہ ہوتا ہے اور حمل قرار نہیں پاتا۔

حمل قائم کرنے کی قوی دوا:

فریبون کا حمل فوراً حیض جاری کرتا ہے اس میں سیلان کا خدشہ بھی نہیں ہوتا۔

(یہودی)

میں نے چالیس دن سے قبل سے اسقاط میں کوئی صورت نہیں پائی اور تین مہینہ سے قبل کے اسقاط میں لڑکے کی علامت نہیں پائی۔ اس مدت کے بعد صورت ظاہر ہوتی ہے۔

اگر صورت جنین پینتیس دن میں مکمل ہو جائے تو ستر دن میں حرکت ہونے لگتی ہے اور ۲۱۰ دن میں پیدائش ہو جاتی ہے۔ اور اگر ۴۵ دن میں صورت مکمل ہو تو ۹۰ دن میں حرکت

شروع ہوتی ہے اور ۲۷۰ دنوں میں ولادت ہوتی ہے۔ اگر ۵۰ دن میں صورت مکمل ہو تو ۱۰۰ دن میں حرکت ہوتی ہے اور ۳۰۰ دن میں ولادت ہوتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جنین اتنی ہی کم مدت میں حرکت کرتا ہے جتنی کم مدت میں وہ صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس کا خروج تین گنی مدت میں ہوتا ہے۔ موٹی عورتوں کو اولاد کم ہوتی ہے۔ شمالی ہوائ کا پیدا کرتی ہے جنوبی ہوا لڑکی۔ بوڑھوں اور چھوٹی عمر کے لوگوں کی اولاد اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں اور جوانوں کی اولاد لڑکے ہوتے ہیں۔ بچے کا چھوٹا یا لمبا ہونا رحم کی تنگی و وسعت اور مادہ منویہ کی کثرت و قلت پر منحصر ہوتا ہے جیسے نارنگی کو شیشے کی بڑی بوتل میں داخل کر دیا چھوٹی میں۔

علامت حمل:

کئی ایک معتبر آدمیوں نے مجھے بتایا کہ انھوں نے بعد جماع فم رحم کو خشک پایا پھر بھی ان کی بیویوں کو حمل ٹھہرا۔ (طبری۔ بقراط کے حوالے سے)

(حاملہ اگر چلتے میں پہلے داہنا پیر اٹھائے تو لڑکا اور بائیاں پیر اٹھا کر چلے تو لڑکی۔ میں نے اس کا تین معاملوں میں تجربہ کیا اور صحیح پایا ممکن ہے یہ اتفاق رہا ہو۔)

اگر ولادت سے قبل اور ولادت کے وقت حاملہ کے شکم اور پیڑ و میں درد ہو تو ولادت آسان ہوتی ہے اور اگر ریڑھ میں درد تو ہمیشہ ولادت میں مشکل ہوتی ہے۔ ابتدا میں حاملہ عورت کا بدن احتباس طمٹ اور جنین کے پوری غذا نہ لینے کی وجہ سے ڈھیلا رہتا ہے پھر جب جنین بڑا ہو جاتا ہے پھر یہ کیفیت ہلکی ہو جاتی ہے کیونکہ جنین اس سے پوری غذا یت حاصل کرنے لگتا ہے اور حاملہ کے بدن سے اس کا تنقیہ ہو جاتا ہے۔ (طبری)

علامات ذکر:

جنین کی حرکت شکم میں دائیں جانب زیادہ ہوئی ہو اور حاملہ کی داہنی آنکھ خفیف الحركت ہو اور اس میں چمک ہو نیز آنکھ کا رنگ تو یہ لڑکا ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کے برعکس نشانیاں ہوں تو لڑکی کے۔

حاملہ کی تدبیر:

حاملہ کو چاہئے کہ آٹھویں مہینہ میں جھٹکے وغیرہ سے بچے کیونکہ اس حالت میں اگر اسقاط ہو گیا تو موت کا خطرہ ہے۔ جب ولادت کا وقت آن پہنچے تو عورت کے لئے بہتر ہے کہ بیٹھ جائے اور اپنے پیر پھیلا دے۔ پھر کمر کے بل تھوڑی دیر لیٹ جائے پھر کھڑی ہو جائے اور پھر نیچے جلدی جلدی زینہ اترے چڑھے اور چپچپ اور چھینک لانے کی کوشش کرے۔ (طبری)

بچہ دانی کے سوائے مزاج حار کی علامت یہ ہے کہ مریضہ کے مزاج کی شدت سے نطفہ فاسد ہو جاتا ہے اور ضعف ہوتا ہے اور اگر رنگ پیلا ہوتا ہے، پیشاب رنگین ہوتا ہے، نبض سریع چلتی ہے اور گرم مزاج کی تمام علامات موجود ہوتی ہیں خاص طور سے خون حیض گرم ہوتا ہے۔ لیکن اگر فساد نطفہ برودت سے ہو تو خون، پیپ اور حیض کا زرد و سفید ہونا اس کی دلیل ہے۔ نیز اس کی توثیق دوسری علامتوں اور گزشتہ امراض و تدابیر سے کی جاتی ہے۔

بانجھ پن کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ عورت سے ایک زمانہ تک جماع نہ کیا جاسکے جس سے اس کی منی اور بچہ دانی کا مزاج بارد ہو کر فاسد ہو جائے۔ کثرت سیلان سے بھی رحم بارد ہو جاتا ہے۔ سیلان رطوبت کی علامت خراج کی دیگر علامات ہوا کرتی ہیں۔ نیز رحم سے جو تری رستی ہے۔ رحم کی بیوست کا پتہ فم رحم کی خشکی و صلابت سے ہو جاتا ہے۔

بانجھ پن کا ایک سبب گوشت کی کثرت بھی ہے۔ اگر اسقاط دوسرے یا ماہ میں ہو جائے تو اس کا سبب غلیظ ریاح اور عروق رحم کا بلغم ہوتا ہے خاص طور سے اس کا سبب ریاح ہے۔ چوتھے سے ساتویں مہینے تک کا اسقاط رطوبت اور بلغم غلیظ کے سبب سے ہوتا ہے۔ سبب بلغم اور سبب ریاح غلیظ کا علاج مندرجہ ذیل ہے۔

ماء الاصول، روغن ارنڈ ہر تیسرے دن حب مٹن کے ساتھ دیا جائے۔

اگر روغن ارنڈ نہ پی سکے تو ہر پانچویں روز ۲۱ گرام پرانا گڑ، ۱۳ گرام، تل کے ساتھ پلائیں اگر مریضہ کمزور ہو تو اسی لحاظ سے مقدار کم کر دیں روزانہ صبح کو ایک چوزے کی مقدار بھر دھرتا اور شحرتا یا چار یا پانچ دن تک کھلائیں پھر دو یا تین دن کے وقفے کے بعد دوبارہ کھلائیں

اور دواء المسک اور جوارش بزور ایک چنے کے برابر کھلائیں اور کاسرریاح حقنہ کرائیں۔

کاسرریاح کا حقنہ:

صحر، نانخواہ، ابھل، کاشم، عود، ثبث، بابونہ، سداب، مسک، حلبہ ایک ایک مٹھی اور ایک لیٹر دوسو ملی میٹر پانی کے تناسب سے اُبالیں۔ جب پانی جل کر آدھا رہ جائے تو صاف کر کے ۴۰۰ ملی لیٹر یا اس سے کچھ کم اس میں روغن رازقی اور ۱۳۰ گرام روغن کنجد ملا کر ہر چوتھے دن پر ایک بار حقنہ کریں نیز گرم دواؤں کی دھونی دیں۔

دھونی کا نسخہ:

مقل، اشق، علك الانباط، شونیز مفرد یا مرکب شکل میں ان کی دھونی دیں۔

نقطہ اسود اور روغن نار دین یا بلساں کا حمل کئی دن تک کریں۔ یہ ان عورتوں کے لئے بہتر علاج ہے جن کو رطوبت اور بالخصوص ریح کی وجہ سے اسقاط ہو جایا کرتا ہے۔ اور جو عورتیں رحم کی بیوست کی بنا پر حاملہ نہیں ہو پاتیں ان کا علاج بذریعہ حقنہ اور بطخ کی چربی کے حمل کے ذریعہ کیا جائے نیز ان کو اسفید باج اور بکری کے بچے کا گوشت کھلایا جائے۔ بکری کا دودھ تازہ اور ابال کر پلایا جائے اگر رحم کسی جانب مائل ہو تو رگ صافن کی فصد سے اسے صحیح کریں جو رحم کے بالمقابل لگائی جائے گی۔ نیز ملیں و مسخن اشیاء کا حمل کرائیں۔ (اہرن)

مدر طمٹ دواؤں کا بھی حمل کریں اور رحم کا بے جگہ ہونا عروق رحم میں اجتماع خون سے نہیں ہوتا بلکہ رطوبات سے ہوتا ہے۔ اس کی پہچان خشکی، مزاج اور سابقہ تدابیر کی بنیاد کی پر جائے گی۔ رطوبات کے اخراج کے لئے حب متین ہر چوتھے دن دیں۔ روغن رازقی کی مالش کریں اور حار لطیف دواؤں مثلاً روغن الخضر، یا روغن اخروٹ اور جو شانده میتھی سے حقنہ کرائیں۔ (مؤلف)

حمل کا جلد ہونا:

خرگوش کا پنیر مایہ جو روغن بنفشہ میں باریک کر کے ملا لیا گیا ہو حیض سے فراغت کے بعد روئی میں لت کر کے حمل کریں یا پھر شیر، بھیڑیے، خرگوش یا کبوتر میں سے کسی ایک کا پتہ پونہ

گرام ہمراہ روغن نار دین پیس کر حیض سے فراغت کے بعد حمل کریں۔ اس مرض میں مر، لبنی اور بھنگ ہموزن کی دھونی بھی مفید ہے۔ تینوں کو کسی مشروب میں پیس کر قرص بنالیں اور پھر ۴.۵ گرام لیکراس کی دھونی دیں۔ (مؤلف)

ایسی حاملہ عورتیں جن کو ضعف معدہ اور ضعف جگر ہو اور انھیں ضعف و ریاح کی وجہ سے اسقاط کا خطرہ ہو مندرجہ ذیل جوارش کھلائیں۔

زیرہ ۳۵ گرام کو سرکہ شراب میں بھگو کر بریاں کریں اس کے بعد بزرگرفس ۳۵ گرام، نانخواہ، زنجبیل، جند بیدستر ہر ایک ۱۱.۵ گرام اور شکر ۷۰ گرام کی جوارش بنائیں روزانہ ۴.۵ گرام کھلائیں پھر کچھ دن ناغہ کریں اس کے بعد کچھ دن ٹھنڈے پانی کے ساتھ کھلائیں (اھرن)

اس مرض کے لئے مندرجہ ذیل نسخہ جوارش بھی ہے، مصطکی، الاپچی، کبابہ، قرنفل، زنجبیل و سک کو میہ میں گوندھ کر جوارش بنائیں اور مناسب مقدار میں دیں۔ (مؤلف)

اگر لڑکے کی ولادت مطلوب ہو تو میاں بیوی دونوں کا علاج ایک مدت تک گرم دواؤں سے کریں۔ (کتاب الحمل بقراط)

اور علاج کے دوران مجامعت نہ کریں پانی بکثرت پینے دیں بلکہ تھوڑی شراب دیں کیونکہ کثرت شراب نوشی رقت منی کا سبب بنتی ہے۔ نشہ خوری سے قطعی دور رکھیں اور نشہ کی حالت میں مباشرت نہ کریں نہ بھرے پیٹ کریں۔ بلکہ بہت ہی ہلکی بھوک کی حالت میں کریں۔ مرد و عورت کا علاج مسخن حقنہ سے کریں۔ اسی حساب سے غذا دیں۔ گرم تیلوں کی مالش اور گرم حقنہ زیادہ مفید ہے۔ (مؤلف)

غلیظ صلب منی سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ (بقراط)

جماع میں کمی کرنے اور کم نشہ خوری سے منی غلیظ ہوتی ہے مرد کو دیکھتے رہنا چاہئے۔ جب رقت کا احساس ہو تو غلاظت کی تدبیر کریں۔ جب منی گاڑھی ہو جائے تب مجامعت کرے۔ حار یا بس چیزیں کھانے سے غلظت پیدا ہوتی ہے اگرچہ معمولی ہو۔ اور حمل بھی اسی وقت قرار پائے جب کہ عورت کو جنسی خواہش ہو۔ اگر عورت شہوت سے عاری ہو تو منی بہہ کر خارج ہو جاتی

ہے۔ اسی طرح گرم حمام میں زیادہ دیر ٹھہرنے سے اسقاط ہو جاتا ہے کیونکہ گرم ہوا جنین کے لئے مضر ہے اور سرد مفید ہے۔ کیونکہ خیال ہے کہ جنین اس سے سانس لیتا ہے۔ (بقراط)

جس عورت کا حیض ۳۲ دن میں آتا ہے وہ اکثر زریںہ اولاد جنتی ہے اور جس کا ۴۳ دن میں آتا ہے وہ لڑکی جنتی ہے۔ لڑکا پیدا ہونے کے بعد اگر تیس دن میں زچہ کی طہارت ہو جائے تو عورت صحت مند نہیں ہے۔ اگر لڑکی پیدا ہونے کے بعد طہارت ہو تب بھی یہی بات ہے کہ زچہ صحت مند نہیں ہے۔

ولادت کے بعد صفائی ہوئے بغیر حیض آجائے تو عورت ہلاک ہو جائے گی۔ اگر حمل اس حالت میں ہو کہ خون حیض فاسد تھا تو اس کی اصلاح کے لئے طبیب کو کچھ کرنا چاہئے۔ لہذا اسے اعتدال کے ساتھ منقیات کھلائیں کیونکہ اگر جنین نے فاسد خون سے غذا حاصل کی تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ بھی لحاظ رکھیں کہ منقی اشیا کی افراط نہ ہونے پائے اور نہ سیلان رحم جاری کرنے میں شدت کی جائے کیونکہ اگر جنین کی ساری غذا خارج ہو گئی تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ بلکہ لطیف تدابیر کی جائے اور نرمی کے ساتھ مادے کا اخراج کیا جائے۔ فاسد رطوبت رحم کی گردن کی راہ سے ہلکے ہلکے خارج ہو جائے اس کا منہ نہ کھلنے پائے۔

ملائم بدن کی عورت میں دودھ جلدی اتر آتا ہے اور سخت بدن کی عورت میں دیر سے۔

(بقراط)

مانع حمل اسباب میں سے ایک سبب بچے دانی کے منہ کا بند ہونا ہے۔ اس کا علاج اس کے عنوان کے تحت گذر چکا ہے۔ دوسرا سبب سوء مزاج مادی وغیر مادی ہوتا ہے۔ جس کی تشخیص اس کی مخصوص علامات سے کی جاتی ہے۔

سوء مزاج غیر مادی کا علاج تبدیل مزاج ہے اور سوء مزاج مادی کا علاج تبدیل مزاج کے علاوہ استفراغ مادہ ہے۔ رحم کے سوء مزاج حار اور بارد کی علامات کا ذکر پہلے کہیں ہو چکا ہے۔ اور کچے غلیظ مادے کے سبب رحم کا سوء مزاج کی تشخیص اس کی اپنی علامات تدبیر سابقہ خون حیض کے رنگ اور مقام کی نرمی کو دیکھ کر کی جاسکتی ہے۔ (بولس)

حاملہ کو اکثر فضلات کی کثرت، مسلسل قے، بکثرت تھوک کا آنا، خفقان اور بھوک کی کمی

وغیرہ کی شکایات عارض ہو جاتی ہیں۔ اس کے لئے معتدل چہل قدمی، بہت گرم کھانوں سے پرہیز اور شراب ریحانی اصفرا کا پینا مفید ہے۔ بھوک کی کمی، تھوک کی زیادہ اور قے کے لئے فصد مفید ہے۔ اس کی دوائیں مندرجہ ذیل ہیں۔

عصی الراعی (لال ساگ) کا جوشاندہ پلائیں۔ سوئے کا جوشاندہ پلائیں اور ریوند چینی تھوڑی مقدار میں کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے کھلائیں۔ فم معدہ پر انگور کے پتے، گلنار وغیرہ کو سوئے اور پرانے سرکہ و شراب کے ساتھ پیس کر ضا د کرائیں۔

خفقان کم کرنے کے لئے گرم پانی گھونٹ گھونٹ لیں، دھیرے دھیرے ٹھیلیں اور نرم ملائم کپڑے سے شراب سیف کو ڈھکیں۔ بھوک ختم ہو جائے تو طرح طرح کی لذیذ غذا میں مریضہ کے سامنے رکھیں۔ بھوک کھولنے کے طویل سفر کرائیں۔ چرپری اشیاء کا کھانا بھی بعض اوقات مفید ہوتا ہے۔ مثلاً رائی حاملہ کی بھوک بند ہو جانے میں مفید ہوتی ہے اگر عورت آسودہ حال ہو اور زیادہ چل پھرنا سکتی ہو تو بقدر استطاعت چلائیں پھر انیں۔ اگر عورت کے پیروں میں ڈھیلا ورم ہو جائے تو ترہل کے باب میں لکھے گئے نسخہ طلاء کا استعمال کریں۔ بھوک ختم ہو جانے کی شکایت میں چرپری چیزیں کھلائیں۔ (بولس)

تازہ اور خشک لہسن کا رس نچوڑ کر اس کے هموزن روغن کنجد میں ملا کر پلائیں۔ جب اس کا پانی خشک ہو جائے تو بطور حمل روئی کے ٹکڑے میں استعمال کریں یہ بہت جلد حمل کا موجب ہوتا ہے۔ بارد نقرس اور دیگر بار دریا ح کے لئے روغن سوسن کپڑے میں لت کر کے کئی راتوں تک حمل کریں نیز عانہ اور درز پر مالش کریں۔ یا اس میں زیتق بھی ملا لیں۔ یا اس کو بطور حمل استعمال کریں۔ (چرک)

حاملہ کے پیروں کی رگیں اگر سرخ ہو تو لڑکا اور اگر سیاہ تو لڑکی پیدا ہوگی۔ اگر دہنی چھاتی بڑی ہو تو لڑکا اور بانیں بڑی ہو تو لڑکی ہوگی۔ اور اگر اس کے پستان کی بھٹنی کا رنگ سرخ ہو تو لڑکا سیاہ تو لڑکی ہوگی۔ اسی طرح اگر دائیں پستان میں زیادہ دودھ اتر آئے تو لڑکا اور بانیں میں زیادہ ہو تو لڑکی ہوگی۔ عورت کو روزہ رکھائیں اور نہار منہ بارش کا پانی ۱۳۰ گرام ار شہد ۶۵ گرام ملا کر پلائیں۔ اس سے اگر قبض ہو جائے تو سمجھو حمل قرار پا چکا ہے اور اگر قبض نہ ہو

تو حمل نہیں ہے۔ اسی طرح مجامعت کے بعد دن میں عورت کو گھٹنے، پشت اور شکم میں کچھ درد اور ٹیس محسوس ہو تو یہ علامت ہے کہ حمل قرار پا چکا ہے۔ (شمعون)

اکثر پہلے تین مہینوں کے اندر ہونے والے اسقاط کا سبب وہ ریاح بنتی ہیں جو نطفہ سے جا کر نکراتی ہیں اور پھسلاتی ہیں۔ پھر سوء مزاج بارد سبب بنتا ہے جو نطفہ کو جامد کر دیتا ہے یا سوء مزاج حار سبب بنتا ہے جو نطفہ کو خشک کر کے ایک غیر طبعی شکل میں ڈھال دیتا ہے اور پھر طبیعت اس کو اسقاط کی شکل میں اپنے سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ چوتھے سے چھٹے مہینے تک کے درمیان ہونے والے اسقاط کا سبب رحم کی وہ رطوبت مزلقہ ہوتی ہے جس کو جنین کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتا اور پھسل کر ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر چھٹے مہینے کے بعد اسقاط ہو تو اس کا سبب سوء مزاج بارد ہوتا ہے۔

کبھی امتناع حمل رحم کے کسی جانب مائل ہو جانے سے ہوتا ہے لہذا پہلے دائی کو فرج کا امتحان کر کے معلوم کرنے کے لئے کہیں کہ رحم کے کس طرف مائل ہے۔ اگر رحم جس طرف مائل ہوا ہے وہاں کی عروق موٹی اور پر ہیں تو مخالف جانب کے پیر میں فصد کریں۔ لیکن اگر رحم میں ایٹھن اور سکڑن ہو اور غلظت نہ ہو تو ملین ہتھوں، حمولات، حمام اور آبزین سے علاج کرائیں۔ (اختصارات)

لڑکا پیدا ہونے کی شرائط یہ ہیں کہ مرد میں شہوت میں زیادہ ہو اور عورت میں کم ہو۔ اور ایسا حیض کے بعد ہوتا ہے کیونکہ حیض کے بعد اس کی منی کم ہو جاتی ہے اور ایام گزرنے پر منی پھر جمع ہو جاتی ہے چنانچہ اگر حیض سے فراغت پر فوراً حمل ہو جائے تو لڑکا ہے خصوصاً جب کہ اس کا نطفہ قلیل ہو۔ دوران حمل خصوصاً آٹھویں ماہ میں مجامعت سے پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ اس وقت جماع سے اسقاط کا اندیشہ ہوتا ہے۔

لڑکے کا حمل ہو تو عورت جب کھڑی ہوتی ہے تو دائیں طرف کا ہاتھ ٹیکتی ہے اور بیٹھنے میں بھی دائیں جانب ٹیک لگاتی ہے۔ لڑکی ہو تو اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسی طرح لڑکے میں پہلے داہنا سر پستان سیاہ ہوتا ہے پھر بائیں، اور پہلے داہنی جانب دودھ اترتا ہے پھر بائیں جانب۔ اور عورت کا رنگ کھلا ہوا، چہرے پر رونق و تازگی ہوتی ہے۔ چہرے کی جلد پر کلف یا

جھانسیں وغیرہ کے نشان کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح لڑکے کے حمل میں خواہش جماع نہیں ہوتی۔ لڑکی کے حمل میں ہوتی ہے۔

ما قبل و ما بعد جماع کی تدابیر و ہدایات اور اس سے بچے پر پڑنے والے اثرات وہ بہت سے ہیں۔ (کتاب الطبری)

اسی طرح عورت کے پیر میں جو ورم عارض ہوتا ہے اس سے بھی کچھ باتیں وابستہ ہیں جس کو ورم حار کے بیان میں لکھا گیا ہے۔ (اوریباسوس)

امتناع حمل کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں:

سوء مزاج سدہ، رحم کے اندر رطوبت غریبہ کی موجودگی، حیض کی خرابی، ورم، زخم، چربی کی کثرت۔ (ابن ماسویہ۔ در علاج ارحام)

امتناع حمل بسبب کثرت شحم (چربی) کی علامات یہاں ذکر کرنے کی ضرورت تھی۔ علاج کے لئے فصد کریں، سدے کھولیں، غذا کم کر دیں اور شادریطوس کھلائیں۔ (مؤلف)

پہلے سے تیسرے مہینے تک کا اسقاط ریح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چوتھے سے چھٹے مہینے کا رحمی رطوبت سے ہوتا ہے جو جنین کو اس کے بوجھ کی وجہ سے پھسلا دیتی ہے۔ ساتویں سے نویں مہینے تک کا اسقاط رحم میں سوء مزاج بار د لاحق ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اسقاط بہ سبب ریح کا علاج مندرجہ ذیل ہے:

روغن ارنڈ، آب میتھی، حب سکنجبین، حرف ابیض بریاں، روغن ارنڈ، شحزنایا، دھرتا اس کے علاوہ حقنہ کیا جاتا ہے۔ دھونی دی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ نفط، صخر، نانخواہ سے تیار کئے گئے فرزجے استعمال کئے جاتے ہیں۔ سوسن مقل اور علك البطم کی دھونی دی جاتی ہے۔

اگر حاملہ کو سیلان دم زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو ہم اس کے فصد لگانے کی جسارت نہیں کرتے اور نہ اسے مسہل دوائیں کھلاتے ہیں۔

جن عورتوں کو چربی کی کثرت سے حمل نہ ہوتا ہو ان کو فصد کے بعد مندرجہ فرزجہ استعمال

کرائیں۔

نسخہ فرزجہ :

عسل ماوی، روغن سوسن، مرکبی۔ اس کے علاوہ گرم حقنہ جس میں حنظل شامل ہو استعمال کرائیں۔ گوشت، مچھلی اور چربی قطعی ترک کرادیں۔ (ابن ماسویہ)

اگر موٹی عورت رحمی رطوبت سے پاک ہو جائے اور رحم پر گرماہٹ ہو جائے تو حاملہ ہو جاتی ہے لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا اور اگر حاملہ ہو ہی جاتی ہے تو اسقاط ہو جاتا ہے اور اگر اسقاط نہ ہو تو اس کا جنین بہت کمزور ہوتا ہے۔ (روفس)

اگر کنواری لڑکی کا پردہ بکارت زائل ہو جائے تو اس کو شراب اور روغن زیتون میں بٹھائیں۔ اگر جراحت شدید ہو تو انبوہ کو نم رحم میں ڈالکر اس جگہ مرہم لگائیں۔ انبوہ اس لئے کہ مرہم چپکے نہیں۔

جن عورتوں کے جلدی جلدی لڑکے ہوتے ہیں وہ عورتیں جو اپنی عمر کے پندرہ سے چالیس کے درمیان ہوتی ہیں۔ جن کی بچے دانی نہ سخت ہوتی ہے نہ ڈھیلی اور جو حرارت اور برودت میں معتدل ہوتی ہیں اور جن کا حیض وقت پر آتا ہے کھانا، پینا، فرحت و سرور اعتدال کے اندر ہوتا ہے۔ جلد جلد حاملہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جو پندرہ سال سے پہلے حاملہ ہو جاتی ہیں ان کو موت کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا رحم چھوٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ بغیر مشقت و دشواری کے ولادت نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ غمگین ہونے والی عورت حاملہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بدہضمی کا شکار عورت حاملہ نہیں ہوتی۔ استقرار حمل کا مناسب زمانہ اوائل حیض یا اواخر حیض ہوتا ہے اور اس وقت جب کہ جسم معتدل ہو۔ شکم کھانے پینے سے پر نہ ہو۔ طمث کے شروع ہونے کے ذرا قبل حمل نہیں ٹھہر پاتا کیونکہ رحم میں رطوبت موجود ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے اس میں جذب کی قوت نہیں ہوتی ہے۔

حمل قرار پانے کی علامتیں :

بعد جماع عورت اپنے مبہل میں کوئی خرابی نہ محسوس کرے۔ حیض بند ہو جائے۔ اس کی

چھاتیاں بڑی ہو جائیں۔ اس کے بعد شکم بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنین کی حرکت شروع ہونے لگتی ہے۔ حمل کی ابتدائی ایام میں عورت کا آرام کرنا بہتر ہے۔ تھوڑی غذا کھانے کے بعد تھوڑا ٹہلنے کی عادت ڈالیں۔ اعتدال کے ساتھ حمام کا اہتمام کریں اس میں کوتاہی نہ کریں۔ زود ہضم کھانا کھائیں۔ چرپری چیزوں سے پرہیز کریں اور ہر کڑوی اور نفخ پیدا کرنے والی چیز سے بھی بچیں۔

عورت کو دوسرے تیسرے مہینے سے خراب چیز کھانے کی خواہش ہونے لگتی ہے جو کبھی چوتھے اور پانچویں مہینے تک رہتی ہے۔ ایسی حالت میں عورت آرام کرے، کھانا کم کھائے، حمام اعتدال سے کرے اور فم معدہ کو تقویت دینے والی غذائیں استعمال کرے۔ شراب مُرد ٹھنڈے پانی کے ساتھ پیئیں جو کھانے کے دوران ہو۔ کھانے کے بعد دونوں ہاتھ اور پیروں کو اچھی طرح سے دھوئیں اور معدے پر نیم گرم ضاد لگائیں۔ انار دانہ ترش منہ میں رکھ کر چوسیں۔

لڑکے کی علامات :

جنس لڑکا ہو تو حاملہ عورت کا رنگ سرخ اور کھلا ہوا ہوتا ہے اگر لڑکی ہو تو زرد اور سبزی مائل ہوتا ہے۔ لڑکا ہو تو داہنی چھاتی بائیں سے بڑی ہوتی ہے۔ اگر جڑواں بچے ہوں تو دونوں چھاتیاں ایک ساتھ بڑی ہوتی ہیں۔ جن عورتوں کے بال گھنیرے ہوتے ہیں اور ان کے جسم میں خون زیادہ ہوتا ہے ان کو حمل کے دوران تھوڑا بہت خون آ جاتا ہے اور جن عورتوں کو حاملہ ہو چکنے کے بعد خون آ جاتا ہے ان کے ساتھ اگر اس وقت جماع کر لیا جائے تو ایک حمل پر دوسرا حمل قرار پا جاتا ہے۔ زمانہ حیض تک عورت کے اندر حمل قرار پانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جنین کبھی ساتویں مہینے کبھی نویں مہینے اور کبھی گیارہویں مہینے میں تولد ہوتا ہے۔

جب عورت کو درد زہ ہونے لگے تو اسے کرسی پر بٹھائیں جیسے ہی سفاق جو پیشاب سے پر ہوتی ہے پٹھے عورت اتنا زور لگائے کہ بچہ باہر خارج ہو جائے۔

عسر ولادت مشیمہ کی وجہ سے دو صورتوں میں ہوتا ہے یا تو مشیمہ اس قدر سخت اور دبض ہوتا ہے کہ اس کا پھٹا مشکل ہوتا ہے یا پھر اتنا باریک ہوتا ہے کہ قبل از وقت پھٹ جاتا ہے۔ اس

کی رطوبت بہہ جانے سے رحم خشک ہو جاتا ہے اتنا خشک کہ جنین کا اس میں سے پھسل کا نکل آنا مشکل ہو جاتا ہے اور رحم کے بہت زیادہ خشک یا بہت زیادہ رطوبت ہونے کی حالت میں جنین نہیں نکل سکتا۔

عسر ولادت کی دوسری شکلیں یہ ہوتی ہیں کہ جنین لڑکی ہو کیونکہ اس کا خارج ہونا مشکل ہوتا ہے یا پھر جنین کئی دن پہلے سے مردہ ہو یا پھر مہبل یعنی رحم کا منہ تنگ ہو یا پھر حاملہ کم عمر ہو یا پھر مسانہ اور رحم میں ورم ہو اور آنت میں بھی ورم ہو یا وہاں خشک براز جمع ہو گیا ہو یا پھر عورت پر برودت کا غلبہ ہو یا پھر حد سے زیادہ دہلی ہو یا اس کی قوت ساقط ہو گئی ہو یا پھر غم کی خبر اس پر اثر کر گئی ہو یا ٹھنڈی ہوا لگ گئی ہو۔

جنین کا طبعی خروج سر کی جانب سے ہوتا ہے اس کے علاوہ پہلو سے، یا کولہے سے، یا ٹانگوں سے ہو تو یہ سب غیر طبعی حالتیں ہیں۔

جب مشیمہ ولادت سے پہلے پھٹ جائے اور رطوبت بہہ جائے تو رحم اور فرج میں موم، کوئی تیل یا انڈے کی سفیدی یا مرغابی کی چربی لگائیں۔ یہ تدبیر اس وقت بھی اختیار کی جائے جب کہ رطوبت ناکافی ہو۔

جس عورت کا مشیمہ اتنا دبیز ہو کہ آسانی سے چاک نہ ہو رہا ہو تو انگلیوں کو اندر داخل کر کے سلائی سے یا سوئی سے یا فصد کر نیکے نشتر سے چاک کریں۔

جنین زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے ولادت میں دقت ہو تو دوائی ہاتھ ڈال کر ہلکے ہلکے جنین کو کھینچے۔ اگر ایسا کرنے کے حالات نہ ہوں تو جو کچھ باہر ہے اسے نرم پٹی سے باندھ کر کھینچے اس سے کام نہ چلے تو کلاب سے پھانس کر کھینچے اب بھی خارج نہ ہو تو جنین کا عضو عضو کاٹ کر ہر ممکن صورت میں باہر نکالیں۔ مردہ جنین کو اس سے پہلے کہ اکمیں انتفاخ یا ورم پیدا ہو اسے باہر نکالنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو جنین کو کاٹ دینا چاہئے۔ اگر اس کا سر زیادہ بڑا ہے تو سر کاٹ کر دماغ نکال دیں اور ران کاٹ دیں پھر صانبر سے پھانس کر جنین نکالیں۔ اگر سر میں پانی ہونے کی وجہ سے خروج میں پریشانی ہو رہی ہو تو جنین کے سر میں چھید کر کے پانی نکال دیں اور ضرورت ہو تو اسکے گلے میں کپڑے کی پٹی باندھ کر کھینچیں اس سے کام نہ چلے تو

صنارات سے پھنسا کر کھینچیں۔

اگر جنین کا زاویہ ناہموار ہو تو عورت کو دو چار بار حرکت کرائیں ممکن ہے کہ صحیح ہو جائے۔

عورت سے کہیں کہ چار پائی پرسیدھی لیٹ جائے اور دونوں پیروں کو اوپر کی جانب اٹھائے پھر چار پائی کو خوب زور سے ہلائیں۔ ایسا کرنے سے باہر نکلا ہوا عضو اندر چلا جائے گا ورنہ پھر اسے کاٹ دیں اور اگر باہر نکل آیا ہے تو اسے اندر لوٹائیں اور عورت سے حرکت کرائیں تاکہ وہ سیدھا ہو جائے جنین کو تجویف رحم تک واپس کریں اگر ایسا نہ ہو سکیں تو عضو کاٹیں خواہ ہاتھ ہوں یا پیر۔

اس بات کی کوشش کریں کہ جنین کا سر نیچے کی طرف ہو اگر یہ ممکن نہ ہو تو پیروں کی نیچے کر لیا جائے لیکن اگر جنین کسی پہلو سے خارج ہو رہا ہو تو اسے اندر دفع کریں اور طبعی زاویہ پر موڑیں اگر ایسا نہ ہو تو جنین جیسے ہی اندر جائے عورت کو زور سے ہلا دیں۔ ایسا کرنے سے جنین صحیح زاویہ پر آ سکتا ہے لیکن اگر اس سے کامیابی نہ ہو تو جیسے ہی ممکن ہو اس کو پھانسیں اور کھینچیں اور اس کے ٹکڑے کاٹیں اور جب تک آخری ٹکڑا خارج نہ ہو جائے نہ چھوڑیں۔

مسلل خوشبو سونگھنے سے عسر و ولادت عارض ہوتا ہے کیونکہ خوشبو سے رحم اوپر کی جانب سکڑ جاتا ہے۔ اس لئے خوشبو اس قدر سونگھیں کہ قوت شامہ کو تقویت مل جائے۔ اس کے برعکس بدبو ولادت میں سہولت پیدا کرتی ہے۔ جس عورت کو موٹاپے کی وجہ ولادت میں دشواری ہو رہی ہو اس کو گھٹنوں کے بل بٹھائیں اور اس کے سر کو پیچھے کی جانب جھکائیں تاکہ اس کا شکم مقام رحم سے اونچا ہو جائے۔ ایسا کرنے سے جنین خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ورم اور سختی کی وجہ سے تنگی رحم ہو گئی ہو تو یہ عمل کارآمد ہوتا ہے کیونکہ موٹی چربی کا رحم کے اوپر دباؤ پڑتا ہے اور مذکورہ شکل اختیار کرنے سے چربی کا دباؤ رحم کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے۔

عسر ولادت کی وجہ سے اگر آنتوں اور پیشاب میں ثقل جمع ہو جاتا ہو تو پہلے پانی، شہد اور بورق کے حقن کریں اور پیشاب جاری کریں پھر گنگن پانی میں عورت کو بٹھائیں۔ ملحوظ رہے کہ ناتواں اور کمزور مریضہ ہو تو شکم پر بیرونی دباؤ ڈال کر استنگھنے اور زور لگانے میں مدد کی

جائے۔

جس عورت کی مہبل میں شقاق یا جراثیم کی وجہ سے تکلیف ہو تو اس کے تکمید کرنا مفید ہوتا ہے۔ اس کے رحم میں خوب روغن ڈالیں اگر مقعد میں بواسیر ہو تو درد زہ کے دوران دکھن ہوگی۔ اس لئے نطول کریں اور آب گرم میں بٹھائیں۔

اگر ٹھنڈ لگنے کے سبب سے عسر ولادت ہے تو فرج میں پانی اور گرم روغن پہنچائیں اور عانہ، مراق اور کمر پر روغن غار کی مالش کریں۔

کمزوری اور استرخاء کی وجہ سے عسر ولادت ہو تو ہوا دار اور معطر جگہ پر عورت کو بٹھائیں اور جتنی خوشبو اسے صحت مند رکھ سکتی ہے سگھائیں۔ اور اس کو انڈے کی زردی اور شراب تھوڑی تھوڑی دیتے رہیں اگر نشتر لگانے کی ضرورت پیش آئے تو عورت کو کرسی پر اس طرح بٹھائیں جیسے بوقت ولادت بٹھایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے کمر کے پیچھے ٹیک لگانے کا اہتمام کریں۔ معالج اس کی ایک ران پر جو داہنے جانب والی ہو زور دے پھر نشتر لگائے۔ فرج کو لوب سے کھولے اس کے کھلنے سے نم رحم خود کھل جائے گا اور اس طرح مشیمہ خارج ہو جائے گا۔ عورت اپنے جڑے کھولے رکھے اور معمول سے زیادہ لمبی سانس لے اور کھانسی کرے۔ اگر ایسا کرنے سے مشیمہ خارج نہ ہو تو بایاں ہاتھ جس کا ناخن کٹا ہوا ہو داخل کرے۔ اور پھر مشیمہ کو پکڑ کر آہستہ آہستہ کھینچیں۔ سختی سے ہرگز نہ کھینچیں۔ ایسا کرنے بھی اگر خارج نہ ہو اور مشیمہ کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو تو جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے مشیمہ کو باندھ دیں اور پھر اسے عورت کی ران سے اعتدال کے ساتھ باندھیں اور رحم میں مرہم باسلیقون بذریعہ حقنہ ڈالیں تاکہ مشیمہ میں تعفن نہ ہو اور عورت کو مشیمہ خارج کرنے والی اشیاء کھلائیں۔

حاملہ کو سب سے شدید تکلیف بچے کے پیروں کے بل نکلنے سے اور اندرون رحم دونوں ہاتھوں کے پھیلنے سے ہوتی ہے اور اسی سے اس کو زیادہ درد ہوتا ہے۔ (میسون)

طبعی شکل میں ولادت کا ہونا عورت کے لئے کم تکلیف دہ ہوتا ہے اور خروج آسان ہوتا ہے۔ یہ بات جاننے کے لئے کہ جنین طبعی شکل میں خارج ہونے والا ہے یہ دیکھیں کہ عورت کھلی ہوا کی مشاق ہے اور درد زہ اوپر سے نیچے کی جانب مائل ہے تو جنین طبعی شکل میں ہے۔

اس کے علاوہ عورت کے شکم پر پسلیوں کی جانب سے فم رحم کی جانب دباؤ ڈالیں ایسا کرنے سے اگر جنین سر کے بل ہے تو مشیمہ کے ساتھ خارج ہوگا اور عورت ایک بار میں پاک ہو جائے گی۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مشیمہ اس کی ران سے باندھ دیا ہے اور چھینک لائیں۔ اگر مشیمہ کو کاٹنا پڑے تو کاٹ دیں پھر شکم پر ہاتھ پھیریں اور عورت زور لگائے جنین یکبارگی خارج ہو جائے گا۔ عورت کا کرسی پر بیٹھنا مناسب ترین آسن ہے۔ اور اگر زور لگانے میں اور اوپر اٹھانے میں کمی ہو رہی ہو تو چھینک لانا مناسب تدبیر ثابت ہوتی ہے۔

اگر کثرت سے خون خارج ہو جائے تو دونوں ہاتھ اور دونوں پیر باندھ دیں اور شکم پر سرکہ میں کپڑا بھگو کر رکھ دیں۔ محرک دواؤں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ اس جگہ اعصاب ہوتے ہیں جس کو یہ دوائیں نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ رحم میں نفوخ کرنا اور عفص، کندر اور شراب کا شافہ رکھنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ (بولس)

حمل کی علامت یہ ہے کہ بعد جماع فم رحم پر خشکی ہے اس بارے میں دریافت کریں۔ جماع کے وقت عورت ایسا محسوس کرتی ہے گویا اس پر غشی طاری ہے اور پھر درد سا ہے۔ اور اس کے بعد عورت عانہ میں اور ناف میں اور فرج میں تھوڑا تھوڑا درد محسوس کرتی ہے۔ رحم کا منہ اچھی طرح بند ہو جاتا ہے۔ جماع سے بے رغبتی ہو جاتی ہے پھر حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے اور کھٹی اشیاء کی خواہش ہوتی ہے، چہرے پر جھائیاں اور کالے دھبے ظاہر ہوتے ہیں اور چہرہ شاداب ہوتا ہے۔ سر پستان سیاہ ہو جاتا ہے اور چھاتیاں ابھرنے لگتی ہیں۔ آنکھ کی سفیدی زرد ہو جاتی ہے۔ بقراط نے جس طرح ذکر کیا ہے عورت کو آب شہد پلا کر جانچ کر لی جائے۔ (سرایون)

ایک حقنہ جو شروع کے مہینوں میں بلغم کی کثرت سے اسقاط کی شکایت میں مستعمل ہے۔ اندرائن لے کر اس پر روغن سون بھر دیں۔ پہلے اس کے ختم نکال دیں اور ایک دن ایک رات چھوڑ دیں پھر دوسرے دن اس کو گرم راکھ پر رکھ دیں۔ جب روغن میں جوش پڑ جائے تو ٹھنڈا کر کے صاف کر لیں اور فرج میں اس کا نیم گرم حقنہ کریں۔ یہ عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ (قرا بادین حبش)

جس عورت کو تھوڑی مقدار میں جلدی جلدی حیض آتا ہے وہ تولید کی اہلیت نہیں رکھتی کیونکہ یا تو وہ قلت دم کی مریض ہے یا اس کی عروق رحم میں کثافت ہے اور یہ دونوں باتیں حمل کے لئے ناموافق ہیں۔ عروق رحم کی کثافت سے مشیمہ نہیں بنتا اور اگر بنتا ہے تو اس سے زیادہ مقدار میں غلیظ خون خارج ہوتا ہے۔ (مؤلف)

جب مرد کی منی رقیق ہو اور صاحب جماع تیاری سے قبل دخول میں جلدی کرے تو یہ جلد خروج منی کا سبب بن جاتا ہے اور عورت سے ندامت کا موجب ہوتا ہے۔ (کتاب المنی) یہ علمی نکتہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ (مؤلف)

باجھ عورتوں کا علاج میں گرم شافات سے کرتا ہوں۔ بلساں اور اس کا روغن، بان، مسک، اظفار الطیب وغیرہ کا شافہ بنا کر مستقل حمل کراتا ہوں اور گرم معجونیں دیتا ہوں۔ دس روز کے بعد جماع کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ مر، میعہ اور حب الغار کی قرص بنالیں اور روزانہ اس کی دھونی دیں۔ (مؤلف)

حاملہ عورتوں کو متلی میں نیم گرم گائے کا دودھ پینے سے آرام ہو جاتا ہے (قرا بادین۔ عتیق)

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دایا جب عورت کی چھاتیوں میں تغیر و پھیلاؤ و ابھار محسوس کرے تو یہ حمل کی علامت ہے اور اگر آنکھوں میں گہرائی اور پوٹوں میں استرخاء، نظر میں تیزی، آنکھ کی سفیدی میں گدلا پن محسوس کرے تو یہ بھی حمل کی علامت ہے۔ اور لڑکے کی پہچان یہ ہے کہ دائی حاملہ کا شکم دیکھے کہ گول ہے اور بھرا ہوا ہے اور اس میں سختی ہے اور رنگ میں نکھار ہے تو یہ لڑکے کی علامت ہے اور اگر شکم میں طول اور ڈھیلا پن ہے اور اس کے رنگ میں جھائیاں ہیں تو لڑکی کا حمل ہے۔ اگر سر پستان سرخی مائل ہے تو لڑکا ہے اور سیاہی مائل ہے تو لڑکی ہے۔

حاملہ کا دودھ لیکر دو انگلیوں سے دیکھیں اگر غلیظ ہے اور چچا ہے تو لڑکا اور چچا نہیں ہے تو لڑکی ہے۔

اس کے دودھ کا ایک قطرہ شیشے میں پکا کر دھوپ میں رکھیں حرکت نہ دیں کچھ دیر بعد

اگر دودھ جمع ہو کر اگر ایک موتی دکھائی دے تو لڑکا ہے اگر پھیل جائے تو لڑکی ہے۔
 جنین کی تعداد کی پہچان یہ ہے کہ ناف مشیمہ سے ملی ہوئی ہے یا اس میں سلوٹ اور گرہ
 ہے جتنی سلوٹیں ہیں اسی اعتبار سے ولادتیں ہوں گی اور اگر کوئی سلوٹ یا گرہ نہیں ہے تو ایک
 ولادت اگر عورت اسقاط کر دے یہ پہچان باطل ہو جاتی ہے۔

(جنین کی بیان کردہ معلومات بہ حوالہ جالینوس)

ساتویں مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی قوت سے جھلی کو قبل از وقت چاک کر دیتا
 ہے۔ لیکن چونکہ ایسا کرنے سے اس کے اندر اچانک ایک بڑی تبدیلی آتی ہے اس لئے بعد میں
 وہ کمزور ہو جاتا ہے۔

ساتویں مہینے میں پیدا ہونے والے اکثر بچے اسی وجہ سے مر جاتے ہیں کہ ان کے اندر
 ایک بڑی تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت بگڑ جاتی ہے اور آٹھویں مہینے میں
 پیدا ہونے والے بچے جو بیمار ہوتے ہیں اور ان کی حالت خراب ہوتی ہے وہ اس بات کی دلیل
 ہے کہ حاملہ عورت کی حالت خراب تھی اور پوری مدت میں اس پر گرانی کی کیفیت رہی۔ دراصل
 جنین کی حال اس کی ماں کے حال کے تابع ہوتا ہے چنانچہ اس حال میں پیدا ہونے والا بچہ زندہ
 نہیں رہتا ہے۔

آٹھویں ماہ میں بچہ اس لئے پیدا ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کا سر اوپر کی جانب ہوتا ہے اور
 اسی آٹھویں مہینے میں پلٹ کر نیچے کی جانب ہو جاتا ہے۔ (مسائل جنین)

اگر ایسا ہوتا تو نویں مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کا حال اس کے برعکس ہوتا۔ جنین
 کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ ساتویں مہینے میں قوی ہو جاتا ہے تو جھلی ساتویں مہینے میں چاک
 کر دیتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو آٹھویں مہینے میں پلٹتا ہے۔ اور اس کا سر نیچے ہوتا ہے۔ لیکن اس
 میں اس قدر شدید حرکت نہیں ہوتی کہ باہر نکل آئے اور اگر وہ اس حالت میں نکل آتا ہے تو
 بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نے زبردست قوت سے اتنی حرکت نہیں کی جتنی ساتویں
 مہینے کے جنین نے کی تھی بلکہ وہ طبعی حرکت پر قانع رہا اور اس کا پلٹنا بے جان چیز کی طرح ہوا جبکہ
 دنیا میں باقی رہنے کے لئے اسے قوت کی ضرورت تھی اور جب پلٹنے کے بعد اسے خروج کی

تکلیف سے واسطہ پڑا تو اس کا زندہ رہنا ممکن نہ رہا۔ تاہم اگر وہ خارج نہیں ہوا بلکہ رحم ہی میں موجود رہا تو آہستہ آہستہ قوی ہو کر زندہ رہنے کے قابل ہو جائے گا۔

جو بچے سر کے بل پیدا نہیں ہوتے بوقت ولادت ان کو صوبت جھیلنا پڑتی ہے اور پہلو کے بل نکلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے اور بڑی بڑی شکل ہوتی ہے۔ بعض شکلیں اتنی خراب ہیں کہ جنین اور ماں دونوں مر جاتے ہیں اگر دونوں نہ مریں تو شدت خروج سے جنین باہر آنے کے بعد متورم ہو جاتا ہے اور اکثر مر جاتا ہے الا یہ کہ تین دن میں سکون سے ہو جائے۔

سب سے قوی بچہ وہ ہوتا ہے جو دسویں ماہ میں پیدا ہو کیونکہ وہ پرورش پا کر اس مرض سے دور ہو جاتا ہے جو آٹھویں مہینے میں اسے پہنچا تھا اور چونکہ وہ بڑا ہو جاتا ہے اس لئے بیمار بھی ہو تو اچھا ہو جاتا ہے۔ (مؤلف)

امتناع حمل یا تو مرد و عورت کے سوء مزاج سے ہوتا ہے جو سارے جسم میں ہو یا اعضاء تناسل سے۔ لہذا پہلے میں مخصوص علامت کی تدابیر سے بحث کروں گا پھر اعضاء تناسل کے سوء مزاج سے بحث کروں گا جس کی پہچان مادہ منویہ کی مقدار، کیفیت اور حیض کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ یعنی دونوں میں سے کسی ایک میں سے مادہ میں کمی ہو یا اس میں تعفن ہو یا رقت ہو یا وہ غلظت ہو جو سوء مزاج کی دلیل ہوتی ہے۔

حمل میں یہ چیز بھی اکثر مانع ہوتی ہے کہ مرد حاجت سے جلد فارغ ہو جاتا ہے اور عورت نہیں ہوتی جبکہ حمل اس وقت قائم ہوتا ہے جب دونوں بیک وقت فارغ ہوں۔ اس لئے مرد و عورت کی آنکھوں سے، ڈھیلے پڑنے سے اندازہ لگائے اور حاجت کو ایسے ہی وقت میں مکمل کرے۔ خون حیض کی کثرت بھی مانع حمل ہے اور ایسی حالت میں فم رحم میں گرمی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی دیگر وجوہات خونی پیشاب سے، درد، موٹا پایا حد سے زیادہ دبلا پن ہی ہیں۔ ان میں علاج بالفصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ (مؤلف)

حمل کی پہچان رحم کا شدت سے بند ہو جانا اور اس کا اوپر کی جانب سکڑ جانا۔

(جامع القوی الطیب)

یہ بات حاملہ عورتوں نے بکثرت بیان کی ہے کہ ان کا فم رحم اوپر کی جانب سکر گیا ہے۔
(مؤلف)

لڑکا یا لڑکی کا وجود عورت اور مرد میں سے کسی ایک کے غلبہ منی پر منحصر ہے اگر مرد کی منی غالب ہے تو لڑکا ورنہ اس کے برعکس جنس پیدا ہوگی۔ اس لئے جو لڑکے کا طالب ہو اس کو زیادہ منی پیدا کرنے والا اور عورت کو کم شہوت والی ہونا چاہئے جو کم منی والی عورتیں ہوتی ہیں۔

حمل نہ ہونے کی علامات :

دو، دو۔ تین، تین ماہ تک مستقل حیض آتے رہنا اور ان خراب چیزوں کی خواہش نہ ہونا جن کی حاملہ کو ہوتی ہے۔ حمل کے دوران جنین کا حرکت نہ کرنا اور اگر حرکت ہو در رحم کے ساتھ ہونا۔ اس کے علاوہ بخار، نفث الدم اور چھاتیوں کا دبلہ ہونا وغیرہ۔ (کتاب ابذیمہ - باب دوم، مقالہ سوئم)

جس حاملہ کو خون آئے وہ مقویات رحم کا استعمال کرے مثلاً عدس مقشر، پوست انار، مازو، آس خشک سرکہ میں ڈبو کر ضما د کریں اور اس پانی میں بیٹھیں اور پانی میں کوئی خوشبو نہ ڈالیں۔ (ابن ماسویہ)

جن عورتوں کو حمل نہیں ہوتا وہ مندرجہ ذیل دھونی استعمال کریں۔ زرنخ احمر، جوز السرو، میعہ سائلہ میں گوندھ کر ایک شیشے کے قیف نما برتن میں رکھ کر حیض سے فارغ ہو کر دھونی دیں۔ پھر دھونی پوری ہونے کے بعد مجامعت کریں۔

دوسرا نسخہ :

میعہ سائلہ میں حب الفار ملا کر شہد میں گوندھ کر ان کی ٹکیہ بنا لیں ساڑھے تین گرام حبوب کی دھونی تین بار دیں۔ (مسح)

شراب پینے والی نشہ کی عادی عورتیں حاملہ نہیں ہوتیں۔ (کتاب مسائل طبیعیہ)
جس عورت کے رحم میں فساد ہوتا ہے اس کو ایک حمل کے بعد دوسرا حمل ٹھہر جاتا ہے اور اس کے حمل سے خون بہتا رہتا ہے۔ اور ایسی حالت میں پہلا حمل صورت اختیار کئے بغیر متعفن

ہو کر رحم سے خارج ہو جاتا ہے۔ عورت کو بخار ہو جاتا ہے اور چہرے پر تھجھ ہوتا ہے اور خراب امراض لاحق ہوتے ہیں یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک کا اسقاط ہو جاتا ہے۔

(بقراط - جبل علی جبل)

شکم میں جنین کی موت واقع ہونے کی علامت :

عورت کو کسی ایک کروٹ لٹانے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنین نیچے کی طرف ایسا گرتا ہے جیسے پتھر۔ ناف کے گرد مراق ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جو جنین کے زندہ رہنے تک گرم ہی رہتا ہے۔

اگر جنین خارج ہونے سے قبل عورت کا خون بہ جائے تو جنین کا خارج ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی موت کا خطرہ رہتا ہے۔ مجامعت کی کثرت سے جنین جلد خارج ہوتا ہے۔ عسر ولادت کے بعد زندہ حالت میں جنین خارج ہو تو ناف جنین کو قطع نہ کریں جب تک اسے پیشاب یا چھینک نہ آجائے یا وہ رونہ دے اور اگر وہ خوب دیر تک حرکت نہ کرے تو سمجھو مر جائے گا۔

حاملہ کی آنکھوں میں گہرائی ہوتی ہے اور بیاض چشم دھندھلی ہو جاتی ہے۔ اگر دوران حمل استقلالحمی کے عوارض پیدا ہوں کان اور اطراف ناک سفید ہو جائیں تو یا جنین مردہ ہو گیا مر جائے گا۔ اس کا علاج خوشبودار فرزجوں سے کریں، شراب ریحانی پلائیں، لذیذ غذائیں کھلائیں، یہاں تک کہ اس کی ناک اور کان سرخ ہو جائیں۔

اکثر حاملہ عورتیں مٹی اور کونکہ کثرت سے کھاتی ہیں جو جنین کے سر اور اس جانب کے ہڈی اعظم سے چپک جاتا ہے۔

جن باکرہ عورتوں کو طمث دیر سے جاری ہوتا ہے ان کے رحم میں قوت جاذبہ قوی نہیں ہوتی۔ اس لئے اگر بچہ والی عورت کو طمث جاری ہو تو ایک سال میں دو بار ہاتھ پیروں میں فصد کریں۔ نم رحم کے تنگ ہونے سے بھی حمل سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ جست کی سلائی ہلکے ہلکے داخل کریں۔ ملین دوا کی مالش کریں، شراب پلائیں، حمام کی کثرت کرائیں۔ کرفٹ، کمون،

کندر ہموزن نہار منہ کھلائیں اور کرنب کھلائیں۔

گرم فرزجے اور مسہلات دینے کے بعد گرم پانی میں بیٹھنا بھی حمل کے لئے معین ہوتا ہے۔

رحم کی رطوبت اور چپک دار چیزیں بھی حمل نہیں ہونے دیتیں۔ اس لئے گرم فرزجوں سے رطوبات کو سیلان پر آمادہ کریں اور پھر قابض پانیوں میں بٹھائیں۔ چربی کی زیادتی بھی مانع حمل ہے لہذا ملطف دواؤں سے جسم کو دبلا کرنے کی کوشش کریں۔

نشہ اور شراب نوشی بھی حمل ٹھہرانے میں مانع ہوتے ہیں۔ خاص طور سے شراب ابیض رقیق اور احمر قوی مانع حمل ہیں۔ ایسی حالت میں گرم پانی کے بجائے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا زیادہ مناسب ہے اور ایسی غذائیں جو قوی، چربی اور جلد نفج پانے والی اور اچھی خلط پیدا کرنے والی ہوں۔

نرینہ اولاد مطلوب ہو تو حیض سے فراغت سے قلب جماع کریں اور بائیں خسیہ کو باندھ دیں۔ لڑکی کے لئے اس کے برعکس۔

ولادت کے بعد عورت کو درد اٹھے تو ماء لشعیر، کراٹ اور بکری کی چربی کا شوربہ پلائیں۔

مکھن کے ساتھ پیرمایہ کا حمل حیض سے فراغت کے بعد کرنا حمل کے لئے معین ہوتا ہے۔ انجرہ بری کا تخم پینا بھی مفید ہے۔ تخم ساسالیوس، گائے، بکری وغیرہ کو زیادہ بچے پیدا کرنے کے لئے کھلاتے ہیں۔ رب حصرم حاملہ کے لئے معین ثابت ہوتا ہے۔ خراب چیزوں کی خواہش کو روکتا ہے اور شکم کے لئے بہتر چیز ہے۔ (دیسقوردیوس)

شربت انار جو حقیق کے ساتھ تیار کیا گیا ہو حاملہ عورت کے لئے مفید ہے۔ شلیم کی دھونی، مر، سویق، شعیر یا کندر کے ساتھ یازعفران کے ساتھ دینا حمل میں معاون ہے جو شخص چاہے کہ عورت جلد حاملہ ہو تو وہ کئی راتوں تک مقل اور دوسری ایسی اشیاء جو زیادہ گرم نہ ہوں بطور حمل استعمال کرائیں۔

حاملہ کی قئے کا علاج ”باب القئے“ میں انشاء اللہ مل جائے گا۔ (ابن ماسویہ)

چوتھے یا پانچویں مہینے میں ایسا اسقاط رحم کے اندر رطوبت کی کثرت کے باعث ہوتا ہے۔ ساتویں اور آٹھویں مہینے میں اسقاط کا سبب ریاہ ہوتا ہے۔ ریاہ کا علاج روغن ارنڈ آب میتھی کے ساتھ، بادیان، حب سکینج، حرف ابیض بریاں ابھل کے ساتھ، ختم کرفس، سکر عتیق (پراناکڑ) دھرتا، شترنایا سے ہوتا ہے۔ نیز ہتھنے، دھونی، تیز فرز بے جو نطفہ اسود، صحر، روغن بلساں، نانخواہ وغیرہ سے بنائے گئے ہوں کارآمد ہوتے ہیں۔ شونیز کی دھونی دی جائے۔ زوفا، علک الانباط وغیرہ کا استعمال کیا جائے نیز ایسی اشیاء کا استعمال کیا جائے جو ریاہ کو دفع کریں۔

اگر عورت سیلان خون کی کثرت سے ولادت کے وقت کمزور پڑ گئی ہو تو ایسی تدبیر کریں جس سے اس کی قوت واپس آجائے جس طرح سے دوسری نقاہتوں میں تدبیر کی جاتی ہے۔ جن عورتوں کو کثرت شحم سے حمل نہ ٹھہرتا ہو ان کی فصد کریں اور بار بار گرم ہتھنے کرائیں جس میں شحم حنظل، روغن زیتون، نمک اور بورق وغیرہ شامل ہوں نیز شہد، مراور روغن سوسن حمل کریں۔ (ابن ماسویہ)

دن بھر عورت کو فاقہ کرائیں جب شام ہو جائے تو اس کو اجانہ اور قع (ٹکلی) سے دھونی دی جائے۔ عورت کو ایک کرتا اڑھا دیا جائے تاکہ دھواں رحم میں پہنچے۔ اگر اجانہ کے منہ سے دھواں خارج ہو تو عورت حاملہ نہیں ہے یا پھر عورت صبح کو تھوڑا کھانا کھائے باقی دن کچھ نہ کھائے۔ رات کو لہسن کا حمل کرے اگر لہسن کی بدبو منہ میں آجائے تو بانجھ نہیں ہے۔ (اسلمین) جنوبی ہوائیں اکثر لڑکیوں کو جنم دیتی ہیں۔ اس کا تجربہ اس کا وقت ہوتا ہے جب مرطوب ہوا چلتی ہے۔ شمالی ہوا لڑکے پیدا کرتی ہے۔ شباب کے دور میں اکثر لڑکے پیدا ہوتے ہیں بوڑھے اور نو جوانوں کو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر رباط ذکر اس قدر چھوٹا ہو کہ مقام مقصود تک نہ پہنچے نہ منی کو سیدھاائی سے لیجا سکے تو حمل قرار نہیں پاتا۔ (فلسفی تفورش)

نشے کے عادی لوگ اکثر لا ولد ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مزاج زیادہ مرطوب ہوتا ہے۔ میں نے چرواہوں کو دیکھا ہے کہ وہ ساٹھی کو ایسے ساٹھ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں جو بائیں جانب سے نخصی ہوتا ہے یا اس کے برخلاف دائیں جانب سے ہوتا ہے تاکہ نر یا مادہ پیدا

ہوں۔

ستر ملی لیٹر شہد ہموزن آب باراں کے ساتھ سوتے وقت پلانے سے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ حمل ہے یا نہیں اور یہ مانع حمل ہے۔

بسا اوقات زچہ کو بخار اور درد رحم اس ورم کی وجہ سے ہوتا ہے جو عسر ولادت کی وجہ سے ہو گیا تھا یا استفراغ کی وجہ سے۔ ایسی عورت کو گرم پانی میں بٹھائیں اور آتش جو کا پانی پلائیں۔ اس سے اس کے درد میں سکون ہوگا، قوت واپس آئے گی اور بدن میں تری آئے گی۔ کیونکہ تمام خشک غذائیں اس کے لئے ناموافق ہیں اور خون بہہ جانے کی وجہ سے اسے ترطیب کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آسانی سے مادہ کا تنقیہ ہو سکے اور ماء الشعیر میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ملطف اور تیزی سے تنقیہ لا کر خون کو جاری کرتا ہے اور اس میں ضرورت کے مطابق غذائیت بھی خوب ہے۔ اس کو کئی بار میں تھوڑا تھوڑا کھلانا اور جلد جلد کھلانا مفید ہوتا ہے۔ اگر حمل کی حالت میں پستان دبلے ہو گئے ہوں اور اول مہینوں میں دودھ ٹپکنے لگا ہے تو یہ جنین کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ خاص طور سے اگر بغیر دودھ دبائے ہوئے ٹپکا کرے۔ کیونکہ یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ چھاتیاں زیادہ غذا کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ لیکن اگر پستان بھر پور ہوں تو جنین کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ (یہودی)

گا بھن جانور کی تشریح سے ظاہر ہوتا ہے کہ نر بچہ اکثر داہنی جانب ہوتا ہے۔ رحم کے داہنی جانب سے جاری ہونے والا خون ایسا خون ہے جس کی مائیت کو گردہ بہنے سے جذب کر چکا ہے جبکہ بائیں جانب سے خون کی مائیت کو گردہ بعد میں جذب کرتا ہے۔ چنانچہ جب لڑکا بالغ ہوتا ہے اور اس کا داہنہ بیضہ بائیں سے قبل پھولتا ہے تو اکثر و بیشتر اولاد نرینہ پیدا کرتا ہے اور اس کے برعکس صورت میں نتیجہ برعکس برآمد ہوتا ہے۔ (جالینوس - ابذیمیا)

میں نے لاتعداد عورتوں سے معلوم کیا تو انھوں نے بتایا جب منی بہہ کر خارج ہوگی تو وہ حمل سے نہ ہونیں لیکن جب منی کو انھوں نے روک لیا تو ہو گئیں اور اس حالت میں انھوں نے رحم کو سمٹا ہوا محسوس کیا اور ایسا اکثر ان دنوں ہوا ہے جب حیض کا زمانہ قریب ہو کیونکہ اس وقت رحم منی کی مدد کرتا ہے۔ (کتاب المنی)

کہ عورتوں کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ انھیں حمل قرار پایا گیا ہے کیونکہ وہ مادہ منویہ کا احساس کر لیتی ہیں مرد کی منی بہہ کر ضائع نہیں ہوتی بلکہ اندر رک جاتی ہے۔

(بقراط - کتاب الاجنہ)

اگر جماع کے بعد عورت سو گئی تو حمل ہو جانے کا امکان ہے۔

(رؤف - کتاب المعلوم)

اگر آپ کو ردی خلطوں میں ہیجان لانے کے لئے عورت کو دواء مسہل پلانے کی ضرورت ہو اور حمل چوتھے اور ساتویں ماہ کے درمیان ہو تو صرف ضرورت کے مطابق ہی دواء المسہل دیں لیکن تیسرے مہینے سے قبل اور ساتویں مہینے کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہئے۔ یہ احتیاط جنین کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کیونکہ جنین کی مثال ایسی ہے جیسے درخت سے پھل لگا ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح پھل ابتدا میں کمزور ہوتا ہے اور آخر میں وزن دار ہو کر گرنے کا ہر وقت امکان ہوتا ہے۔ اسی طرح مسہل چیزوں سے بچا جاتا ہے اور اوپر نیچے چڑھنے اترنے سے بچا جاتا ہے اور اگر حاملہ بعض گرم مزاج دوائیں کھا لیتی ہے تو یہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

(کتاب الفصول)

اس کی وجہ یہ ہے کہ حمی مطبقہ جس تدبیر کا محتاج ہوتا ہے وہ تدبیر بچے کے لئے مہلک ہے کیونکہ عورت کو غذا سے روکنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بچہ حرارت حمی کے بعد خطرے میں ہوتا ہے۔ اسی لئے اگر عورت کو شیر خوار بچے سے بچا کر نا وقت غذا دی جائے تو وہ مر جائے گی اور اگر اس کو تشنگ یا مرگی کا عارضہ ہے تو حاملہ اپنے ضعف کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی۔

اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں تو اسے سونے سے قبل ماء العسل پلائیں۔ اگر اس کے پیٹ میں مروڑ ہو جائے تو حاملہ ہے ورنہ نہیں ہے۔ اس بات کا لحاظ رہے کہ پانی اور شہد تازہ اور بغیر جوش کیا ہوا ہوتا کہ وہ ریا ح پیدا کرے کیونکہ اس طرح کے پانی اور شہد پیٹ بھر پی لینے سے (بوقت سکون) ریا ح اٹھتی ہے اور رحم اگر حامل ہوتا ہے تو آنتوں سے مزاحمت کرتا ہے اور اس ریا ح سے مروڑ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر رحم متلی نہ ہو تو ریا ح کا راستہ کھلا رہتا ہے ریا ح نکل جاتی ہے اور مروڑ نہیں ہوتی۔

اگر لڑکے کا حمل ہے تو عورت کا رنگ کھلا ہوا ہوتا ہے اور اگر لڑکی کا ہے تو بد رونق ہوتا ہے۔ اس میں یہ اضافہ کر لیا جائے کہ رنگ کا کھلا ہونا یا سیاہ ہونا قبل حمل کے رنگ کے مقابلہ میں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی کا جنین لڑکے کے جنین کے مقابلہ میں زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ بات عام طور سے ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عورت حسن تدبیر سے اپنے رنگ میں نکھار پیدا کر لے یا اس کے برخلاف ہو۔ یہی حال جنین کی حرکت کا ہے کہ لڑکا لڑکی کے مقابلہ میں زیادہ متحرک اور قوی ہوتا ہے۔

حاملہ کے رحم میں حمہ کا پیدا ہونا عورت کی علامت ہے کیونکہ یہ ورم بچہ کے لئے مہلک ثابت ہوتا ہے اور ورم فلفلمونی وغیرہ سے بھی یہی ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ حمل کے بعد عورت کی دیکھ ریکھ کی جائے جبکہ عورت حد سے زیادہ دہلی ہو تو پیٹ بڑا ہونے سے پہلے اسقاط ہو جاتا ہے کیونکہ بچہ کا تعذ یہ کم ہو پاتا ہے اور وہ ماں کے گوشت میں سے تصرف کرتا ہے۔ اگر عورت کا بدن معتدل ہے اور دوسرے اور تیسرے مہینہ میں بغیر کسی ظاہری سبب کے اسقاط ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قعر رحم رطوبت مخاطی سے پر ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے رحم بچہ کو تھامنے سے قاصر ہوتا ہے اور بچہ پھسل کر ساقط ہو جاتا ہے۔ ظاہری سبب سے مراد یہ ہے کہ بخار، استفراغ یا ورم یا کوڈنے اچھلنے یا ڈریا کوئی عصبی مرض یا فاقہ کشی کی روداد نہ ہو۔ چنانچہ اگر عورت کو بغیر ان اسباب کے اسقاط ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحم کو جانے والی عروق۔ نفر۔ جس سے مشیمہ لگا رہتا ہے۔ رطوبت مخاطی سے پر ہیں۔ اسی طرح ان عورتوں کا حال بھی ہے جو حد سے زیادہ موٹی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی شرب نم رحم سے مزاحمت کرتی ہے اس لئے جب تک وہ دہلی نہ ہو جائیں حمل قرار نہیں پاتا۔

لڑکے کی پیدائش اکثر داہنی جانب ہوتی ہے اور لڑکی بائیں جانب ہوتی ہے کیونکہ داہنی جانب جگر کی مجاورت سے گرم ہوتی ہے۔ دوسرے یہ بھی ہے کہ عورت کا بیضہ کے مقابلے میں مادہ جنس کے لئے نکلنے والی منی زیادہ گرم ہوتی ہے۔

ایک دوسری جگہ پر کہا ہے کہ داہنی طرف آنے والا خون مائیت سے صاف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داہنا گردہ، بائیں گردہ اور رحم سے اونچا ہوتا ہے اور حاملہ کا نم رحم بند ہوتا

ہے اور یہ حمل کی بڑی دلیل ہے اور دایاں اپنی انگلیوں سے اس کا پتہ چلا لیتی ہیں۔
فم رحم کبھی ورم کی وجہ سے بھی بند ہوتا ہے لیکن اس میں سختی ہوتی ہے اور جو فم رحم حمل کے باعث بند ہوا ہو اس میں سختی نہیں ہوتی ہے۔

اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ عورت بانجھ ہے یا نہیں تو عورت کو ایک کپڑا اڑھا کر نیچے سے دھونی دیں۔ اگر دھونی کا اثر اس کے نتھنوں میں محسوس ہو تو وہ بانجھ نہیں ہے۔
میچہ، کندر جو خوشبودار ہوتے ہیں انکی دھونی سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ عورت کے سینہ میں نفوذ کریں سوائے اس عورت کے جس کا رحم بارد کثیف ہو اور حاملہ کو وہ ٹھیک نہیں لگتا۔

دھونی، اجانہ اور نکلی سے دی جاتی ہے تاکہ دھواں صحیح طریقہ سے پہنچ سکے۔ اگر عورت کو عادت کے مطابق زیادہ اور جلدی جلدی طمث جاری ہو اور وہ حاملہ بھی ہو تو ناممکن ہے کہ اس کا بچہ صحت مند ہو۔ اگر ایک یا دو مرتبہ ہوتا ہے تو یہ بچہ کے کمزور ہونے کی دلیل ہے لیکن اگر اپنے اوقات کے اعتبار سے آتا ہے تو بچہ صحت مند نہیں ہو سکتا۔ خواہ کیت کے اعتبار سے صالح نہ کیوں نہ ہو۔ (کتاب الفصول)

ضروری ہے کہ اس میں اس بات کو مستثنیٰ کر لیا جائے کہ عورت انتہائی قوی اور زیادہ پر خون ہو۔ اگر طمث اپنے اوقات پر نہ آئے اور عورت کو سردی اور بخار عارض نہ ہو کر کرب اور متلی اور جث نفس عارض ہو تو حاملہ ہے۔ اس میں بھی لرزہ اور بخار کا استثناء ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ احتباس طمث کا سبب جس میں خلط ردی ہو اس کی وجہ سے لرزہ اور بخار عارض ہوا ہو۔ اگر رحم بارد اور کثیف ہو تب بھی حمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر بہت زیادہ رطوبت ہو تب بھی حمل نہیں ہوتا۔ کیونکہ زیادہ رطوبت مادہ منویہ پر غالب آ جاتی ہے۔ اور اسے جامد اور ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اسی طرح معمول سے زیادہ ہلکا ہونا اور حرارت محرقہ کا موجود ہونا بھی مانع حمل ہے۔ کیونکہ مادہ منویہ غذا نہ پا کر فاسد ہو جاتا ہے۔ تاہم اگر رحم کا مزاج معتدل ہے تو حمل ہوگا اور ولادت ہوگی۔ (مؤلف)

اگر رحم پر سوء مزاج بارد کا غلبہ ہو جائے تو وہاں کی عروق کی منہ بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ افواہ عروق سے مشیمہ کا اتصال ممکن نہیں رہتا

اور اس صورت میں بچہ کا مناسب تغذیہ بھی نہیں ہو پاتا کیونکہ طمث اس حال میں یا تو بالکل خارج نہیں ہوتا یا بہت کم رقیق اور مائی ہوتا ہے اور اس طرح کا رحم اپنے سوء مزاج کی وجہ سے مادہ منویہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ (جالینوس)

برودت رحم اور رحم کی کثرت رطوبت میں حمل قرار نہ پانے کی مثال ایسی ہے جیسے نالی میں تخم ڈال دیا جائے اور رحم یا بس کی مثال ایسی ہے جیسے بنجر زمین میں تخم ڈال دیا جائے۔ اسی مثال سے مادہ منویہ کے مزاجی فساد کو سمجھنا چاہئے۔ (مؤلف)

مادی منویہ یا رحم فساد مزاج کی طرف مائل ہو تو ایسے مرد کے لئے ایسی عورت کا انتخاب کریں جو اس فساد کی ضد پر ہو۔ ایسا کرنے سے صورت حال کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بات کا علم ضروری ہے کہ عقمر (بانجھ پن) کا سبب سدے یا فساد مزاج کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے مزاج رحم کے فساد کیا اعتدال اور افادہ کی تسخیر وغیرہ مزاج کے باب میں لکھی گئی ہیں جو کافی ہیں۔ بات یہ ہے کہ بار دیا بس رحم میں بخارات اس حد تک نفوذ نہیں کرتے کہ اس کا اثر منہ میں اور نتھنوں میں محسوس ہو اور رحم رطب میں معمولی چیز بھی نفوذ کر جاتی ہے کیونکہ وہ بخارات کو جذب کرتی ہے اور ان کو دو گنا کرتی ہے اور رحم کا سوء مزاج حار اس دھونی کی کیفیت میں تبدیلی لا کر ہوا بنا دیتی ہے اور صرف یہی کیفیت دوسری دلیل کی محتاج ہوتی ہے کیونکہ اس کی دلیل ایسے مزاج رقیق سے متعلق ہے جو عورت میں برودت اور رطوبت کے باعث بہت کم واقع ہوتا ہے۔ یہ مزاج حد سے زیادہ دہلی عورتوں میں ہوتا ہے چنانچہ اگر حاملہ کو پچپش ہو جائے تو اسقاط کا موجب ہوتی ہے جس کی وجہ رحم کا معاء مستقیم سے متصل ہونا برابر اور بکثرت دستوں کا ہونا جسمانی تھکان اور شدت درد کا ہوتا ہے۔

اگر عورت ہاتھی کا پیشاب پیئے اور اس کے بعد جماع کیا جائے تو عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زہرن کا پتہ حمل کرنے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں خصی ثعلب ساڑھے ۷ اگرام اور پینتیس گرام شہد خالص بھی ہونا چاہئے۔ (مجبول)

جن کو پہلے دوسرے یا تیسرے مہینہ میں اسقاط ہو جایا کرتا ہے اس کا سبب ریا ح ہوتی ہے اور چوتھے پانچویں اور چھٹے مہینہ میں اسقاط کا سبب رطوبت ہوتی ہے کیونکہ جنین بھاری

ہو جاتا ہے تو پھسل کر ساقط ہو جاتا ہے اور ساتویں آٹھویں یا نویں مہینہ میں اسقاط برودت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسی عورت کا علاج جن کا اسقاط ریح کے وجہ سے ہو۔

ریاح کی صورت میں روغن ارنڈ ہمراہ آب میتھی، رازیانہ، مع تخم اور جڑ کے ذریعہ اور حب سکینج، حرمل و حرف، مقلو ہمراہ ابھل و تخم کرفس، سکر العشیر کے ذریعہ، دھرتا، شرنایا کے ذریعہ علاج کیا جائے۔ اسکے علاوہ تدحین فرز جے، ہننے کا عمل کیا جائے۔ فرز جہ، صحر، روغن بلساں اور نانخواہ سے تیار کیا جائے نیز اس کی دھونی شونیز، مقل اور علک انباط کے ساتھ دیں۔

(ابن ماسویہ)

وہ عورتیں جن کو چربی کے سبب حمل نہیں قرار پاتا ان کی رگ قطع کر کے شہد، روغن سون اور مر کے فرز جے سے حمل کیا جائے اور بطخ کی چربی ملا ہوا حقنہ تین بار کیا جائے۔

عسر ولادت میں نفع بخش دوا:

مر، قنہ، جند بیدستر، جاوشیر، گائے کا پتہ، کبریت (کندھک) ہموزن لے کر پیس لیں اور عورت کو اس کی ساڑھے تین گرام دوا کی دھونی دن میں تین بار دیں۔ جب ولادت میں مشکل ہو اور جنین مردہ نہ ہو تو جلدی کرنے لئے ہدایت کریں اور روغن رازقی کی مالش کریں۔ عورت کو دو سو گرام آب میتھی پلائیں۔ مشک اور کھرباء کی دھونی دیں تاکہ اس کی روح کو تقویت ہو۔ ماکولات و مشروبات سے تقویت دیں اور خوشبو یا ت اور خوش گفتاری سے اس کی ڈھارس بندھائیں اور ولادت سے پاکی نہ ہو تو نمکین مچھلی کی آنکھ اور گھوڑے کے کھر کی دھونی دیں۔ یہ حیض جاری کرتا ہے اور مخرج مشیمہ ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ مشیمہ اندر باقی نہ رہے ورنہ ورم حار رحم میں ہو جاتا ہے۔ عسر ولادت کی صورت میں ناک میں معطس (چھینک لانے والی) دوا کا نفوخ کرنا بھی فائدہ مند ہے۔

مشیمہ کو خارج کرنے والی دوا:

رماد کا تیز پانی لیکر اس میں غطی چھڑک دی جائے اور کندس کے ساتھ چھینک لائی جائے اگر جنین نہیں مرا ہے اور حمل کو چار روز گزر گئے ہیں تو بچہ اس دوران مر جائے گا۔ اس

صورت میں صرف عورت کو بچانے کی تدبیر کریں اور قوی دوائیں آب سداب، روغن حلبہ جوش دیکر مع تمر دیں۔ جب اسقاط ہو جائے تو حمل، خردل اور مقل وغیرہ کی دھونی دیں تاکہ خون غلیظ ہو کر فاسد نہ ہو جائے اور جس کے نتیجہ میں ورم لاحق ہو جائے۔ (کتاب فی الارحام)

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دائیاں عورت پر نظر رکھیں اگر سر پستان پھیلا ہوا اور بدلہ ہوا دکھائی دے تو عورت حاملہ ہے۔ اسی طرح اگر اس کی آنکھیں گہری ہو گئی ہیں اور پپوٹے ڈھیلے ہو گئے ہیں، نظرتیز ہو گئی ہے، حلقہ چشم سیاہ ہو گیا ہے اور بیاض چشم میں گدہ پن آ گیا ہے تو حمل ہوگا اور جب عورت کا شکم گولائی میں بھرا ہوا ہو اور کسی قدر سخت ہو اور رنگ میں نکھار ہو تو لڑکا ہونے کی علامت ہے اور جب عورت کھڑے ہونے پر پہلے داہنا پیر اٹھائے تو لڑکا ہونے کی علامت ہے۔ اس کے برخلاف ہو تو لڑکی ہے۔ میں نے اس کا تجربہ بہت بار کیا اور ان باتوں کو صحیح پایا اس لئے میں نہیں کہتا ہے کہ اتفاق ہے

اگر عورت کا شکم لمبائی میں پھولا ہے اور اس میں ڈھیلا پن ہے اور اس کی جلد پر جھائیاں اور دھبے زیادہ ہوں تو یہ لڑکی ہونے کی علامت ہے۔ سر پستان کا معائنہ کریں اگر سرخی مائل ہو تو لڑکا ہوگا۔

حاملہ کا دودھ دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر دیکھیں اگر بہت زیادہ لیسدار اور گاڑھا ہو تو لڑکا ہوگا ورنہ لڑکی ہے۔

عورت کے دودھ کو لوہے کے آئینہ پر ٹپکائیں اور بغیر ہلائے ہوئے دھوپ میں رکھیں ایک لمحہ بعد اگر وہ سکڑ کر موتی کے دانے کے برابر ہو جائے تو لڑکا ہے اور اگر منتشر ہو جائے تو لڑکی ہے۔ اگر بچے کی تعداد جاننا ہو تو حاملہ کی ناف کو دیکھیں اگر مشیمہ کی جانب سلوٹیں ہیں تو ان سلوٹوں کی تعداد اولاد کی تعداد کے برابر ہوگی اور اگر سلوٹ نہ ہو تو آئندہ بچہ نہیں ہوگا اور اگر اسقاط ہوا ہے تو یہ دلیل باطل ثابت ہوگی۔

(حمل کے موضوع پر کتب جالینوس سے ماخوذ)

نشہ کرنے والے لوگ اکثر لاولد ہوتے ہیں۔ (مسائل ارسطاطالیس)

موٹی عورت لاولد ہوتی ہے اگر حمل ہو جائے یا تو اسقاط ہو جاتا ہے یا واضح حمل میں دشواری ہوتی ہے۔ (روفس)

جماع کی مداومت مستقل محنت و مشقت اور تھکن کے کام نطفہ کو فاسد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نابالغ لڑکی سے جماع کرنا جانور سے جماع کرنا اور جماع کی دوسری شکلیں اختیار کرنا روغنیات کا کھانا ترک کر دینا، کھٹائی اور نمک وغیرہ کا کھانا مستقل کھانا بھی لاؤلد بنا دیتا ہے۔ بہت زیادہ رقیق یا غلیظ نطفہ یا بدبودار نطفہ یا جس کا رنگ متغیر ہو اور وہ جس کی حرارت اعلیٰ میں محسوس ہو حمل ٹھہرانے کے قابل نہیں ہوتا اور چھونے میں ٹھنڈا نطفہ بھی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ صحیح نطفہ سفید شفاف لیسدار ہوتا ہے اس پر مکھی بیٹھتی ہے اور اس کو چوستی ہے۔ اس کی بو خرما کی کٹی اور یا سمین جیسی ہوتی ہے۔ ایسے نطفہ سے حمل قرار پاتا ہے۔ (مجبول)

پندرہ سال سے چالیس سال کے درمیان کی عورت بہت جلد حاملہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ جس کا رحم کیفیات کے اعتبار سے معتدل رہتا ہے اور وہ جس کو حیض وقت پر آتا ہو، کھانا پینا معتدل درجے کا ہو اور نفسیاتی طور پر خوش و خرم ہو جلد حمل قبول کرتی ہیں۔ اگر بارہ سال سے کم کی عورت حاملہ ہو جائے تو صغر رحم کی وجہ سے زیادہ امکان اس کے ہلاک ہو جانے کا رہتا ہے لیکن اس عمر بہت کم امکان حمل کا ہوتا ہے جس عورت کو شدید غم مستقل لاحق رہتا ہو حاملہ نہیں رہتی اور جس عورت کا مستقل طور سے طمث بند رہتا ہے وہ بھی حاملہ نہیں ہوتی۔

حمل کے وہ اوقات جن میں حمل کے امکانات بڑھ جاتے ہیں:

جب اوائل ایام حیض میں اور جب جسم غذا کے اعتبار سے معتدل ہو تو پاک ہونے کے بعد حمل جلد قرار پاتا ہے کیونکہ اس وقت فم رحم کھلا ہوا ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے اور انیق رحم خروج دم حیض سے پہلے یا وقت حیض آنے تک کھردرا ہوتا ہے لیکن وہ جب اپنے انتہائی درجہ پر ہو تو وہ وقت استفرغ حمل کے لئے ناموافق ہوتا ہے کیونکہ اس وقت رحم رطوبت سے پر ہو جاتا ہے۔

استقرار حمل کی علامات:

عورت جماع کے وقت کوئی دقت محسوس نہیں کرتی اور فم رحم کے اندر تری نہیں ہوتی استقرار حمل کی خواہش مند عورت کو چاہئے کہ پہلے آرام کرے اور کھانا تھوڑا کھائے اور تھوڑی چہل قدمی کرے۔ غذا زود ہضم ہونی چاہئے۔ نمکین اور چہری اشیاء نہ کھائے پھر اس کے بعد جماع کے عمل میں مشغول ہو اور انزال میں دیر نہ کرے اور جب حاملہ کو خراب اشیاء کھانے کی خواہش ہو تو لطیف عمدہ غذاؤں کا اہتمام کرائیں۔ ساتھ میں حمام اور خوشگوار مقوی معدہ غذا اور خوشگوار مشروبات کا التزام کرائیں۔ اگر یہ تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو پیٹ چلے گا

اور بھوک کم ہو جائے گی۔

اگر حاملہ کو کھانے کے بعد قے ہو جانے کی شکایت ہو تو کھانے کے بعد اس کے پیر کو دبائیں اور اس کے مقامِ معدہ پر قابض ضماد رکھیں اور اس سے کھٹے انار کے دانے چوسنے کو کہیں۔
لڑکے کے حمل میں عورت کا رنگ سرخ اور لڑکی کے حمل میں زرد یا سبز ہوتا ہے۔ اس طرح لڑکے کے حمل میں دائیاں پستان بڑا اور بائیاں چھوٹا ہوتا ہے لیکن جڑواں حمل ہو تو یہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔

بہت زیادہ حاملہ ہونے والی عورتیں زیادہ بالوں والی ہوتی ہیں ان کی عروق کشادہ ہوتی ہیں دورانِ حمل خون آتا دیکھتی ہیں ایسی عورتیں جلدی جلدی حاملہ ہوتی ہیں۔ حمل پہ حمل قرار پاتا ہے۔

جب حاملہ کو شدید درد اٹھنے لگیں تو اسے کرسی پر بیٹھائیں اور پردہ صفاق کے پھٹنے کا انتظار کریں جب پیشاب سے بھرا ہوا پردہ صفاق پھٹ جائے تو عورت اس قدر زور لگائے کہ جنین خارج ہو جائے۔ پتلی کو کھکا ہونا، تنگ فرج کا ہونا اور پتلی دہلی ہونا وضع حمل کے لئے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ شدید سردی اور شدید گرمی عسر و لادت کا باعث ہوتی ہے۔ سردی جمود پیدا کرتی ہے اور گرمی استرخاء پیدا کرتی ہے۔ اس طرح اگر عورت کوئی غم کی خبر سن لے تب بھی ولادت میں دقت پیش آتی ہے۔

جس عورت کا رحم کے اندر رطوبت نا کافی ہو زیادہ خشکی ہو یا جس کا مشیمہ چاک ہو کر ولادت سے بہت پہلے رطوبت اس قدر بہہ چکی ہو کہ خشکی آگئی ہو تو اس کے فم رحم میں سفید موم اور بنفشہ یا انڈے کی سفیدی اور مرغابی کی چربی اور آبِ میتھی اور دوسری لعابات لگائیں۔

اگر مشیمہ اس قدر سخت ہو کہ چاک نہ رہا ہو تو ایک باریک لوہا داخل کر کے اسے چاک کریں تاکہ رطوبت بہہ نکلے۔ اگر جنین بڑا ہو اور اس بات کا پتہ چل جائے کہ خارج ہونے والا نہیں ہے تو صنایر سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مردہ جنین کو باہر خارج کر دیں۔ (میسوس)

ضروری ہے کہ نفخ پیدا ہونے سے پہلے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اگر جنین کا سراگر بڑا ہے تو صنایر سے ٹکڑے کر کے خارج کریں اور اگر اس کی گردن ٹیڑھی ہو تو اس کو ہاتھ سے سیدھا کریں اگر ممکن نہ ہو تو اسے بھی کاٹ دیں اگر جنین کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں تو ان کو گھمائیں اگر سیدھے ہو جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ عورت کو زور سے حرکت دیں اگر اس سے بھی درست نہ ہو تو کاٹ دیں۔ عورت کو ایک ہلکی چارپائی پر لٹا کر سر کو ٹیک لگا کر پیروں کی طرف

سے زور سے دھکا دیں، ہلائیں اور اس کو چار پائی سے باندھ دیں تاکہ گرے نہیں۔ اس طرح مختلف شکلوں سے جنین کے سر کو نیچے کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ شدید قسم کے عسر ولادت میں کپڑے کی پٹی کسی عضو میں باندھ کر باہر کھینچیں۔

زیادہ موٹی عورت کو عسر ولادت رحم پر چربی جمع ہونے کی وجہ سے پیش آتا ہے لہذا ایسی عورت کو گھٹنوں کے بل بٹھا کر اس کے سر کو پیچھے کی طرف جھکائیں تاکہ رحم کی جگہ سے پیٹ اوپر اٹھ جائے۔ ایسا کرنے سے جنین خارج ہو جائے گا۔ اگر شکم میں ورم یا سختی کی وجہ سے رحم پر دباؤ ہو تب بھی یہی تدبیر کریں۔ بوڑھی عورت قوت کے فقدان سے عسر ولادت میں مبتلا ہوتی ہے۔ لہذا ایسے میں دونوں ہاتھوں سے جنین کو باہر نکالنے میں اس کی مدد کریں۔ پیشاب یا پاخانہ سے مسانہ یا آنتیں بھری ہوتی ہیں تب بھی عسر ولادت ہوتا ہے۔ اگر ایسا یقین ہو جائے تو اس قدر حقنہ کریں اور گرم پانی میں بٹھائیں کہ پیشاب پاخانہ خارج ہو جائے اگر رحم میں زخم کی وجہ سے عسر ولادت ہو تو اس کی تکمید کریں اور رحم میں روغن زیتون اور چربی لگائیں اور عسر ولادت کا سبب خشکی ہو تو شیریں حار پانی اور روغن اور بطخ کی چربی اور مرغابی کی چربی اور گائے کی ہڈی کا گودا استعمال کریں۔ اگر جنین متورم ہو گیا ہے اور طبعی شکل میں نہیں آ سکتا تو صنایر جو اس مقصد کے لئے مخصوص ہوتے ہیں، کی مدد سے جنین کے ٹکڑے کر کے پورا نکال لیا جائے۔

مشکل سے جنین کا اخراج:

عسر ولادت کی وجہ سے ضعف قوت ہو تو بیضہ نیم برشت اور شراب، عمدہ پانی، روٹی اور تھوڑا میدہ استعمال کریں۔ اگر وجہ بدہضمی ہو تو آب زیرہ، سداب کے ساتھ دیں۔ اگر بروقت رحم کی وجہ سے عسر ولادت ہو تو گرم روغن زیتون سے مالش کریں۔ اگر گرمی یا استرخاء کی وجہ سے عسر ولادت ہو یا استرخاء ہو تو خوشبودار مقام پر بٹھلائیں اور اس پر گلاب پاشی کریں تاکہ اسے لذت آئے۔ جنین کا نئے وقت لولب سے فرج کو کھولیں تاکہ فم رحم کھل جائے۔

اخراج مشیمہ:

اخراج مشیمہ کے وقت عورت سے کہیں کہ وہ منہ کھول کر خوب لمبی لمبی سانس لے اور چھینکنے کی کوشش کرے۔ اس سے مشیمہ اگر نہ خارج ہو رہا ہو تو اپنا ہاتھ اندر داخل کر کے ہلکے ہلکے باہر کھینچیں۔ اگر اس طرح ہلکے سے خارج نہ ہو رہا ہو تو زور سے ہرگز نہ کھینچیں بلکہ مقام پر دھاگے سے صنارہ لٹکا کر عورت کی ران سے باندھ دیں پھر مرہم باسلیقون رحم کے اندر بذریعہ حقنہ داخل کریں۔ ایسا کرنے

سے مشیمہ ساقط ہوگا۔ عورت کو مخرج مشیمہ اشیاء کھلائیں۔ باز کی بیٹ کو شراب طلاء کو گھول کر شراباً استعمال کرنے سے لاو لد عورت کو حمل قرار پا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔

بلخ کی بیٹ روغن گل میں ملا کر عضو مخصوص پر طلاء کر کے عورت سے جماع کیا جائے تو حمل قرار پا جاتا ہے۔ بشرطیکہ عورت گدی کے بل لیٹے پھر اپنے پیروں کو کھینچ لے اور اسی پوزیشن میں تھوڑی دیر تک سانس روکے رکھے یہاں تک کہ منی اندر قبول کر لے۔ اس طرح فوراً حمل قرار پا جاتا ہے۔

یا زخر گوش کا پنیر مایہ شراب کے ساتھ پئے تو لڑکا اور مادہ زخر گوش کا پنیر مایہ پئے تو لڑکی کا حمل ہوتا ہے۔

اگر عورت مادہ ریچھ کا مرارہ شراباً استعمال کرے اور زرخچھ کا مرارہ استعمال کرے تو لڑکا ہوتا ہے۔ جس کی مقدار تین گرام ہے اور اسے خون طمث بند ہونے کے بعد لیا جائے۔ (اطہور سفس) جب عورت محسوس کرے کہ اس کے سارے جسم میں گرانی ہے، بھوک جاتی رہی، بے چینی سے جسم میں لرزہ ہے، قلق اور متلی ہے اور عجیب و غریب کھانے کی خواہش ہے تو دوائی سے کہہ کر انیق رحم کا معائنہ کرائے۔ اگر بغیر سختی کے رحم کا منہ بند ہے تو یہ حمل کی دلیل ہے۔ اگر عورت دوسرے تیسرے اور چوتھے مہینے میں اسقاط کرتی ہے تو سمجھنا چاہئے کہ اس کے عروق رحم میں بلغی رطوبت جمع ہے اور مشیمہ کا اتصال عروق سے کمزور ہو گیا ہے۔ اس لئے جنین کا بوجھ اس کے لئے ناقابل برداشت ہے اور مشیمہ منقطع ہو کر علیحدہ ہو گیا ہے۔ (کتاب الاعضاء الآلمہ)

حاملہ عورتوں کے جسم میں اکثر فضلات کا اجتماع ہو کر قے، رال، درد سر، درد معدہ، بھوک کی کمی وغیرہ عوارض پیش آتے ہیں۔ اس میں معتدل چہل قدمی سے فائدہ ہوتا ہے۔ میٹھی چیزوں کے علاوہ دوسرے کھانوں اور اعتدال کے ساتھ پرانی شراب ریحانی کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے اور جو شانہ برسیاں دارو اور آب برسیاں دارو استعمال کریں۔ نیز کھانے سے پہلے اور بعد سوئے کا جو شانہ شراب کے ساتھ پی لیں۔ فم معدہ پر انگور کے پھول اور گلنار کا ضاد کریں اور معدہ کے باب میں بیان کئے گئے مسکنات کا استعمال کریں۔ موافق شراب اور طعام معتدل چہل قدمی اور ریاضت مفید ہے۔ لیکن بھاری ورزش نامناسب ہے۔ اگر بھوک کی خواہش نہ ہو تو چڑچڑی چیزیں خاص طور سے رائی کھانی مفید ہے۔ پیروں پر نرم ہو تو برگ کرنب اور قیولی یا نبیند کے ساتھ دیں اور اترج کے جو شانہ سے دونوں پیروں کو دھاریں۔ (اور بیاسیوس)

حاملہ عورتوں کو اکثر و بیشتر فضلات کی کثرت، متلی، خفقان، قلت اشتہاء کی شکایت وغیرہ

لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کا ازالہ چہل قدمی اور ایسے کھانوں سے جو میٹھے نہ ہوں، ہو جاتا ہے اور پرانی شراب ریحانی ان عوارض میں مفید ہے۔ سداب تھوڑی مقدار میں ہر مشروب کے ساتھ پینا کثرت فضلات اور متواتر قے کے لئے مفید ہے۔ دواؤں میں عصی الرعی (لال ساگ) کا جو شانہ اور سوئے کا جو شانہ نیز ریوند چینی کھانے سے قبل اور بعد لینا نیز برگ کرم، گلنار اور کرفس رومی، تخم رازیانہ کا خارجی ضاد مفید ہے۔ بادیان کو تنہا یا قصب اور پرانی شراب کے ساتھ بھی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ معدہ پر اس کا ضاد کرنا بھی مفید ہے۔ خفقان کے لئے گرم پانی گھونٹ گھونٹ لینا ہلکے چلنا اور شرا سیف پر گرم کپڑے سے رگڑنا مفید ہے۔

تیسرے مہینے اور اس کے قریب حاملہ کو خراب اشیاء کے کھانے کی خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے فم معدہ میں بکثرت فضلات جمع ہو جاتے ہیں اور جنین کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان فضلات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کچھ خرچ ہو جائے۔ چنانچہ ساری رطوبت معدہ میں جمع ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں بعض اوقات چہ پری اشیاء کا کھانا خاص طور سے رائی کا استعمال مفید ہے۔ پیروں میں ورم عارض ہونے کا بیان اور ام کے تحت مذکور ہے۔ (بولس)

جنین کی حفاظت کے لئے زرنباد، درونج اور دواء المسک مفید ہیں اور ایسے گرم ہتھے مفید ہوتے ہیں جن کے اندر صحر، بابونہ، میتھی، سویا، نانخواہ اور روغن رازقی شامل ہوں۔

نفاس کی حالت میں حیض آئے تو آٹے کو شراب میں ملا کر دونوں پہلوؤں پر چڑھا کر مسکن ثابت ہوتا ہے۔ اس سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ (مجبول)

جس عورت کو بتیس دن میں حیض آتا ہے وہ لڑکے جنتی ہے اور جو بیالیس دن میں حائضہ ہوتی ہے وہ لڑکی جنتی ہے۔ (کتاب الجنین - بقراط)

جلد حائضہ ہونا گرمی طبع کی دلیل ہے اور جو اس حال میں ہوگا اس کے لڑکا جننے کے امکانات زیادہ ہونگے۔ (مؤلف)

ثقل حمل کی حالت میں زیادہ غسل نامناسب ہے کیونکہ جنین کے لئے مسخن ثابت ہوتا ہے۔ (طبری)

اُس عورت کے لئے ایک عجیب و غریب نسخہ نعر زجہ جس کو حمل قرار نہ پاتا ہو۔ زعفران، حماما، سنبل، اکلیل الملک ہر ایک بارہ گرام ساؤج اور قردمانا پینتیس پینتیس گرام، مرغابی کی چربی اور انڈے کی زردی ستر گرام، روغن نار دین ۳۵ گرام کو ایام سے فراغت کے بعد آسمانی رنگ کے کپڑے کے ساتھ حمل کریں۔ روزانہ غسل نہ کرے بلکہ شروع

میں تیسرے دن مشارہ عاج پینا بھی بالخاصہ فائدہ مندہ ہے خرگوش کا پنیر مایا اور خرگوش کا فضلہ بھی حمل کیا جاتا ہے۔ اس کی مدد کے لئے مسخن خوشبودار فرزجے حمل کئے جاتے ہیں۔ رات کو حمل کر کے عورت سو جائے اور پھر ایک ماہ بعد مجامعت کرے۔

نسخہ فرزجہ:

مرچودہ گرام، ایرسا، خرگوش کا فضلہ ہر ایک سات گرام کو بہ شکل فرزجہ حمل کریں۔ ہر تیسرے دن فرزجے کو بدل کر سات دن تک پورا کریں۔ اگر منی جلد پھسل کر خارج ہو جاتی ہے تو مسخن اور قابض فرزجہ استعمال میں لائیں۔ یہ خوشبودار بھی ہوتا کہ امساک پیدا کرے۔ اس کا حمل کچھ دنوں تک کیا جاتا ہے۔ سنبل، زعفران، شبث، سک، مسک وغیرہ کا فرزجہ بنائیں اور دار شیعان اس مقصد کے لئے عجیب دوا ہے۔ جوز السرو، مر، میعہ سائلہ، حب الغار، بارزدکی مشروب میں گوندھ کر فرزجہ بنالیں۔ اس نسخہ کو دایاں استعمال کراتی ہیں اور جس کو موٹا ہونے کے باعث حمل نہ ہوتا ہو اس کی فصد کریں۔ اسہال کرائیں غسل مصفی، تسکین، مقل، روغن سوسن اور مرآسمانی رنگ کے کپڑے میں لت کر کے حمل کریں۔ اس سے پہلے شحم حنظل کے جوشاندے کا حقنہ کریں۔ اس سے کثیر رطوبت خارج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صمغ کنکر (۱) کا حمل بھی رحمی رطوبتوں کو کثیر مقدار میں نکالتا ہے اور تنقیہ کرتا ہے۔

ایک اچھا نسخہ حقنہ:

جس عورت کے رحم میں بہت زیادہ رطوبت ہو اور اس کی وجہ سے اسقاط ہو جاتا ہو اور جس کی علامت یہ ہے کہ جماع کے بعد عورت بہت زیادہ تری و رطوبت دیکھے اس کے لئے مندرجہ ذیل حقنہ کا نسخہ کارآمد ہے۔ پوست کندر، سعد مرصوص ایک ایک حصہ اور مرآدھا حصہ تین گنے پانی کے ساتھ ابالیں جب ایک چوتھائی پانی رہ جائے تو چھان کر ہر تیسرے دن ایک سو پانچ ملی لیٹر سے حقنہ کریں اور قابض اشیاء سے حمل کرائیں۔

پہلے اور دوسرے مہینہ میں اسقاط حمل ریا ح کے باعث ہوتا ہے۔ چوتھے سے نویں مہینے تک رطوبت کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس وقت جنین بھاری ہو جاتا ہے اور آخر کے مہینوں میں زیادہ حرکت وغیرہ سے۔ لہذا ریا ح کا علاج روغن ارنڈ، دھرتا، شترنایا، جند بیدستر، زرنباد، درونج، نانخواہ، صحر، روغن بلساں کے ذریعہ علاج کیا جائے۔ ان دواؤں کے علاج شونیز

(۱) شاید یہ لفظ کنکرزد۔ تراب الہی۔ ہے جیسا کہ بحر الجواہر میں ہے۔

اور مقل وغیرہ سے دھونی دی جائے۔

اور اگر اسقاط کا سبب رطوبت ہے تو مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کریں۔

تازہ اندرائن اوپری حصہ کاٹ کر اس میں روغن سوسن بھر دیں اور کٹے ہوئے سر سے سوراخ کو بند کر کے گل حمکت کر دیں اور اسے انگاروں پر رکھ دیں حتیٰ کہ اس میں دوبار جوش پیدا ہو جائے۔ پھر اس کے نیم گرم تیل سے رحم میں حقنہ کریں۔ یہ عمل رحم بارد میں مفید ہے اور رحم سے رطوبات کو جاری کرتا ہے۔ یا کوئی تریاق مثلاً تریاق اربعہ یا تریاق عز رہ یا تریاق میسون تینوں میں سے کوئی ایک روغن بلساں، جند بیدستر، درونج اور زفتِ رطب کا حمل کریں۔ حاملہ ہونے کی پہچان خواہش جماع کا خاتمہ اور نم رحم کا بغیر ورم کے بند ہو جانا ہے اور آپس میں چپک جانا ہے اور یہ کہ جماع سے فارغ ہونے کے بعد اس کو پھر خواہش نہیں ہوتی کیونکہ نم رحم کا کسی قدر سخت پانی ہے اور جماع کے وقت تھوڑا بہت پانی محسوس کرتی ہے۔

ناف اور مہبل کے درمیان درد محسوس کرتی ہے۔ دونوں چھاتیاں سبز ہو جاتی ہیں اور پھول جاتی ہیں اور پہلے سے زیادہ بھاری ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کی سفیدی گدلی ہو جاتی ہے۔ جلد کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، کمودت آ جاتی ہے اور چھائیں جیسے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ کھٹی اور خراب اشیاء کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ علامات چوتھے مہینہ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بقراط نے اس کی صحیح تشخیص کے لئے آب شہد سے مفص و مروڑ مقرر کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شہد گنگنے پانی میں ڈال دیں اور اس کو بغیر ابالے اور بغیر ہلائے خوب کھانا کھلا کر عورت کو پلائیں۔ اگر وہ حاملہ ہے تو ریا ح معاء مستقیم کی طرف نہیں جاسکے گی۔ امتلاء رحم کی وجہ سے جس کے باعث آنت کے اوپر دباؤ پڑتا ہے اور ریا ح آنتوں میں گھومتی ہے اور مروڑ پیدا کرتی ہے۔ معتدل ورزش حاملہ کے لئے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح معتدل غذاؤں کے استعمال سے طبعی اجابت کا ہونا گوشت، کم چربی کے شوربے اور پرانی شراب ریحانی، زبیب، انار، سفرجل، کمثری اور قابض چیزیں اور سیب وغیرہ کھلا کر طبیعت میں نرمی پیدا کریں۔

عورت کو چاہئے کہ مٹی کے بدلے بھنا ہوا چنا اور بھنا ہوا گیہوں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھاتی رہے اور معدہ پر خوشبودار قوی ضما د کرے مثلاً جگر کے ضما دات میں سے کوئی ضما د اختیار کرے۔

جوارش لؤلؤ کا استعمال حاملہ کے لئے درد رحم اور ریا ح میں مفید ہے اس کا نسخہ مندرجہ

ذیل ہے۔

لؤلؤ (موتی) بغیر سوراخ والے، عاقر قرحا، ہر ایک ساڑے تین گرام، زنجبیل، مصطکی ہر ایک چودہ گرام، زرنباد، درونج، بزر کرفس، شیطرج، قاقلہ، جوز بوا، بسباسہ، قرفہ ہر ایک سات گرام بہمن سفید، بہمن سرخ، دار فلفل ہر ایک دس گرام دار چینی ساڑھے ستر گرام، شکر سلیمانی ساری اجزاء کے ہموزن۔ سب دواؤں کو پیس کر ساڑھے چار گرام سے نو گرام تک شراب میں ملا کر لیں اگر ضعف جگر ہو تو جوارش سفر جل استعمال کریں۔

مانع اسقاط دوا کا نسخہ:

زرنباد، درونج، جند بیدستر، مسک، حلتیت، ہیل بوا، عقص، طباشیر ہر ایک ساڑے تین گرام، زنجبیل پینتیس گرام اور شکر ستر گرام سب دواؤں کو شہد میں حل کر کے روزانہ ساڑھے چار گرام ٹھنڈے پانی سے کھائیں دھرتا اور دواء المسک بھی اس مرض میں موافق ہیں۔

(ابن سرائیون)

رحم میں حادث ہونے والے تربل کا بیان (اورام رخوہ) کے باب میں ملاحظہ کریں۔ جب نفاس والی عورت کو اسہال ہو جائے تو وہ بچے کے ساتھ ساتھ اسقاط کر کے مر جائے گی۔

(مؤلف)

جو چھاتیوں میں قبل از وقت دودھ آجائے تو یہ بات جنین کے کمزور ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اگر چھاتی دہلی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنین کو غذا دینے والا مواد رحم کے اندر کم مقدار میں ہے۔

اگر بچپن سے بلوغت سے پہلے داہنا بیضہ بائیں بیضہ سے پہلے پھولے تو یہ لڑکا جننے کی علامت ہے۔ (کتاب منافع الاعضاء)

لڑکا مرد کی منی کی زیادتی سے اور لڑکی عورت کی منی کی زیادہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر غسل کے روز عورت سے جماع کیا جائے تو لڑکا ہوتا ہے اور اگر پانچواں دن ہے تو لڑکی۔ چھٹا دن ہے تو لڑکا۔ ساتواں دن ہے تو لڑکی۔ آٹھواں دن ہے تو لڑکا۔ نوواں دن ہے تو لڑکی۔ دسواں دن ہے تو لڑکا۔ گیارہواں دن ہے تو منث۔ استقرار حمل کی علامات یہ ہیں: منی بہکر خارج رحم نہیں آتی۔ رحم میں اختلاج ہوتا ہے۔ عورت کو کاہلی ہوتی ہے، نیند آتی ہے اور ہلکی سی جھرجھری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آواز کمزور ہوتی ہے، آنکھیں گہری ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی پلکیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ مشغہ اور سر پستان سیاہی مائل ہو جاتے ہیں۔ (الہندی)

ایسی حاملہ کے علاج کے لئے نسخہ جس کو حیض جاری ہو جائے:

غسل کے روز پندرہ گرام کماۃ چار سو ملی لیٹر پانی میں اتنا ابالیں کہ ایک تہائی رہ جائے۔ اس پانی سے صبح، دوپہر شام تین بار فرج کو دھوئیں۔ روغن زنبق اور برگ یاسمین سے محمول کریں اور اسی حالت میں جماع کریں۔ اس سے حمل قرار پائے گا اور لڑکا لڑکی کا علم تو بس صرف اللہ عالم الغیب ہی کو ہے۔ (بخثیثوع)

چوتھا باب

ولادت میں سہولت، جنین اور مشیمہ کا اخراج، مانع حمل، تدبیر نفاس وزچہ، عسر ولادت کی علامات اور ولادت کی سہولت، اسقاط، رجاء کی علت جسے حمل کا ذب کہتے ہیں اور دروزہ میں شدت لانے والے اسباب۔

چھینک لانا ولادت میں آسانی پیدا کرتا ہے اور مشیمہ کو خارج کرتا ہے۔

(کتاب الفصول۔ باب پنجم)

قرمانا ایک گرام آب نیم گرم کے ساتھ کھانے سے فوراً بچہ خارج ہوتا ہے تاہم عورت کو کھلی ہو جاتی ہے۔ حکم اور جرب کا پیدا کرنے میں قرمانا (۱) خردل کی مانند ہے۔

(جالینوس۔ کتاب السموم)

بقراط نے حاملہ کو کودنے کا حکم دیا یعنی پیچھے کی جانب چھلانگ لگائے ایسا کرنے سے منی اندر سے ساقط ہو جاتی ہے۔ (کتاب المنی۔ بقراط)

ٹھنڈے موسموں میں اور ٹھنڈے شہروں میں بوقت ولادت دشواری ہوتی ہے اور اسقاط زیادہ ہوتے ہیں اور ولادت میں عورتوں کی موت واقع ہوتی ہے۔ ایسے حال میں حاملہ کو دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہئے اور نفاس سے متعلق تدابیر اختیار کی جانی چاہئیں۔

(کتاب ابذیمیا)

جسمانی نرمی اور ڈھیلا پن ولادت میں سہولت پیدا کرتا ہے اور ایسی کیفیت گرم تر شہروں میں قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے جبکہ سرد و خشک شہروں کے لوگوں میں اس کے برعکس

(۱) اصل نسخہ میں لفظ حرلی گری لکھا ہوا ہے۔

ہوتا ہے۔ (کتاب الفصول۔ باب اول)

لہذا موافق حال کرنے کے لئے آبز، مالش، حمام وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ (مؤلف)

عسر ولادت تصرف پیدا کرنے سے بھی واقع ہوتا ہے اور برودت اور جسم کی صلابت سے بھی عسر ولادت ہوتی ہے کیونکہ عروق صدر اور عروق رحم ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس سے سل، نرف اور عضلات و اعصاب میں کھنچاؤ کی شدت سے انقطاع پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں کبھی کبھی کزاز ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اگر جسم زیادہ کثیف ہو تو مراق بطن تک بھی چاک ہو جاتا ہے۔ (الفصول)

اسی لئے ولادت کے قبل مالش کی جاتی ہے اور گرم پانی استعمال کرایا جاتا ہے تاکہ پورے جسم میں نرمی آجائے اور ہوائے محیط حرارت کی طرف مائل ہو جائے اور جسم کو پسینہ آتا رہے۔ حمام، آبز، تمرغ کرائی جائے۔ مراق، کولھے، کمر، سینہ پر بار بار ہلکی مالش کی جائے۔ ماکولات و مشروبات مسخن، ملین غذائیں دی جائیں۔ یہ تدابیر جسم سے سختی کو دور کرتی ہیں اور جسم میں نرمی لا کر ولادت میں آسانی پیدا کرتی ہیں۔ (مؤلف)

ایک نسخہ بخور جو مردہ جنین کو خارج کر کے عورت کو نجات دلاتا ہے۔

بہروزہ، کبریت، جاو شیر گائے کے مرارہ میں گوندھ کر عفص کے دانہ کے برابر گولیاں بنالی جائیں اور عورت کو دو یا تین بار ایک ایک گولی بطور دھونی دی جائے اور کبھی مر اور قند ساڑھے تین گرام لیکر جو شاندر کرفس کے ساتھ پلایا جائے۔

عسر ولادت در پیش ہو اور بچہ مرانہ ہو تو عورت کی سبکائی اور روغن رازقی کی مالش کرائیں اور آب میتھی کا جو شاندر ۲۶۰ گرام طلاء مطبوخ ۱۳۰ گرام کے ساتھ پلائیں۔ مسک اور تھوڑی مقدار میں کہرباء شامل کر کے دھونی دیں اور ماکولات و مشروبات اور خوشبو جات سے عورت کو تقویت پہنچائیں اور خوش کلامی سے عورت کے دل کو تقویت پہنچائیں، ڈھارس بندھائیں۔ (أھرن)

یہ حریرے جب غشی ہونے لگے اس وقت دئے جاتے ہیں۔ جو ماء اللحم، تخمیات اور سنبل وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اگر ولادت کے بعد عورت کی صفائی نہ ہو سکے اور مشیمہ وغیرہ باقی رہ جائیں تو نمک سود مچھلی یا حافر داہ کا ٹکڑا جلا کر دھواں پہنچائیں۔ حیض اور مشیمہ جاری ہو جائیں گے۔ نیز قئے کے ذریعہ مشیمہ خارج کرائیں اور قئے پر نظر رکھیں۔ (مؤلف)

کئی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے قبل جماع کرنے سے ولادت آسان ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جماع دم طمث کو حرکت میں لاتا ہے۔ میرے ایک دوست نے اس کی تصدیق کی کہ وقت قریب آنے پر جماع سے فراغت کے بعد سہولت سے ولادت ہوئی۔ (مؤلف)

ایک قول کی رو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زیادہ دیر تک حمام میں رہنے سے جنین ساقط ہو جاتا ہے۔ یہی تدبیر اگر وقت ولادت اختیار کی جائے تو ولادت جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے جنین کو گرانی ہوتی ہے۔ دراصل جنین کے لئے ہوائے بارد موزوں ہوتی ہے اور ہوائے حار نقصان پہنچاتی ہے۔ (کتاب الجنین - بقراط)

عورت جب حاملہ ہو جائے تو اس کو متواتر پیچھے کی جانب لگاتار جلدی جلدی کو دینے کو کہیں ایسا کرنے سے مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے۔

لڑکا جننے والی عورت اکثر اڑتالیس دنوں میں پاک و صاف ہو جاتی ہے اگر زیادہ طول نہ کھنچے تو بیس سے پچیس یوم میں فارغ ہو جاتی ہے اور لڑکی جننے والی کچھ زیادہ دنوں میں یعنی چوراسی دن میں صاف ہو پاتی ہے اور اگر کچھ اندر نہ رہے تو پینتیس دن میں فارغ ہوتی ہے اور لڑکے کی ماں تیس دن سے قبل طہارت پالے تو یہ اس کی چھاتی میں خرابی کی دلیل ہے اور اگر لڑکی کی ماں چالیس دن سے قبل طہارت پالے تو وہ بھی صحت مند نہیں ہے۔ پیدائش کے بعد اگر عورت کی صفائی حیض وغیرہ جاری ہونے سے نہیں ہوتی تو ہلاک ہو جائے گی۔ عورتوں کو نفاس سے فراغت کے بعد منقی اشیاء سے اپنا علاج کرانا چاہئے ورنہ وہ بیمار ہو کر ہلاک ہو سکتی ہیں۔

ان ایام میں عورت کو روزانہ ۳۰۵ ملی لیٹر کی مقدار میں خون آنا چاہئے۔ حتیٰ کہ سارا خون خارج ہو کر طہارت ہو جائے۔ جنین کا پیروں کی طرف سے پیدا ہونا مہلک ثابت ہوتا ہے اور سر کی طرف سے خارج ہونا طبعی حالت ہوتی ہے۔ پیروں کی طرف سے جنین کا خارج ہونا دردزہ کے اوقات میں زیادہ سکون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (کتاب الجنین - بقراط)

میں نے اسقاط اور آٹھ ماہ سے قبل کی پیدائش میں دیکھا ہے کہ جنین پیروں کی طرف سے خارج ہوئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آٹھویں ماہ میں جنین کا سر پلٹ کر نیچے کی طرف آتا ہے۔ بقراط کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سر چونکہ سب سے بھاری عضو ہے اس لئے طبعی طور پر اسے نیچے ہونا چاہئے۔ اس کے علاوہ اگر سر پہلے خارج ہو تو اور جسم کا خارج ہونا آسان ہے۔ اس حالت کے برخلاف پیر یا ہاتھ کا پہلے خارج ہونا بچہ اور

زچہ دونوں کے لئے ہلاکت کا باعث ہے اور اکثر ایسا عورت کے لوٹ پوٹ ہونے سے اور قیام و قعود اور پہلو کے بل لیٹنے کی کثرت سے ہوتا ہے۔ (مؤلف)

جب تک مشیمہ خارج نہ ہو حیض جاری نہیں ہوتا۔ (بقراط)

جڑواں بچے ہوں تو زیادہ دنوں کا فرق نہیں آتا کیونکہ ایک ہی بار کے جماع سے نطفہ قرار پایا ہے اور جب رحم ایک بار بند ہو جاتا ہے تو اس میں دوبارہ منی نہیں جاتی ہے۔ (بقراط)

نفاس والی عورت کو جب کما حقہ خون خارج نہیں ہوتا تو شدید درد اٹھتا ہے۔ اس حال میں رگ صافن کی فصد کھول دینے سے سکون ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کو عسر ولادت بھی پیش آتا ہے کیونکہ اس کی فرج درد کی شدت سے ورم حار میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فصد کر کے رحم سے کثیر مقدار میں خون خارج کر دیا جاتا ہے تو سارے دردوں سے نجات مل جاتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ مابض رکبہ (کہنی کے اندر نی جانب) کی فصد کرنے سے جلد فائدہ ہوتا ہے۔ (کتاب ایذیمیا۔ باب ۸، فصل ۴)

مخرج دیدان دوائیں اخراج جنین کے لئے قابل اعتماد ہیں۔ کھانا، ان کا حقنہ اور شکم پر ان کا طلاء کیا جاسکتا ہے۔ آفستین، نبطی، عصارہ سداب، عصارہ حنظل تازہ یا جو شاندرہ حنظل یا بس ابال کر گاڑھا کر کے عانہ سے ناف تک ملا جائے اور کپڑے میں لت کر کے حمول کیا جائے۔ (مؤلف)

عسر ولادت (ولادت میں مشکل) یا تو زچہ یا مولود یا مشیمہ یا خارجی اشیاء کے سبب سے ہوتا ہے۔ زچہ کی جانب سے اسباب یہ ہیں۔ موٹا پا، صغر رحم، پہلا حمل ہونا، گرمی رحم، ورم رحم، ضعف رحم وغیرہ۔ مولود کی جانب سے اسباب یہ ہیں کہ وقت سے قبل خارج ہو جائے یا معمول سے زیادہ بڑا ہونا یا بہت چھوٹا ہونا یا اس کے سر کا بڑا ہونا یا عجیب الخلقیت کا ہونا یا مردہ ہونا یا مریض ہونا یا بہت جنین کا ہونا یا اس کا زاویہ غیر طبعی ہو۔ طبعی زاویہ یہ ہے کہ سر فم رحم کی جانب ہو اور دونوں ہاتھ رانوں سے لگے ہوئے ہوں اس کے بعد جو طبعی زاویہ بن سکتا ہے وہ یہ کہ پیروں کی طرف سے خارج ہو لیکن اس طور پر کہ فم رحم کے سامنے کی جانب ہو اور ہاتھ پھیلے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے علاوہ سب غیر طبعی زاویے ہوتے ہیں۔ مشیمہ کی جانب سے عسر ولادت مشیمہ کے دبیز ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس کا چاک ہونا مشکل ہو جاتا ہے یا پھر مشیمہ کے بہت رقیق ہونے سے ہوتا ہے کیونکہ قبل از وقت مشیمہ چاک ہو کر رطوبت بہہ جاتی ہے اور رحم سوکھ جاتا ہے اور خارجی اسباب یہ ہیں کہ زیادہ سردی یا زیادہ گرمی کا ہونا جس سے جسم ایک

دم سے ڈھیلا ہو جائے یا عوارضات نفسانیہ کا لاحق ہو جانا۔

اور اگر عسر و ولادت بیوست کے سبب ہو یا تنگی کے سبب سے ہو تو مرخی اشیاء استعمال میں لائیں اور مقام مخصوص پر نطول کریں اور جوشاندہ میتھی بزرکتاں کے ساتھ نیم گرم روغن گل یا انڈے کی سفیدی ڈالیں۔ اس سے عجیب فائدہ ہوتا ہے۔ پیڑ و اور پورے شکم کی مالش کریں اور بابونہ و اکیلل الملک (ناخونہ) جیسے محلات کے جوشاندہ کے اندر بٹھائیں۔ اگر بخار نہ ہو تو تھوڑی حرکت دیں، عطوس کرائیں اور پیٹ نہ چل رہا تو نیچے کی طرف زور لگانے کو کہیں اور خوشبودار اشیاء سے تقویت پہچائیں۔ اگر اسے غشی آجائے تو افاقہ ہونے کے بعد کچھ کھلائیں پلائیں۔ اگر عورت موٹی ہو تو اس کو منہ کے بل لٹائیں اور اسے اپنے گھٹنوں کو سمیٹ کر رانو سے لگانے کو کہیں۔ ایسا کرنے سے جنین رحم کے ٹھیک سامنے میں آجائے گا۔ مہل میں کوئی ملین چیز لگا کر اسے اپنی انگلیوں سے کھولنے کی کوشش کریں۔ اگر شکم میں گرانی ہو تو ملین حقنہ کریں۔ اگر مشیمہ چاک نہ ہو رہا ہو تو ناخون یا آلہ مبضع سے شکاف دیں۔ رحم میں روغنوں سے حقنہ کریں۔

اگر جنین کا زاویہ غیر طبعی ہو تو اندر ڈھکیل کھینچ کر اسے سیدھا کریں اور اگر کوئی عضو باہر نکل آیا ہے تو اس کو نہ کھینچیں کیونکہ وہ ٹوٹ سکتا ہے بلکہ اسے لوٹا کر بعد میں اس کا علاج کریں۔ اگر جنین فم رحم میں بند ہو گیا ہے تو اس کو پیچھے کر کے مہل کو روغن سے نرم کریں اور پھر اس کو خوب اوپر کی طرف کر دیں اسی طرح اگر کئی جنین ہوں تو اوپر کی جانب لوٹائیں۔

عورت کے کرسی پر بیٹھنے کا مناسب وقت وہ ہوتا ہے جب چھونے سے رحم کھلا ہوا دکھائی دے اور رطوبت آنا شروع ہو اگر یہ رطوبت نہیں آتی ہے تو جنین مردہ ہے یا ضعیف ہے۔ اس کو اوزار سے کھینچ لینا چاہئے۔ (بولس)

جس عورت کے شکم میں جنین کی موت واقع ہو جائے اسے مندرجہ ذیل نسخہ مفید ہے۔ ایک مٹھی شلیم کا آٹا حنظل کے اچھے جوشاندہ میں گوندھ کر اسکے پورے شکم پر مالش کریں جو ناف کے نیچے سے پورے شکم پر ہونا چاہئے۔ نفاس والی عورت جس کا شکم ولادت سے متورم ہو گیا ہو اس کے لئے مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کریں۔

سینج، صتر، مصطلی، هموزن ساڑے تین گرام سفوف شہد میں ملا کر چٹائیں۔

(کتاب الغریب)

ایسی مریضوں کو دھرتا اور اس جیسی دوسری دوائیں دی جاتی ہیں اور عرطنیٹا کا بطور

حمل استعمال قاتل جنین ہے اور فوۃ الصبح بھی قاتل جنین ہے۔ (مؤلف)
جنین اور مشیمہ کو خارج کرنے والا ضما د:

شحم حظل، مر، برگ سداب، بیل کے پتے میں گوندھ کر پیڑا اور اس کے اطراف
 میں طلاء کیا جائے۔ (شمعون)

ایک بخور جو عسر ولادت کو دور کرتا ہے اور مشیمہ کو جلد خارج کرتا ہے۔

قنہ، مر، جاوشیر، ہوزن پیمکر گائے کے پتے میں گوندھ لیں اور مازو کے برابر بندھے
 بنا کر رکھ لیں پھر ایک ایک بندھے کو لیکر اس کی دھونی دن میں دو یا تین بار دیں اور اسی کو آب
 سداب کے ساتھ بھی پلائیں اور مشک سنگھائیں اس سے عورت کو تنفس میں تقویت ملے گی۔

(کتاب الاختیارات)

عسر ولادت میں پہلے خوشبودار اشیاء اور لذیذ ہلکی غذائیں جیسے بھنا ہوا مرغ وغیرہ
 تھوڑی مقدار میں استعمال کرائیں۔ بھر پیٹ نہ کھلائیں۔ اوپر سے عمدہ شراب ریحانی ایک پیالہ
 پلائیں پھر مختلف پہلو بدلوائیں اور اس قدر چلائیں پھر انہیں کہ زیادہ تھکان نہ آجائے اگر اس
 سے بہ سہولت ولادت ہو جائے تو ٹھیک ورنہ لعاب میتھی پلائیں اور لعاب تخم کتاں واسپغول پیٹھ
 اور پیڑا اور اس کے اطراف میں چڑ دیں مذکورہ لطوخ خشکی کی شکایت میں نافع ہے۔

(کتاب الاختیارات۔ حنین)

اگر مشیمہ گرنے میں تاخیر ہو جائے تو اسے رانوں سے باندھ دیں اور مخرج مشیمہ بخور
 مشروبات اور عطوسات استعمال کریں۔

مشیمہ اگر بعد ولادت زیادہ دن رک گیا تو گندگی اور تعفن پیدا کرتا ہے۔ اس لئے
 مدرطمت دوائیں دینا بہت ضروری ہے۔ (تیا ذوق)

زرواند کو کپڑے میں لت کر کے حمل کرنے سے فوراً ولادت ہوتی ہے اور اگر پوست
 خیار خشک اٹھا رہ گرام لینے سے فوراً ولادت ہوتی ہے۔ مرکی دھونی دینے اور حلتیت (بھنگ) او
 ر جند بیدستر کھانے سے عسر ولادت کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اگر مشیمہ رہ جائے تو خربق کے
 جوشاندہ میں بیٹھنے سے خارج ہو جاتا ہے۔ خروج مشیمہ کے بعد روغن گلاب کا حمل کرنا
 چاہئے۔ قردمانا کا حمل کرنے سے ولادت ہوتی ہے۔ (کناش السلیمن)

مخرج مشیمہ کا نسخہ :

رمد (راکھ) کو پانی میں دھو کر صاف کر لیں پھر اس میں سے چار سو گرام لیکر اس کے اوپر پینتیس گرام خطمی ملائیں اور اسے پلا کر قئے کرنے کا مشورہ دیں اور چھینک لائیں۔ اگر درد زہ میں عورت پر چار دن گذر جائیں اور بچہ نہ ہو تو عورت کو خلاصی دینے کی کوشش کریں کیونکہ جنین مر چکا ہے۔ لہذا آب سداب ۱۳۰ گرام، روغن ارنڈ یا جوشاندہ میتھی کھجور کے ساتھ پلا کر جلد اسقاط کرائیں۔ نمک سود مچھلی کی آنکھ، گھوڑے کے کھر کی دھونی دیکر سقوط جنین کی کوشش کریں۔ اگر اس سے کام نہ چلے تو مقل ازرق، زوفرہ، حمر، علك انباط کی دھونی دیں تاکہ خون غلیظ نہ ہو اور عدم خروج سے درد میں شدت نہ آئے۔

مشیمہ کے رک جانے اور مردہ جنین کو خارج کرنے میں ایک کامیاب دوا:

مر، قنہ، جاو شیر، بیل کا پتہ اور کبریت ہموزن قطران میں گوندھکر بیس جوزہ کی مقدار میں کئی بار کھلائیں۔ ان میں قنہ اور جاو شیر ساڑھے دس گرام لیکر آب ترمس کے ساتھ روزانہ پلائیں۔ اس سے بہت جلد مردہ لڑکا خارج ہو جاتا ہے۔

ولادت میں سہولت :

عورت کو ٹہلنے کا مشورہ دیں۔ روغن رازقی کی مالش کریں۔ آب میتھی کا جوشاندہ شراب طلاء ۱۳۰ گرام کے ساتھ پلائیں۔ مشک اور کھرباء کی دھونی دیں۔ اس سے تقویت قلب ہوتی ہے۔ طعام، شراب اور عصر اسے اس کی تقویت کریں اور جب خون بند ہو جانے کا اندیشہ ہو تو نمک سود مچھلی کی آنکھ اور گھوڑے کے کھر کی دھونی دیں اور عطوس کرائیں تاکہ خون جاری ہو اور رحم میں ورم نہ آئے۔ (کتاب ابن ماسویہ)

میں نے اپنے شاگرد یوسف کو جو نسخہ بتایا وہ یہ ہے کہ حب قرمانا اشق میں ملا کر فرزجہ بنائیں اور حمل کریں۔ اس سے جنین فوراً ساقط ہوتا ہے۔ (مؤلف)

میں نے کسی دوا کو بچہ باہر لانے میں مندرجہ ذیل نسخہ سے زیادہ سریع الاثر کوئی دوسرا نسخہ نہیں پایا۔

حلتیت دو گرام، برگ سداب خشک ساڑھے دس گرام، مر ساڑھے تین گرام، آب اہل پینتیس گرام کے ساتھ صبح میں اور اسی مقدار میں شام کو لیں۔ اس سے لازمی طور پر اسقاط ہوتا ہے۔ تریاق اربعہ سے بھی فوراً اسقاط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روغن ارنڈ روزانہ ساڑھے

بائیں ملی لیٹر پینا جلد اسقاط کے لیے قوی دوا ہے۔ اسی طرح آب فستین اور شاہترہ کا پینا جلد اسقاط کا سبب رہتا ہے۔ (مؤلف)

مانع حمل نسخہ:

سقمونیا، شحم حنظل، ہزار حبشاں، خبث الحدید، کبریت تخم کرنب ہموزن لیکر قطران میں گوندھ لیے جائیں۔ طہارت کے بعد اس کا محمول کرنے سے حمل نہیں قرار پاتا۔

دوسرا نسخہ:

برگ غرب مسحوق، شمر غرب چودہ گرام کپڑے میں لت کر کے بعد طہارت محمول کریں۔

ایک اور نسخہ:

تخم کرنب، بٹلی اور حرف ساڑھے تین گرام پیس کر قطران میں لگائیں۔ پودینہ نہری میں بھگو کر طہارت کے بعد محمول کرائیں۔

کالی مرچ جماع کے بعد محمول کرنے سے حمل نہیں ہوتا۔

(کتاب المنقیہ - ابن ماسویہ)

جیسا کہ میں نے دیکھا ہے جب ولادت میں مشکل ہو رہی ہے اور جنین کو باہر نکالنا مقصود ہو تو عورت کو چٹ لٹائیں اور اسکے کولہوں کے نیچے کوئی چیز رکھ کر اس کے نچلے جسم کو تھوڑا اونچا کر دیں اور دونوں گھٹنوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے پھیلا دیا جائے۔ پھر آب سداب یا جوشاندہ فستین یا روغن ارغٹ یا جوشاندہ ابھل حسب ضرورت پچکاری میں بھر لیں۔ ملحوظ رہے کہ اگر جنین کو پھسلانا مقصود ہو تو لیس دارا اشیاء سب سے بہتر ہوتی ہیں اور اگر اسقاط مقصود ہو یا بچہ کو گرانا مقصود ہو تو کڑوی اشیاء بہتر ہوتی ہیں۔ بھر وہ پچکاری اس میں داخل کریں اور اس کی ٹکلی اتنی لمبی ہونی چاہئے کہ اندر تک داخل ہو سکے اور دوسرا سرا چکنا اور باریک ہونا چاہئے کیونکہ حاملہ عورت کا قم رحم اس حد تک بند ہو جاتا ہے کہ اس میں کوشش کے بغیر سلائی بھی نہیں داخل ہو سکتی ہے۔ اس لیے پچکاری کو اندر پہنچا کر اس بات کا اطمینان کر لیں کہ سلائی فضاء رحم میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد اندر دوا انچوڑیں۔ (مؤلف)

جب وضع حمل کا وقت آ پہنچے تو عورت کو بٹھا کر اس کے پیروں کو بالکل سیدھا کر دیں اور اس کے پیچھے ٹیک لگا دیں۔ پھر وہ عورت جلدی سے اٹھ بیٹھے اور چیخ مارے اور خوب زور لگائے پھر تھوڑی مقدار میں کثیر التغذیہ غذا کھائے اور تھوڑی پرانی شراب پیے۔

جنین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی اور سب سے جلد اسقاط لانے والی اشیاء اسہال، کثرت جماع اور چھینک کی کثرت ہیں۔ (کناش سیاست الصحة جو جالینوس سے منسوب ہے مگر میرے خیال میں روفس کی ہے)

عسر ولادت کے وقت جبکہ جنین مرگیا ہو تو خر بق، جاو شیر، بیل کے پتہ کا شافہ بنا کر حمل کرنے سے زندہ یا مردہ جنین گر جاتا ہے یا مازو، کبریت کو بیل کے پتہ میں گوندھ کر دھونی دیں۔ قثاء الحمار کا عصا رہ سوادو لیٹر لے کر بیل کے پتہ کے ساتھ گوندھ کر حمل کرنے سے زندہ یا مردہ جنین خارج ہوتا ہے۔ (سرایون)

تیز بخار جنین کو بچہ دانی کے اندر مار ڈالتا ہے۔ خاص طور سے اگر رحم میں ورم حار ہو۔ (کتاب الفصول۔ باب پنجم)

میری رائے میں تیز بخار جلد اسقاط لانے میں معاون ہے۔ اگر حلتیت اکیس گرام لی جائے تو اسقاط کے لئے سب سے زیادہ تیز اثر کرتی ہے۔ (مؤلف)

دائیاں حاملہ عورتوں کو کرسی پر نہیں بٹھاتی ہیں۔ بلکہ فم رحم کو چھو کر دیکھتی ہیں جب وہ کھلا ہوتا ہے تو ہلکے ہلکے اسے کافی مقدار میں کھولنے کی کوشش کرتی ہیں اور عورت سے بچہ کو نکالنے کے لئے زور لگانے کے لئے کہتی ہیں۔ وقت ولادت سے پہلے جنین کا حرکت کرنا عسر ولادت کی علامت ہے۔ (کتاب قوی الطبیعة۔ باب ۴)

اس سے مراد ولادت والے مہینہ میں حرکت کرنا ہے۔ دوسرے مہینوں کی حرکت نہیں ہے۔ کیونکہ دوسرے مہینوں میں حرکت کا ہونا بچے کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے۔ اس طرح کی حرکت بعد میں نہیں ہوتی۔ اس کلام میں اسی طرف اشارہ ہے۔ (مؤلف)

عسر ولادت سخت موسم سرما میں شدید ہوتا ہے۔ اس لئے میں عورت کے آس پاس بہت سے کونڈے جلو اتا ہوں اور گرم روغنوں کی مالش کرو اتا ہوں۔ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ عورت پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ میں اسی حالت میں اس کی فرج میں گرم تیل پہنچواتا ہوں اس سے درد ساکن ہو جاتا ہے اور عورت فوراً سو جاتی ہے۔ (مؤلف)

حب المسک درد زہ کو سکون بخشنے میں عجیب اثر رکھتی ہے اور ولادت میں سہولت پیدا کرتی ہے اس کا نسخہ درج ذیل ہے۔

دار چینی دس حصے، مرپانچ حصے، زراوند حرج اس کے برابر قرفہ اس کے برابر سلیمہ عمدہ والی اور ابھل دس حصے، قسط پانچ حصے، میعہ اور افیون دودو حصے، سک ۵۰۰ ملی گرام اس کو

پس کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنالیں اور ضرورت پڑنے پر تین تین گھنٹے بعد ساڑھے ۱۳ گرام کے بقدر پرانی شراب ستر ملی لیٹر کے ساتھ کھلائیں۔ یہ بہت کامیاب دوا ہے۔ مالش اور تلمین بھی کریں اگر عورت کو درد زہ شروع ہو جائے تو عورت کو یہ گولی ہر گھنٹہ پر تھوڑی تھوڑی دیں۔

(مؤلف)

جب عورت کو خربق سفید یا خردالحمام یا زراوند کی دھونی دی جاتی ہے تو مشیمہ فوراً ساقط

ہوتا ہے۔

جس عورت کا ولادت کا مہینہ گزر جائے اور درد زہ نہ ہو تو اس کو ماء العسل میں مر ملا کر پلائیں نیز میتھی اور کھجور کا جوشاندہ پلائیں اور دوسری اسقاط والی دوائیں پلائیں۔ مثلاً حب حمل حمل کریں یا شراب استعمال کرائیں۔

عورت کے دہنی ران میں سمندر جھاگ (زبد البحر) کا ایک بڑا سا ٹکڑا لٹکا دیں تو ولادت بہ سہولت ہو جاتی ہے۔

جاو شیر، صمغ سداب کو ہی مخرج جنین و مشیمہ ہیں۔ یعنی اونٹ کا پیر لٹکانے سے فوراً ولادت ہو جاتی ہے۔

خربق ابیض یا عود حمل تازہ کا حمل کرنے سے مشیمہ فوراً ساقط ہوتا ہے۔ (جور جس) اگر خون جاری ہونے سے پہلے عورت پر ولادت مشکل ہو جائے تو اس کی وجہ اعضاء ولادت کا ورم ہوتی ہے اور جب ورم ہوتا ہے تو خون نہیں آتا اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کے اورام و امراض پیدا ہوتے ہیں۔ (تفسیر ثانیہ۔ باب ۳)

جہاں تک میں نے غور کیا ہے بزر شیطرج جو حرف سے مشابہ ہوتا ہے اور اکسین تیز چہ پری خوشبو ہوتی ہے۔ اس سے فوراً بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور شیطرج کا بھی یہی فعل ہے۔

(مؤلف)

ولادت کے وقت پیش آنے والے دردوں کی بہ نسبت اسقاط کے وقت پیش آنے والے درد زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رحم طبعی انداز میں بند نہیں ہوتا ہے اور مسقط جنین دواؤں سے رحم میں ایک قسم کی حدت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس میں سوزش ہوتی ہے اور اس حدت کی مشارکت سے سر میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرے خراب اعراض بھی عارض ہو جاتے ہیں جبکہ ولادت کے وقت ان عوارضات میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔

شادی ہو نے سے پہلے چھوٹی عمر میں حمل قرار پا جائے تو بچہ بڑا ہونے سے پہلے

اسقاط کر دیا جائے۔ اس لئے کہ اگر وہ مسقط دوائیں استعمال نہیں کریں گی تو ہلاک ہو جائے گی۔ جس کے عنق رحم میں یہ کیفیت ہوگی وہ مر جائے گی اگرچہ جنین مکمل ہو چکا ہو۔ (عہد البقراط) ایک ایسی گولی کا نسخہ جو فوراً ولادت کرتی ہے۔

ابہل پینتیس گرام، سداب سترہ گرام، حب حزل چودہ گرام، ہینگ، اشق، فوہ (مچھ) ہر ایک ساڑھے دس گرام کی گولی بنائی جائے۔ پھر اس میں سے ساڑھے دس گرام لیکر پینتیس گرام جو شانہ ابہل اور جو شانہ مچھ، مشطرمشع یا عصارۂ سداب کے ساتھ پلائیں۔ دوپہر کو عورت آب حمص (پننے کا پانی) یا آب لوبیا روغن کنجد کے ساتھ پیئے اور اس سے پہلے عورت خوب کودے اچھلے اور اپنی کمر اور بدن کو تھکائے اور شام کو آب سداب تازہ میں بھگوئے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کورات بھر کے لئے حمل کرے اور صبح کو اٹھ کر ایک نلکی دار برتن میں مر، بازرد اور جاو شیر ساڑھے چار گرام کی دھونی لے۔ مر، بازرد اور جاو شیر کو پہلے سے گائے کے پتے میں گوندھا لیا جائے۔ اگر اس کے بعد بھی مشکل ہو تو اگرچہ دوا دہرائی بھی جا چکی ہو پشت اور ناف پر آب سداب جس میں شلیم کا آٹا گوندھا گیا ہو اس سے مالش کی جائے۔ اس میں سے کوئی بھی تدابیر اختیار کی جائے گی تو ولادت آسان ہو جائے گی اور جلدی اسقاط ہوگا۔ اگر بخور مریم یا قثم، الحمار یا میویش یا کنڈش جو بہت قوی ہو بار یک پیس کر اس میں ایک کپڑا لٹ کر لیا جائے اور پھر جہاں تک ممکن ہو رکھا جائے، حمل کیا جائے۔ اور اگر اب بھی عسر ولادت ہو تو اس کو مقم میں ایک سو اسی گرام پودینہ کا جو شانہ تیار کر کے بیٹھایا جائے۔

ایک عمدہ نسخہ حب:

سات گرام ابہل، پونے دو گرام حلتیت، اس کے هموزن اشق اور فوہ۔ حسب دستور گولی بنا کر کھائی جائے۔ یہ مقدار ایک خوراک کی ہے۔ (مؤلف)

اسقط جنین کے لئے ایک عجیب فرزجہ:

خربق اسود، مویزج، زراوند مدحرج، فریون، بخور مریم، حب المازریون، شحم حنظل، اشق۔ سب دواؤں کو اشق میں حل کر لیا جائے اور اس کا حمل کیا جائے تو عجیب فائدہ ہوتا ہے۔ اس نسخہ میں مرارۂ ثور (بیل کا پتہ) خشک ایک جز کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ (بولس)

اک عجیب فرزجہ:

زراوند مدحرج، فریون، بخور مریم، قردمانا، صبر۔ فرزجہ بنا کر استعمال کرنے سے

عجیب فائدہ ہوتا ہے۔ (مؤلف)
نسخہ:

باریک پسا ہوا نوشادر پینتیس گرام، اشق ساڑھے دس گرام، اشق کو حل کر کے نوشادر
اسمیں گوندھ لیا جائے اور فرزند بنا کر پوری رات حمل کریں۔ حمل کرتے وقت پیروں کو
سیدھائی میں اوپر کر دیں تاکہ دوارحم کے خوب اندر پہنچے۔ اس سے دوسرے دن حیض جاری
ہو جاتا ہے۔

مشمیمہ خارج ہونے کے بعد روغن گلاب کا حمل کریں ولادت میں سہولت پیدا کرنے
والی دوا جو حاملہ کو ولادت والے مہینہ میں روزانہ دی جاتی ہے یہ ہے۔ لعاب حب سفرجل
اتھارہ گرام۔

کھانے میں ملوکیہ اور خبازی دیں اسفند باج کے موٹے فرز بے رکھیں۔ گنگنے پانی سے
غسل کرائیں جو حمام کے باہر ہو اور عورت کو آرام کرایا جائے۔ گنگنے مسخن روغن سے کمر اور شکم کو
چپڑا جائے۔

عسر ولادت کے لئے ایک معجون جو بے مثال ہے:

مر، جند بیدستر، میعہ ہر ایک ساڑھے چار گرام، دارچینی پونے تین گرام، فلفل اس کے
برابر، ابھل اسکے برابر۔ شہد میں معجون بنا کر نو گرام کھلائیں۔ (اسلیمین)

عسر ولادت کی شکایت میں ان دواؤں کو کسی مشروب کے ساتھ استعمال میں رکھیں۔

(مؤلف)

ابھل جنین کو زندہ اور مردہ خارج کرتا ہے۔ ترمس کا جو شاندرہ مراور سداب کے ساتھ

پینے سے قوت کے ساتھ جنین خارج کرتا ہے۔ (۱)

حب الحاشا کا حمل کرنے سے جنین خارج ہوتا ہے۔

پودینہ نہری خشک کو آب شہد کے ساتھ پیا جائے۔ (۲) یا اس کا عصا رہ پیا جائے یا

حمل کیا جائے تو پوری قوت سے جنین کو خارج کرتا ہے۔ پہاڑی پودینہ اس سلسلے میں زیادہ قوی

ہوتا ہے اور اگر لوگ..... طور طلاء استعمال کریں..... (۳) اسی طرح جماع کے بعد عورت اور

بالخصوص گرم خشک مزاج کی دہلی پتلی عورت بہ طور حمل استعمال کرے تو حمل ساقط ہو جاتا ہے

(۱) اصل نسخہ میں عبارت یہی تک ہے (۲) یہاں کچھ الفاظ ساقط ہیں۔ (۳) یہاں کچھ الفاظ ساقط ہیں۔

لیکن موٹی اور پُر گوشت عورت کے لئے اس کا استعمال حمل کے لئے معین ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اسے گرم مزاج کی کمزور عورت ہی استعمال کرے۔ رہی ٹھنڈی مزاج کی موٹی عورت تو اس کو عرق گلاب کے ساتھ کافور حل کر کے بہ طور حمل استعمال کرایا جائے۔ عجیب فائدہ ہوتا ہے۔ مجرب نسخہ ہے۔ (کتاب المفردات۔ جالینوس)

قطران کا بہ طور حمل استعمال جنین کو مردہ کر کے خارج کرتا ہے اور جماع کے وقت مرد اگر اسے عضو تناسل پر لگا لے تو زبردست مانع حمل ثابت ہوتا ہے۔ تمام مانع حمل دواؤں میں سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔

قنطاریون جلیل رقیق کھانے سے مردہ جنین خارج ہوتا ہے۔ اس کی جڑ کا جوشاندہ پینے سے جنین مر جاتا ہے اور شوکہ منتہ جسے قولو کہتے ہیں حمل کرنے سے طمٹ شدت کے ساتھ جاری ہوتا ہے اور پینے سے جنین ساقط ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)

پیاز کا عصا رہ عضو تناسل پر لگا کر جماع کرنے سے حمل نہیں قرار پاتا اور اس کے پانی کا حمل کرنے سے قوت کے ساتھ جنین خارج ہوتا ہے۔ (مؤلف)

بخور مریم کا عصا رہ مراق شکم پر لگانے سے جنین میں فساد آتا ہے۔ پینے یا حمل کرنے سے مشیمہ خارج ہوتا ہے۔

اسی طرح زرد خیری کی کلی کا جوشاندہ جنین و مشیمہ کو خارج کرتا ہے اور اس کے پانی میں بیٹھنے سے مردہ جنین خارج ہوتا ہے اور پینے سے زندہ جنین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ شہد کے ساتھ اس کا حمل کرنے سے زندہ جنین میں فساد پیدا ہوتا ہے اور مردہ جنین خارج ہوتا ہے۔ ایرسا زندہ جنین کو رحم سے خارج کرتا ہے۔ سرخس قاتل جنین ہے۔ اس کی مقدار خوراک اٹھارہ گرام ہے۔ قثاء الحمار کا عصا رہ حمل کرنے سے جنین مر جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ حنظل اس معاملہ میں زیادہ قوی ہے۔ مرکبی جنین کو نکالتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ جنگلی گیہوں کی بالیاں مشیمہ اور جنین کو جلد نکالنے میں قوی الاثر ہوتی ہیں۔ ایرسا کافر زجہ شہد میں ملا کر استعمال کرنے سے زندہ جنین خارج ہوتا ہے۔ قردمانا جو حریف ہو اور خوشبودار ہو اگر اس کی دھونی حاملہ کے نیچے دی جائے تو زندہ اور مردہ جنین خارج ہوتا ہے۔ عجیب الاثر ہے۔ دارچینی مرکبی کے ساتھ ملا کر پینے سے یا حمل کرنے سے جنین گر جاتا ہے۔ (مؤلف)

اس کی وجہ یہ ہے کہ حاملہ کا بکثرت جی متلاتا ہے اور ان دواؤں میں سب سے اچھی دوا وہ ہے جو اس تاثیر کے ساتھ غشیان کو دفع کرتی ہے اور دارچینی میں یہ صفت موجود ہے۔ اس

لئے دارچینی، ابھل، قردمانہ، مرکئی نکلیاں بنا کر استعمال کرنا چاہئے۔ ترکیب تیاری یہ ہے۔ ابھل دس حصہ، دارچینی نو حصہ، قردمانہ و مرپانچ پانچ حصہ۔ مقدار خوراک تین حصہ دن میں تین بار پینے سے غشیان نہیں ہوتا، ولادت آسانی سے ہوتی ہے اور نفاس والی عورت کی صفائی ہوتی ہے۔ مشیمہ خارج ہوتا ہے۔

روغن بلساں کا حمل کرنے سے جنین اور مشیمہ خارج ہوتے ہیں۔ مر، افسٹین یا سداب یا ماء ترمس کے ساتھ لینے سے جنین خارج ہوتا ہے۔ مقل کی دھونی دینے سے ولادت آسان ہوتی ہے۔ رحم کا منہ کھلتا ہے اور جنین کھنچ آتا ہے۔ پوست غار پینے سے جنین خارج ہوتا ہے۔ لاذن کی دھونی دینے سے جنین خارج ہوتا ہے اور مشیمہ گرتا ہے۔

برگ غرب کا شراب استعمال مانع حمل ہے۔ کرنب کی کلی کا روغن حمل کرنے سے جنین مر جاتا ہے۔ لہسن کے جو شانہ میں بیٹھنے سے اور دھونی دینے سے جنین خارج ہوتا ہے۔ حرف نوگرام پینے سے جنین خارج ہوتا ہے۔ فلفل جنین خارج کرتی ہے اور اس کا حمل کو دفع کر دیتا ہے۔

عرونیثا کا حمل کرنے سے جنین تیزی کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ نجور مریم کی جڑ پینے یا حمل کرنے سے جنین گر جاتا ہے۔ اس قوت میں یہ دوا بے مثال ہے۔ بہت لوگوں کا خیال ہے کہ اس نبات کو تھوڑا کھانے سے حاملہ کو اسقاط ہو جاتا ہے اور اس کی جڑ اسقاط کرتی ہے۔ گردن میں اس کی جڑ باندھنے سے حمل قرار نہیں پاتا۔ تخم لوف تیس عدد سرکہ یا پانی کے ساتھ کھانے سے اسقاط ہو جاتا ہے۔

جس وقت اس پودے کے بیج آرہے ہوں اگر حاملہ عورت اس پودے کو سونگھے تو اسقاط ہو جاتا ہے۔ اس کی جڑ کا شافہ بنا کر حمل کرنے سے جنین گرتا ہے۔

جنطیانا کی جڑ کا حمل کرنے سے جنین خارج ہوتا ہے۔ زراوند طویل آٹھ گرام، تھوڑا مر اور فلفل ملا کر کھانے سے نفاس والی عورت کے فضلات اور مشیمہ خارج ہوتے ہیں۔ طمٹ جاری ہوتا ہے۔ جنین نکلتا ہے۔

تنقیہ نفاس کے لئے یونانی میں اس کا نام مشہور ہے زراوند حرج کا بھی یہی فعل ہے۔ قنطوریون صغیر جنین کا اسقاط کرتی ہے۔ اس کا فرزجہ حمل کرنے سے طمٹ جاری ہوتا ہے۔ پودینہ کا عصا رہ وقت جماع سے قبل حمل کرنے سے حمل نہیں قرار پاتا۔ برگ قونج کا حمل قاتل جنین، مدر حیض اور مانع حمل ہے۔ (مؤلف)

میرے خیال میں جنگلی سداب حمل کرنے سے جنین فوراً خارج ہوتا ہے۔ اس کے تخم

پونے دو گرام کھانے سے اسی دن ولادت ہو جاتی ہے اور کھجلی ہو جاتی ہے۔ (مؤلف)
اس کو ہاتھ میں لینے سے ہاتھ سرخ اور متورم ہو جاتے ہیں۔

جاو شیر کو شہد میں ڈبو کر کھانے اور حمل کرنے سے جنین خارج ہوتا ہے۔ سکینج ماء العسل کے ساتھ پینے سے حیض جاری ہوتا ہے اور جنین مرجاتا ہے۔ قنہ کھانے سے اور دھونی دینے اور حمل کرنے سے جنین خارج ہوتا ہے۔ زرد خیری کے تخم سات گرام شہد کے ساتھ کھانے اور حمل کرنے سے ولادت جلدی ہوتی ہے۔ (دیسقوریڈوس)

عسر ولادت کی شکایت میں بابونہ، شیخ، برنجاسف، مرزنجوش، میتھی، پودینہ، مشکطر امشیع، زراوند، عرطنیشا ان میں سے جو بھی میسر ہو اس کا جوشاندہ بنا کر اس میں حاملہ کو بٹھایا جائے۔

مچھ کے جڑ کا حمل کرنے سے جنین گر جاتا ہے۔ جوشاندہ عطمی میں بیٹھنے سے تنقیہ نفاس ہوتا ہے۔ قادی نامی تخم جو گیہوں اور جو کے کھیت میں پیدا ہوتا ہے اور جس کی پیتاں چنے کی پتی کی طرح ہوتی ہیں اور جس کا چارہ خرنوب کے چارے کی طرح ہوتا ہے اور جس کے تخم بہت کڑوے ہوتے ہیں، ان کو شہد میں باریک پیس کر حمل کرنے سے حمل نہیں قرار پاتا۔
(دیسقوریڈوس)

جوشاندہ بابونہ میں بیٹھنے سے تنقیہ نفاس ہوتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)
دارچینی دردزہ اور شدید تکلیف کو دور کرنے میں خاص طور سے مفید ہے اگر اس کو کھایا جائے۔ (ابن ماسویہ)

میرا تجربہ ہے ایک عورت کئی دن تک دردزہ میں مبتلا رہی۔ اس کو سات گرام زعفران کھلایا تو فوراً ولادت ہو گئی۔ اس کا تجربہ کئی بار کیا اور ایسا ہی پایا۔ (مؤلف)
حرف پیس کر ساڑھے دس گرام پینے سے اور حمل کرنے سے جنین فوراً مرجاتا ہے۔
(ماسرجویہ)

خیری اپنی قوت میں سداب کی طرح ہے لہذا اسقاط جنین کرتی ہے۔ (مؤلف)
لبن لقاح مہبل میں ڈالنے سے بچہ خارج ہو جاتا ہے۔ بیوت کے تخم اور اس کے پتے کو شراب کے ساتھ پینے سے اسقاط ہو جاتا ہے۔ اس قوت میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔
(ابن ماسویہ)

کما شیر جو ہندوستانی دوا ہے اور چوتھے درجہ میں گرم ہے اور فریون سے حاصل ہوتی

ہے۔ اسقاط میں اپنی مثال نہیں رکھتی۔ (خوز اور ابن ماسویہ)
 تخم کرنب پیس کر جماع کے بعد حمل کرنے سے حمل نہیں ہوتا۔ یہ منی کو فاسد کر دیتا اور
 استقرار حمل کو روک دیتا ہے۔ (ابن ماسویہ اور ارجیانس)
 خشک نسرین کا شراب استعمال مخرج جنین اور مد حیض ہے۔ (بولس)
 سلیخ پوری قوت کے ساتھ اسقاط کرتی ہے۔ (مہر اریس)
 تل کا نفوع بچہ گرا دیتا ہے۔ (ماسر جویہ)
 سا سالیوس کا خلاصہ ہے کہ ہر جاندار کی ولادت میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ (دمشقی)
 میں نے کئی بار مشاہدہ کیا اور خوز نے بھی اس میں اتفاق کیا ہے کہ ہاتھی کی لید کا فرز ج
 حمل کرنے سے کبھی بھی حمل قرار نہیں پاتا ہے۔

فلفل مانع حمل ہے اگر جماع کے بعد حمل کیا جائے۔ (ابن ماسویہ)
 قسط کی دھونی قیف نما برتن سے لینا مسقط جنین ہے۔ (قلہمان)
 ارجوحہ اسقاط جنین کرتا ہے لیکن حاملہ اسے پسند نہیں کرتی۔ (روفس)
ایک عجیب مسقط جنین اور مسہل ولادت بخور کا نسخہ:

مقل ازرق، مر، ابھل پیس کر اس کے بند قے بنا لیے جائیں۔ اس معاملہ میں بہت
 اچھا کام کرتے ہیں۔ (مؤلف)

ولادت کے وقت قلب سے بڑھ کر مضر کوئی چیز نہیں ہوسکتی کیونکہ جنین پیروں کی جانب
 سے یا پہلو کی جانب سے یا کسی دوسری دشوار کن زاویے سے بہ غلت خارج ہونا چاہتا ہے۔ اور
 اکثر جنین جو سر کی جانب سے نہیں آتے، مر جاتے ہیں کیونکہ جب کوئی عضو خارج ہوتا ہے تو سر
 اندر گھٹ کر رہ جاتا ہے پھر ولادت مشقت اور تکلیف سے ہوتی ہے۔ (کتاب البقراط)
 نفاس کا خون رک جانا موت کو دعوت دیتا ہے۔ دو عورتیں جس کو یکساں مرض تھا۔ ان
 میں سے ایک کا نفاس رک گیا اور ایک کا جاری ہو گیا۔ جس کا نفاس رک کا تھا وہ مر گئی اور دوسری
 صحت یاب ہو گئی۔

اگر نفاس سے تحقیق نہ ہو تو اکثر رحم میں ورم ہو جاتا ہے۔

(مسائل ابیدیمیا۔ باب سوئم)

اسقاط کے وقت حادث ہونے والے درد ولادت کے وقت حادث ہونے والے

دردوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولادت کے وقت رحم طبعی طور پر سکڑ کر جنین کے گرد مجتمع ہوتا ہے تاکہ جنین کو اپنے سے باہر دفع کر سکے۔ اس کے برخلاف جو دوائیں جنین کو اسقاط پر مجبور کرتی ہیں وہ رحم کو دفع اور انضمام پر حد درجہ مجبور کر دیتی ہیں جس سے رحم پر ورم آجاتا ہے اور دواؤں کی سوزش سے رحم میں حدت پیدا ہو جاتی ہے اور تکلیف و عوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔ (عہد البقراط)

طمث کو قوت کے ساتھ جاری کر نیوالی دوائیں۔

اشنان فارسی، شونیز، عاقر قرحا، سداب تازہ، فراسیون، فریبون، مر، قنہ، سب دواؤں کو سفید کپڑے میں لیکر حمل کریں۔ (ابن ماسویہ)

استقرار حمل کو روکنے کے لئے عورت کو چاہئے کہ جماع سے فراغت کے بعد چھینک دے اور مہبل کو اچھی طرح ملے اور شہد اور قطران یا روغن بلساں یا اسفیداج یا کوئی دوسری مرطوب چیز بطور حمل استعمال کرے۔ انار کا شحم حمل کریں۔ (مسح)

دارچینی کی خاصیت ولادت میں سہولت پیدا کرنا ہے اور اس کے بعد اندرونی رحم فضلات کا پوری طرح تنقیہ کرتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

دیسقوریڈوس کے قول کے مطابق ذیل کی گولی جنین کا اسقاط کرتی ہے۔

زراوند طویل، قفل اور مرہموزن لیکر گولیاں بنالی جائیں روزانہ ساڑھے دس گرام کی گولیاں آب ترمس ۳۵ گرام کے ساتھ کھانے سے سہولت ولادت ہو جاتی ہے۔

(دیسقوریڈوس)

ولادت کے بعد شکم میں ورم آنے کی دوا:

سکینچ، صعتر، مصطلی، هموزن لیکر شہد میں گوندھ لیں اور ساڑھے چار گرام کے بقدر کھلائیں فوراً تسکین حاصل ہوتی ہے۔

زندہ بچہ نکالنے کے لئے فیروز ہرج، باقلہ کے برابر شہد میں گوندھ کر کھلائیں۔

جوشاندہ فنجکشت پلانے سے مردہ جنین خارج ہوتا ہے۔ بہت کامیاب دوا ہے۔

سداب کو پسکر گائے کے پتے میں ملا کر پورے شکم پر لگانا بھی مفید ہے۔ نم رحم میں بھی لگانا چاہئے۔ (خوز)

باقلہ نہارمنہ (۷ دن کھانا ہے تاکہ ۷ دانے) کھانے سے پوری زندگی حمل نہیں قرار

پاتا۔ اگر اس کا تجربہ کرنا ہو تو مرغی کو باقلہ کھلا کر دیکھو ہمیشہ کے لئے انڈا دینا بند کر دے گی۔
ہاتھی کا براز حمل کرنے سے ہمیشہ کے لئے حمل نہیں ہوتا۔

آب برنج اسف پینے سے فوراً اسقاط ہو جاتا ہے۔ عورت کی ران پر کرینے کیڑے
میں پوٹلی بنا کر باندھنے سے اسقاط ہوتا ہے۔

نسخہ برائے اسقاط:

زراوند طویل، جطیانہ، حب الغار، مر، قط بھری، سلیخہ سیاہ، فوۃ الصغ، عصارۃ افسنتين
، قردمانا تازہ، چر پڑہ، فلفل، مشکطرمشبع، هموزن لے کر اس کی گولیاں بنالیں جائیں
اور روزانہ مسلسل دس دن تک نوگرام تھوڑے سداب کے ساتھ کھائیں۔ عود سداب کا حمل
کریں اور ناف پر گائے کا مرارہ چڑھیں۔ (طب قدیم)

کتاب تشریح اجنہ از بقراط:

جو جنین رحم کے اندر مردہ ہو جاتے ہیں ان کو جب نکالنے کا قصد ہو تو عورت کا چہرہ اس
طرف کر دیں کہ اسے دکھائی نہ دے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور لولب اس کی کہنیوں میں رکھیں۔
جب اس کی ہڈیاں ابھر آئیں تو ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح باندھیں کہ گوشت نہ پھلے پھر کف
اور مونڈے کا گوشت کاٹیں پھر نکالیں اور سر کو طبعی انداز میں پھیر کر تھوڑا سا اپنی طرف کھینچیں
پھر تھوڑا اندر کر دیں اور پسلیوں اور ہنسی کے پاس سکین سے باندھ دیں۔ تاکہ اس میں جو کچھ
نفع ہوا ہے وہ دور ہو جائے اور جنین بستہ ہو کر آسانی سے نکل جائے۔ اس کے بعد اگر جنین کا سر
اندر ڈھکیل کر طبعی حالت میں کیا جانا ممکن ہو تو ٹھیک ہے ورنہ آلہ سے پکڑ کر کھینچیں اور عورت پر
گرم پانی خوب بہائیں روغن سے مالش کریں اور ایک پیر دوسرے پیر کے اوپر رکھ کر سونے کی
ہدایت دیں۔ عورت کو خوشبودار اور لطیف شراب پلائیں۔ زرخ کو شہد میں پیس کر شراب ملا کر
ملیں اور لگائیں اور پلائیں بھی۔ کبھی کبھی جنین مرا ہوا نہیں ہوتا بلکہ ایک طرف پڑا رہتا ہے وجہ یہ
ہوتی ہے کہ اس کی ناف اس کے گردن میں پھنس جاتی ہے جو اس کو نکلنے نہیں دیتی اور اس کا سر
ماں کی کوکھ میں پھنسا رہتا ہے۔ ایسی حالت میں اکثر جنین کے ہاتھ پہلے باہر آتے ہیں اور اگر پھر
ان میں سے اکثر کی موت ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات بچے کا کوئی بھی حصہ باہر نہیں آ پاتا ایسے
میں بڑا خطرہ لاحق رہتا ہے کیونکہ ناف میں گردن پوری طرح لپٹی رہتی ہے اور کوئی بھی درد زہ
میں مبتلا عورت کو اگر ولادت سے پہلے رطوبت رحمی خارج ہو جائے تو بچے کے باہر آنے میں

دشواری ہوتی ہے۔ اگر حالات اس کے برعکس ہوں تو آسانی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی تشخیص ہو جائے کہ عسر ولادت کی وجہ بچے کی گردن میں ناف کا لپٹ جانا ہے یا بچے کا صحیح زاویہ پر نہ ہونا ہے تو عورت کے ہاتھ اور پیروں کو پکڑ کر تیسری بار خوب زور زور سے ہلایا جائے تاکہ اس کے پیٹ میں اتھل پھل ہو۔ پھر اس کے پیروں کو اٹھا کر ایک دوسرے سے دور دور کر دیا جائے اور اس طرح کی حرکت دی جائے جس طرح پتھری کی شکایت میں دی جاتی ہے۔ پھر اسے کھڑا کر کے کندھے کو پکڑ کر خوب ہلایا جائے پھر فرش پر گرا کر کندھے کو ہلایا جائے۔ تاکہ جنین کچھ صحیح پوزیشن میں نیچے آجائے اور نکالنا آسان ہو جائے۔ اور اگر اس وقت مشکل پر امشیع اقرطیشی میسر ہو تو پلایا جائے اور جند بید ستر کو شراب کے ساتھ پکا کر بطور حمل استعمال میں لایا جائے۔

(تشریح الاجنہ۔ بقراط)

ابہل جنین کا اسقاط کرتا ہے خواہ اس کو پیا جائے یا حمل کیا جائے یا اس کی دھونی لی جائے۔ (دیسقوریڈوس)

آذریون خاص طور پر مقطع جنین ہے۔ (بدیغورس)

ابہل جنین کا اسقاط کرتا ہے خواہ زندہ ہو یا مردہ غرب کا پتہ پیسکر شراب کے ساتھ پینے سے حمل نہیں ہوتا۔ خوشا کی جڑ کا حمل کرنے سے جنین خارج ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)

انارغیون کے پتے ۹ گرام لیکریٹج کے ساتھ پینے سے جنین اور مشیمہ خارج ہوتے ہیں۔ عسر ولادت میں اسے عورت کے گلے میں باندھ کر لٹکایا جاتا ہے۔ جنین فوراً تولد ہوتا ہے۔ پیر مایہ کا پینا مانع حمل ہے۔ اشق پینے سے جنین خارج ہوتا ہے۔ روغن بلساں کا حمل کرنے سے جنین اور مشیمہ خارج ہوتے ہیں۔ (بدیغورس)

برنجاسف کے جوشاندہ میں بیٹھنے سے جنین اور مشیمہ جلد خارج ہوتے ہیں۔

برنجاسف کے تخم ساڑھے تیرہ گرام پینے سے جنین خارج ہوتا ہے۔ بابونہ کا شراب استعمال یا اس کے جوشاندہ کا آبزین مسہل ولادت ہے بہ سہولت ولادت ہوتی ہے۔

(دیسقوریڈوس)

جطیانہ کی جڑ کا حمل شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے جنین گرتا ہے اور اس کے درخت کی جڑ کا حمل کرنے سے جنین جلد خارج ہوتا ہے۔

جنگلی گاجر کا حمل کرنے سے جنین خارج ہوتا ہے۔ دو قو مخرج جنین ہے خواہ پیا جائے یا مر کے ساتھ فرزجہ بنا کر حمل کیا جائے۔

دار شیشعاں مسقط جنین ہے اگر اس کا فرزہ بنا کر حمل کیا جائے۔ جنگلی زیتون کا گوند جو زبان میں شوزش پیدا کرتا ہے، مسقط جنین ہوتا ہے۔ بکری کی میٹنی خاص طور سے جنگلی بکری کی افادیہ کے ساتھ پینے سے جنین خارج ہوتا ہے۔ گدھ کی بیٹ کی دھونی دینے سے جنین خارج ہو جاتا ہے۔

زراوند طویل ۹ گرام لیکر فلفل اور مر ملا کر کھانے سے جنین باہر آ جاتا ہے۔ اس کے حمل سے بھی یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ زراوند مدحرج بھی یہی کام کرتا ہے۔ روغن میتھی کا حقنہ کرنے سے اس عورت کو ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ جس کی رطوبتیں قبل از وقت بہہ گئی ہوں اور رحم میں خشکی ہو گئی ہو۔ برگ اخروٹ طہارت کے بعد سرکہ کے ساتھ کھانے سے حمل نہیں ہوتا۔ (دیسقوریڈوس)

حرف بابلی مسقط جنین ہے۔ (دیسقوریڈوس)

حاشا کا جو شانہ شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے جنین اور مشیمہ باہر آ جاتے ہیں۔ (جالینوس)

حاشا مخرج جنین ہے۔ (دیسقوریڈوس)

شحم حنظل نہ صرف قاتل جنین ہے بلکہ قتل جنین کے بعد عورت کو شفا یا ب بھی کرتا ہے۔ زنجار حدید (لوہے کا میل) پینے سے حمل نہیں ہوتا۔ چنا اخراج جنین میں معین ہوتا ہے۔ (جالینوس)

دمعۃ بیروج اور اس کی جڑ ۲ گرام کا شراب استعمال مسقط جنین ہے۔

نمک کا ٹکڑا حمل کرنے سے جنین گر جاتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

کبریت کی دھونی لینا جنین گراتا ہے۔ سمرینون کی جڑ کو گھس کر حمل کرنے سے جنین جلد خارج ہوتا ہے۔

کماذریوس اور اس کا جو شانہ حیض اور جنین خارج کرتے ہیں۔

(تجربات ابن داؤد)

زہرۃ السح کا حمل قاتل جنین ہے اور جماع سے فراغت کے بعد حمل کرنے سے حمل

نہیں قرار پاتا۔ تخم کرنب طہارت کے بعد حمل کرنے سے حمل نہیں ہوتا۔ (دیسقوریڈوس)

لوف الحیہ کا پھل نوے ملی گرام پانی ملے سرکہ میں ملا کر کھانے سے جنین ساقط ہو جاتا

ہے اور اگر عورت اس نبات کو پھول مر جھا جانے کے بعد سونگھ لے تو اسقاط ہو جاتا ہے۔

(ابن ماسویہ)

لوف الحیہ کی جڑ کے ٹکیاں بنا کر حمل کرنے سے جنین خارج ہوتا ہے۔ مر، افسختین یا آب ترمس یا عصارہ سداب کے ساتھ حمل کرنے سے جنین جلد خارج ہوتا ہے۔

(دیسقوریوس)

مقل یہودی کا حمل کرنے سے یا دھونی لینے سے جنین ساقط ہو جاتا ہے۔ مشکطرا مشیع پینا یا اس کی دھونی لینا بھی یہی صفت رکھتا ہے۔ اگر حمل کیا جائے تو زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پودینہ کا عصارہ بوقت جماع حمل کرنے سے حمل نہیں ہوتا۔ نسرین قاتل و مخرج جنین ہے۔ (جالینوس)

ایر سا میں شہد ملا کر استعمال کیا جائے تو قاتل اور مخرج جنین ثابت ہوتا ہے۔ اس کا روغن بھی مخرج جنین ہے۔ ایر سا بذات خود جنین کو فاسد کرتا ہے اور اسے خارج کرتا ہے۔

(بولس)

سقمونیا کپڑے میں لت کر کے حمل کرنے سے جنین مر جاتا ہے۔ سکنج ادر و مالی کے ساتھ پینے سے جنین مر جاتا ہے (ادر و مالی ایک شراب ہے جو ماء العنب و ماء البحر سے بنائی جاتی ہے) سا سالیوس کی جڑ اور تخم دونوں مسقط جنین ہیں۔

سداب کی خاصیت منی کو فاسد کرنا ہے۔ (جالینوس)

سداب مانع حمل ہے۔ فاشرا کی جڑ اگر ۹ گرام کھلائی جائے یا حمل کی جائے تو مخرج جنین و مشیمہ ثابت ہوتی ہے اور اس کا جو شانہ اگر اسمیں بیٹھا جائے تو وہ بھی یہی فعل کرتا ہے۔ فلفل جنین کو جلدی خارج کرتی ہے اور اگر اس کا حمل بعد جماع کیا جائے تو زبردست فساد منی کا سبب بنتا ہے۔ (ابن ماسویہ و رؤف)

فلفل کو جماع کے بعد حمل کیا جائے تو منی فاسد ہو جاتی ہے۔ عسر ولادت کی شکایت میں اخراج مشیمہ کے لئے کبریت اصفر (گندھک زرد)، مرا حمر، قفر، جوشیر اور قنہ ہموزن کی دھونی بار بار دی جائے اور جوشیر و قنہ پلایا جائے اور کبوتر کی بیٹ اور سانپ کی کچلی سے دھونی دی جائے۔ اگر کوئی عورت ہاتھی کی لید اور بزرالنج گوندھ کر حمل کرے یا صرف ہاتھی کی لید کا حمل کرے تو کبھی حاملہ نہیں ہوگی۔ قبض ہو تو نتواء الرحم کے اصول سے اس کا ازالہ کریں۔ بہت زیادہ جماع کرنے سے کبھی عورت کا رحم پھٹ جاتا ہے اور کبھی حمل کے بوجھ سے مٹانہ پھٹ جاتا ہے۔ اس کی صحیح علامت غیر ارادی طور پر پیشاب کا ٹکنا ہے۔ (ابن ماسویہ)

اگر اشنان فارسی ساڑھے دس گرام پی لی جائے تو اسی دن ولادت ہو جاتی ہے۔
 فردمانہ ایک گرام کا شرباً استعمال کیا جائے تو ولادت فوراً ہو جاتی ہے لیکن اس سے کھجلی ہو جاتی
 ہے۔ جروحکۃ پیدا کرنے میں یہ خردل کے مشابہ ہے۔ (جالینوس۔ کتاب السموم)
 میرے خیال میں یہ فردمانہ ہی ہے (مؤلف)

نرم بدن والی عورتوں کے یہاں ولادت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ لڑکے لڑکیوں کی
 نسبت آسانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ولادت مشکل ہو اور عورت فارغ نہ ہو پار ہی ہو تو اسکا
 مطلب ہے کہ عورت کے اعضاء متورم ہیں اور زیادہ تر خون حیض و بواسیر رک جانے کے بعد
 ہونے والے عوارضات جیسی شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ (کتاب الاہویہ والبلدان)

ایک پاگل لڑکی سے کسی نے جماع کر لیا اور اس کے اندر منی ٹھہر گئی تو میں نے اسے
 سرین کے بل نیچے سے اوپر کی جانب چھلانگ لگانے کا حکم دیا لہذا اس نے ایسے ہی سات بار
 چھلانگ لگائی۔ اس طرح کرنے سے اندر کی منی باہر نکل گئی۔ (بقراط۔ کتاب المنی)

چھلانگ صرف پیچھے کی جانب ہونی چاہئے تب ہی منی کا باہر نکلنا ممکن ہے کیونکہ پیچھے کی
 جانب چھلانگ لگانے سے منی ایک دم سے فم رحم پر آ جاتی ہے اور اگر سامنے کی طرف چھلانگ
 لگائی جائے تو منی مزید کھسک کر رحم کی طرف چلی جائے گی اور اگر حضیوں پر شوکران لگا کر ٹھنڈا
 کر دیا جائے کہ ان کے مزاج بگڑ جائیں یا کاٹ کر علیحدہ کر دیا جائے تو جانوروں میں نسل نہیں
 چلتی۔ حمل نہیں ٹھہر پاتا۔ (مؤلف)

شوکران کو بہ طور ضامد بار بار استعمال کیا جائے تب نسل کشی ہوتی ہے۔ (مؤلف)
 اگر حاملہ کے فصد لگائی جائے تو اسقاط ہو جاتا ہے خاص طور سے اگر اس کا حمل زیادہ
 دن کا ہو گیا ہو اور بڑھ گیا ہو۔ کیونکہ اس سے بچہ کی غذا ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بچہ بڑا ہو
 تو اس کو زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اس کی ماں کے فصد لگانا یا اس کی
 ماں کو بھوکا رکھنا یا استفراغ دم بچہ کے لئے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ حاملہ کو کثرت اسہال
 بھی اسقاط کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر عورت کو اخناق رحم یا عسر ولادت ہے اور ایسی صورت میں
 اس کو چھینک آجائے تو اس کے لئے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ حاملہ کے پستان اگر کمزور ہیں تو بھی
 اسقاط ہو سکتا ہے کیونکہ پستان کی کمزوری عروق رحم میں خون کی قلت کے باعث ہوتی ہے۔ جس
 کے نتیجہ میں بچہ نقص تغذیہ کی بنا پر مر جاتا ہے اگر حمل جڑواں ہے اور ایک پستان مرجھائی کمزور
 ہے تو ایسی صورت میں ایک بچہ کا اسقاط ہو سکتا ہے اور یہ بچہ اسی جانب کا ہوگا جس جانب کی

شدی کمزور ہے۔ (کتاب الفصول)

یہ بات ممکن ہے کہ ایک عورت جس کی ایک پستان ڈھیلی کمزور ہو گئی ہو اس سے لڑکے یا لڑکی کے اسقاط کی دلیل بنائی جائے۔ اس صورت میں چھینک لانے والی دواناک میں ڈالی جائے، نتھنے اور منہ بند کر دیا جائے۔ ایسا کرنے سے مشیمہ گر جائے گا۔ کیونکہ اس حال میں شکم میں تمداد اور تواثر واقع ہو جاتا ہے جو مشیمہ کے اسقاط میں معین ہوتا ہے۔

حاملہ کی چھاتی سے دودھ کا جاری ہونا جنین کے کمزور ہونے کی علامت ہے کیونکہ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بچہ کافی تعداد میں غذا حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ پستانوں کا بھرا ہونا اور دودھ کا جاری نہ ہونا بہتر حال کا پتہ دیتا ہے کیونکہ یہ متوسط حالت ہے جس میں نہ تو خون کی کمی کا اور نہ بچے کے غذایات نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے جو اسقاط سبب بننے والی علامات ہیں۔ اس کے برخلاف اگر دونوں پستان کمزور و ڈھیلے ہو گئے ہیں اور ان میں درد ہے یا پسلیوں میں درد ہے اور حاملہ بخار کی حالت میں اسقاط نہیں کر رہی ہے اور اس کے دونوں پستان ظاہری اعتبار سے گرم ہیں تو ولادت تکلیف سے ہوگی اور خطرہ سے خالی نہ ہوگی یا اسقاط ہوگا جو خطرہ سے خالی نہ ہوگا کیونکہ کبھی حاملہ کے اندر خراب خلطیں جمع ہوتی ہیں جو بخاروں کو ہیجان میں لاتی ہیں اور جنین موجود ہونے کی وجہ سے ان کا تنقیہ کے ہو پاتا۔ اس لئے کبھی تو تیز بخار سے بچہ ہلاک ہو جاتا ہے اور کبھی ہلکے بخار سے بچہ اور ماں بیمار ہوتے ہیں اور ولادت میں خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ولادت اسی وقت سلامتی کے ساتھ ہو سکتی ہے جبکہ حاملہ اور بچہ دونوں میں قوت ہو۔

بخور مریم کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر حاملہ اس کو لٹکا لے یا اس پر پیر رکھے تو جنین گر جاتا ہے اور اگر گردن اور بازو پر باندھے تو حمل نہیں ٹھہرتا۔ (مؤلف)

اس کے عصارہ میں اتنی زیادہ قوت ہوتی ہے کہ شکم پر اس کی مالش کرنے سے جنین فاسد ہو جاتا ہے اور کپڑے میں لت کر کے حمل کرنے سے بہت قوی مخرج جنین دوا بن جاتی ہے۔

اگر اس کا عصارہ مراق بطن، کمر اور ناف کے مقام پر لت کیا جائے تو جنین خارج ہو جاتا ہے۔

اسے بطور طلاء و حمل استعمال کیا جائے اور مہبل کے اندر پچکاری کے ذریعہ ڈالا جائے۔ یہ وہی مخرج جنین کا فعل انجام دیا ہے اور حرارت نہیں بھڑکاتا۔

(دیسقودیدوس و جالینوس)

بخور مریم کا عصارہ یقینی طور پر قاتل جنین ہے۔

مچھٹھ کا حمل مسقط جنین ہے۔ پودینہ کا حمل قاتل جنین ہے اور اس کا عصارہ پینا یا حمل کرنا مخرج جنین ہے۔ (دیسقوریدوس)

فر فیر کی دھونی مخرج مشیمہ ہے۔ (جالینوس)

قرمانا کی دھونی مسقط جنین ہے اور روغن قیصوم مخرج مشیمہ ہے۔ قثاء الحمار کے عصارہ کا حمل قاتل جنین ہے۔ باوثوق ذریعہ سے مجھے یہ بات پہونچی ہے کہ نمک درانی کا حمل مسقط جنین ہوتا ہے۔ (دیسقوریدوس)

قثاء الحمار کے عصارہ کا حمل کرنا مفسد جنین ہے۔ قنطور یون کبیر کی جڑ کا فرزہ بنا کر حمل کرنا مسقط جنین ہے اور قنطور یون صغیر کے عصارہ کا حمل مخرج جنین ہے۔ قنہ کا حمل یا دھونی مخرج جنین ہے۔ اس کو دودھ کے ساتھ پینے سے مردہ جنین خارج ہوتا ہے۔ قطران کو ذکر پر لٹوخ کرنے سے حمل نہیں ہوتا اور اس کا حقنہ مسقط جنین ثابت ہوتا ہے۔ اس کا حمل زندہ جنین کو مارتا اور پھر خارج کرتا ہے۔ اگر جماع کے وقت عضو تناسل پر اس کو لگا لیا جائے تو اس سے نطفہ خراب ہو جاتا ہے۔ حمل کے لائق نہیں رہ جاتا۔ یہ اعلیٰ درجہ کی مانع حمل دوا ہے اس کے مستقل استعمال سے عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ (دیسقوریدوس)

قطران کو بذریعہ حقنہ عورت کی مہبل میں اس طرح داخل کیا جائے کہ عورت نصف کولہوں تک چت لیٹی رہے۔ یہ حالت زیادہ موثر ہوتی ہے اخراج جنین کے لئے۔ دوسری دواؤں کو بھی اس طرح داخل کیا جاتا ہے اور کپڑا دوا میں بھگو کر حمل کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر تک اگر دوا اندر رہ جائے تو اس کا فائدہ سامنے آتا ہے۔ زوفاء رطب کا حمل جنین خارج کرنے میں سہولت پیدا کرتا ہے سو یا قبل جماع یا بوقت جماع فم رحم کے اندر رکھ لینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ (مؤلف)

پوست ینوت کی دھونی مخرج مشیمہ و جنین ہے۔ ترمس کو مر اور شہد میں ملا کر حمل کرنے سے جنین خارج ہوتا ہے۔ (دیسقوریدوس)

اس کا جالینوس نے بھی ذکر کیا ہے۔

لہسن کے جو شانہ میں بیٹھنے سے مشیمہ خارج ہوتا ہے۔ اس کی دھونی بھی یہی فائدہ پہنچاتی ہے۔ درخت غار کے جڑ کی چھال سواد و سوگرام پینے سے جنین مرجاتا ہے۔ غرب کا پتہ کھانے سے حمل نہیں ہوتا۔ تخم خیری زرد بغیر شہد کے سات گرام کا حمل کرنے یا شراباً استعمال کرنے سے ولادت کے قریب جنین خارج ہو جاتا ہے۔ خیری کے پھول خشک کر کے اس کا

جوشاندہ پینا مخرج جنین ہے اور مردہ جنین کو خارج کرتا ہے۔ اس کے پینے سے جنین مر جاتا ہے کیونکہ یہ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ اس کے تخم زندہ جنین کو خراب کر دیتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں اور مردہ کو خارج کرتے ہیں۔ اس کی جڑ بھی یہی کام کرتی ہے۔ دونوں خربق حمل کرنے سے جنین مر جاتا ہے اور خربق سیاہ بہ نسبت سفید کے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ (جالینوس)

اخراج مشیمہ کے لئے روغن بلساں یا روغن نمام اور روغن مرزنجوش اور روغن نار دین و مر میں کپڑا بھگو کر بطور حمل استعمال کریں۔

خیری زرد کا جوشاندہ اخراج مشیمہ کے لئے پینا چاہئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حمل سے بچنے کے لئے سفید کپڑا مندرجہ ذیل ادویہ میں ڈبو کر بطور حمل استعمال کیا جائے۔

سفوف برگ عرب اور سفوف ثمر غرب ہر ایک ساڑھ تیرہ گرام آب برگ غرب میں دواؤں کو بھگو دیا جائے۔

دوسرا نسخہ:

تخم کرنب نبطی اور حرف ہر ایک سات سات گرام لیکر پیس کر قطران میں گوندھ لیا جائے اور پھر ان کو آب پودینہ میں ڈبو کر حمل کیا جائے۔

نسخہ مانع حمل:

شم حنظل، سقمونیا، ہزار جشان سنندان، خبث الحدید، کرنب و تخم کرنب ہموزن لیکر پیس کر ان کو قطران میں گوندھ لیا جائے اور طہارت کے بعد کچھ دنوں تک عورت حمل کر کے اندر رکھے۔ (ابن ماسویہ)

شیلیم کا آنا آب کرنب میں پیس کر حمل کریں۔ (مجبول)

عورت پر ولادت دشوار ہو رہی ہو تو پرسیا و شاں کا سفوف شراب میں بھگوئیں اور اس میں کچھ روغن شامل کر لیں نیز مشکطرا مشیع شراب اور پانی کے ساتھ پینے اور چھینک لانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بچہ مر گیا ہے تو ۰۵ گرام آب سداب و میتھی اور انجیر پکا کر اس میں ساڑھے دس گرام صتربری شامل کریں اس کو تھوڑا تھوڑا پینے سے بچہ خارج ہو جائے گا اور اس کو آب سداب ۳۵ گرام مشکطرا مشیع، قطران اور ابھل کے جوشاندہ میں ملا کر عورت کی ناف اور کمر پر نطول کیا جائے نیز آب بازروج ۱۰۵ ملی لیٹر پیا جائے اس سے حمل نہیں ہوتا اور ذکر پر روغن بلساں لگانے سے بھی حمل نہیں ہوتا۔ قبل از جماع اس کا فتیلہ بنا کر رحم میں رکھ لیا جاتا ہے۔

(اسحاق)

خریق سیاہ کا حمل کرنے سے رحم کے اندر جمع شدہ مواد باہر نکل آتے ہیں۔

(دیسقوریڈوس)

دوائے مسقط مشیمہ بحوالہ ابن ماسویہ در علاج حاملہ :

رماد میں پانی ڈالکر اسے صاف کر لیا جائے۔ اس میں سے چار سو گرام لیکر پھر اس میں اوپر سے ۳۵ گرام خطمی ڈالکر پلائیں اور قئے کرائیں اور اس کو ناک میں سڑکیں تاکہ چھینک آئے۔ اگر درد زہ میں چار دن گزر جانے پر بھی واضح حمل نہ ہو سکے تو ایسی قوی دوا استعمال کر کے ماں کو پچانے کی تدابیر کریں جو بچے کے لئے بھی خطرناک نہ ہوں مثلاً آب سداب، روغن میتھی، آب میتھی جس کو تمر کے ساتھ پکایا گیا ہو اور روغن سمکنہ ناتحہ کاسفوف اور گھوڑے کی کھر کی دھونی دیں جب جنین باہر آ جائے اور رحم کو گاڑھے خون سے محفوظ رکھنا مقصود ہو جس سے تکلیف نہ ہو تو مقل اور زوفرایا حمل اور علك الانباط، صحر، خردل ابض کی دھونی دیں اس سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔

ایک دوا جو عسر ولادت، احتباس مشیمہ اور مردہ بچے کے اخراج میں کارآمد ہوتی ہے۔ مر، قنہ، جاو شیر، کبریت، گائے کا پتہ ہموزن لیکر سب کو قطران میں ملا لیا جائے پھر اس میں سے ایک جوزہ کے برابر لیکر اس کی بار بار دھونی دی جائے۔ نیز مر، قنہ، جاو شیر، ہموزن ساڑھے تین گرام کو کرفس کے نچوڑے ہوئے عرق اور طر مس کے جوشاندہ میں یکجا کر لیا جائے اور پھر اس میں سے استعمال کرایا جائے۔

وضع حمل کا وقت آ پہنچے تو حاملہ کیا کرے :

عورت کو ٹہلنے کی ہدایت دیں اور ہلکے ہلکے روغن رازقی چھڑیں۔ آب حلبہ جوش کر کے ۳۰ گرام اور اس کے برابر شراب طلاء ملا کر پلائیں۔ مشک اور کھرباء کی دھونی دیں۔ ماکولات و مشروبات، خوشبوئیات اور خوش گفتاری سے اس کو تقویت پہنچائیں اور ڈھارس بندھائیں۔ اگر زنف دم کثیر مقدار میں مقصود ہو، احتباس کا اندیشہ ہو تو مچھلی کی آنکھ اور گھوڑے کی سم کی دھونی دیں اگر احتباس دم سے مضرت کا اندیشہ ہو تو دھونی بار بار دیں۔ (ابن ماسویہ)

سرعت ولادت کیلئے عورت کو حمام میں داخل کر کے اس پر گرم پانی بہائیں یا اس کو گرم پانی میں بٹھائیں۔ لیسدار لعابوں کو پلائیں اور حمل کریں۔ موم زرد اور روغن سے شکم، پشت

، ران اور اس کے ارد گرد اعضاء کی مالش کریں۔ اسی طرح پوری ریڑھ کی ہڈی پر بھی لگائیں۔ اس کے بائیں ہاتھ میں مقناطیس پکڑا دیں۔

عجیب النفع ہے۔ اگر زرواند کپڑے میں لت کر کے حمل کریں تو فوراً ولادت ہو جاتی ہے۔ گھوڑے گدھے یا کسی چوپائے کے سم کی راکھ کو گوندھ کر بطور طلاء استعمال کرنے سے مردہ یا زندہ جنین فوراً خارج ہو جاتا ہے۔

اس کے لئے دھنی ران پر زبد بحر (سمندر جھاگ) لٹکایا جاتا ہے اور پوست قثاء خشک ۱۸ گرام کو استعمال کیا جائے تو ولادت باسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مرکی دھونی دی جائے۔ اس سے زیادہ قوی نسخہ یہ ہے کہ جند بید ستر یا حلتیت کھائی جائے یا زبد بحر کا بڑا سا ٹکڑا عورت کے اوپر رکھا جائے اس سے فوراً ولادت ہوتی ہے۔ مسل شکم مرہم جو بچہ کو آباسانی خارج کر دیتا ہے۔

حفظل کا عصارہ دسواں حصہ، تیوعات نامی پودوں میں سے کسی کا دودھ ساڑھے تین گرام، سقمونیا ساڑھے تین گرام، شحم حفظل سات گرام، قنہ دس حصہ۔ پہلے قنہ کو قطران میں ڈبو کر اس میں اور چیزوں کو بھی ملا لیں اور پھر اس سے طلاء کریں۔ خربق کو پانی میں ڈال کر اچھی طرح پکا کر اس میں بیٹھنے سے مشیمہ خارج ہو جاتا ہے لیکن مشیمہ خارج ہو جانے کے بعد روغن گلاب کا حمل کرنا ضروری ہے۔

حفظل کا عصارہ بچہ خارج کرنے میں بہت تیز ہوتا ہے اسی طرح ہینگ، قنہ اور قردمانا بھی ہیں۔ (اسلین)

علیق (ایک طرح کی تیل) کی چھال مانع حمل ہے۔ اگر طہارت کے بعد اس کو شرباً استعمال کیا جائے۔ اسی طرح غرب کا پھل اور اسی طرح فتاح کرنب طہارت کے بعد حمل کرنا مانع حمل ہوتے ہیں۔ (مجبول)

فتاح کرنب اور اس کے تخم کو طہارت کے بعد حمل استعمال کرنا مانع حمل ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح غرب کے پتے یا اس کا پھل زخم ڈالنے والے پانی کے ساتھ پینے سے حمل نہیں ہوتا۔

جوشاندہ برنجاسف میں بیٹھنا اس کے پانی کو رحم پر مارتا اور برنجاسف کی دھونی لینا مخرج مشیمہ ہے۔ (کتاب الکمال التمام)

درد زہ کی شدت سے رحم کا ایک حصہ فرج کی جانب خارج ہوتا ہے۔ جس کا سبب عتق

رحم کے گرد موجود اعصاب کا ڈھیلا پن ہوتا ہے لہذا وہ حصہ وہیں پر رہ جاتا ہے جسے عفل کہتے ہیں۔ حمل کا ذب کو فارسی میں بازو دروند کہتے ہیں۔ اس میں حمل کی علامت وہ عوارضات پیدا ہو جاتی ہیں لیکن پیدائش کے نام پر یا تو گوشت کے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں یا پھر ریا ح اور کچھ فضلات۔ اس طرح کے حمل میں عورت آرام کرتی ہے اور پھر اگر حاملہ ہوتی ہے تو اسقاط ہوتا ہے اور بسا اوقات ولادت میں کوئی دبیلا سا منہ آتا ہے۔

اس صورت میں روغن کلکلاخ و لغاذیہ کا استعمال کرائیں اور دبیلا کے لئے روغن بادام شیریں و تلخ ہمراہ ماء الاصول کے پلائیں۔ ممکن ہو تو فصد کریں اور مقام رحم پر محلل اور ملین ضادات کریں اور محلل اور ملین ادویہ کو بطور حمل بھی استعمال کریں۔

اگر حاملہ چوبیس دن تک روزانہ اٹھارہ گرام سداب بستانی آب گرم کے ساتھ پی لے تو حمل ساقط ہو جائے گا یا اس کا عصارہ اٹھارہ ملی لیٹر پیئے تو اسی طرح عصارہ سمسم یا لوبیا سرخ کا جو شانہ مستقل پینے سے اسقاط ہو جاتا ہے۔ (یہودی)

میرے خیال میں تازہ حنظل عصارہ یا اس کا تیز جو شانہ کا حمل بہت جلد جنین کو خارج کرتا ہے۔ (مؤلف)

عسر ولادت میں ہلکی غذا بھر بیٹ کھلائیں جیسے چوزے۔ (اختیارات جنین)

اس کے اوپر سے مناسب سے مقدار میں اچھی قوی نبیذ پلائیں۔ اس سے عضلات میں تحریک پہنچتی ہے۔ نیز ہلکی چہل قدمی کرائیں اس طرح ولادت ہو جائے تو ٹھیک ورنہ آب میتھی پلائیں اور عورت کے نچلے حصوں پر پشت اور اس کے اطراف پر پر لعاب بزر قطنوالت کریں۔ عسر ولادت میں مفید ہے۔

پیروں کے بل خارج ہونے والا جنین غیر فطری ہوتا ہے ایسے بچے جی تو جاتے ہیں لیکن ولادت کے بعد ان میں سوجن ہو جاتی ہے جو کچھ حالات میں تین دن کے اندر صحیح ہو جاتا ہے۔ بچہ ساتویں مہینہ میں پوری قوت کے ساتھ رحم کے اندر جگہ بدلتا ہے۔ جس سے وہ تھک جاتا ہے اور اس کے بعد اندر ٹھہرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر باقی رہ جاتا ہے تو پھر نویں دسویں مہینے تک رہ جاتا ہے اور سات مہینے کے بچے کے مقابلہ میں جسمانی ڈیل ڈول زیادہ ہو جاتا ہے۔ ساتویں ماہ میں اکثر بچے مرجاتے ہیں کیونکہ انھیں وہ جگہ تبدیل کرنے کے بعد طاقت بحال کرنے کے لئے مزید کچھ دن اندر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ قوت آنے سے پہلے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ نویں مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ تندرست ہوتا ہے۔ ساتویں

مہینہ والا کمزور اور دسویں مہینے والا بھی تندرست ہوتا ہے۔ بچے کی طبعی حالت ولادت میں آسانی پیدا کرتی ہے اور بچے کا خروج جلدی ہوتا ہے۔ اگر یہ جاننا ہو کہ جنین طبعی شکل میں ہے کہ نہیں تو عورت کے شکم کا ہاتھ لگا کر امتحان کریں۔ جنین رحم میں سر کے بل گرا ہوا محسوس ہوگا اور مشیمہ بچے کی جانب محسوس ہوگا غیر طبعی شکل میں جنین کا ہونا عورت کی غلط تدبیر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا سبب حاملہ کی غم و غصہ بھی ہوتا ہے اور کبھی ولادت میں جلدی کرنے کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے۔

عمر ولادت جب درپیش ہو تو مشیمہ کو چاک کر دیں اور اس کے ساتھ ہی عورت کو زور لگانے کے لئے کہیں اس سے اگر جنین کے پیر باہر آجائیں تو پھر ان کو اوپر کی طرف کر دیں حتیٰ کہ جنین بیٹھنے کی شکل اختیار کر لیں پھر اس کی پنڈلیاں پکڑ کر آہستہ آہستہ پھیلائیں اور برابر گھماتے رہیں یہاں تک کہ اس کا سر نیچے آجائے۔

دوسری تدبیر یہ ہے کہ عورت کو اس کے شراب سیف کے بل نیم گرم پانی میں بٹھائیں۔ موم اور روغن کی مالش کریں اور مرکا شافہ بنا کر حمل کریں۔ اگر اس کا ایک گھنٹہ تک ٹھہراؤ ہو جائے تو کرسی پر بٹھا کر اسے چھینک دلائیں اور اس کے زیریں شکم کو دبائیں۔ اس طرح جلدی ولادت ہو جائے گی جنین کو طبعی حالت میں لانے کیلئے عورت کے ساتھ مختلف تدابیر اختیار کریں۔ عورت کو کبھی چت لٹائیں، کبھی ہلائیں اور کبھی مختلف شکلوں میں اسے حرکت دیں۔

(مسائل مولودین)

حب جوف اربیان نکل آئے تو اسے خشک کر کے باریک پس کر محفوظ رکھ لیا جائے اور بوقت ضرورت عورت طہارت حاصل کرنے کے بعد ساڑھے چار گرام کی مقدار میں ہمراہ شراب ابیض پی لے تو حمل قرار نہیں پائے گا۔ اس طرح عورت کے رونے کے بعد اگر اس سے جماع کیا جائے تب بھی حمل قرار نہیں پاتا۔ گدھے کی سم کی دھونی دینے سے مردہ جنین خارج ہوتا ہے اور زندہ جنین مرجاتا ہے۔ (اطہور سفس)

جنین کا پیروں یا بازوؤں کے بل آنا غیر طبعی ہے۔ ایسا ولادت کے وقت عورت کی بکثرت حرکت سے بھی کھڑے ہو جانا، کبھی بیٹھنا، کبھی چت لیٹنا، کبھی کروٹ لینا وغیرہ سے واقع ہوتا ہے۔ (کتاب الجنین - بقراط)

ولادت کے وقت پیڑوں میں درد اٹھنے سے ولادت میں سہولت ہوتی ہے اور اگر کمر میں درد ہو تو تکلیف و دقت ہوتی ہے۔

جب ولادت کا وقت آجائے تو عورت کو بٹھائیں اور اس کے پیر پھیلا دیں اور اس کو کمر کے بل کچھ دیر چت لیٹنے کو کہیں، پھر کھڑی ہو جائے اور تیزی کے ساتھ سیڑھی پر چڑھے اور اترے اور بار بار چھینکیں دلا کر اس میں بیجان پیدا کیا جائے۔

رومی غلطی کے پتوں کو گھی اور شہد میں پکا کر کھانے سے ولادت میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اسطرک اقریطشی عورت کی ران میں باندھنے سے ولادت کے وقت درد نہیں ہوتا ہے۔ زعفران کو پیس کر دس گرام کی پوٹلی عورت ولادت کے بعد باندھ لے تو مشیمہ خارج ہو جاتا ہے۔ خنزیر کا فضلہ کپڑے میں پوٹلی بنا کر باندھنے سے نزوف دم بند ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال ہم کسی اور جگہ لکھ آئے ہیں۔ قنہ یا کبریت یا مر یا جاو شیر کی دھونی دینے سے ولادت میں سہولت ہوتی ہے۔ مشک اور کھرباء کی دھونی سے تنقیہ ہوتا ہے۔ مقناطیس ہاتھ میں پکڑنے سے ولادت آسان ہوتی ہے۔ چوپائیوں کی لید دھونی دینے سے بچہ باہر آ جاتا ہے۔ ابھل چوبیس گرام، سداب ڈیڑھ گرام، زیر اور کالا چنا بقدر ضرورت میں روغن حبۃ الخضر ۷۰۷ ملی لیٹر اور شہد پنیتیس ملی لیٹر ملا کر پینے سے مذکورہ تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ (طبری)

رحم کے قدرتی طور پر چھوٹے ہونے سے ولادت میں دشواری لاحق ہوتی ہے یا پھر پہلی بار کی ولادت ہو یا عورت موٹی ہو یا وہ کم ہمت ہو یا رحم کے اندر ورم حار ہو یا رحم میں کم قوت ہو، یا بچہ غیر طبعی شکل پر ہو یا مکمل بڑھوتری نہ ہوتی ہو یا غیر مقررہ وقت کے علاوہ ولادت ہو یا قبل از وقت مشیمہ پھٹ جائے اور اس کے باعث جب رحم میں رطوبت درکار ہو تو خشک ہو جائے یا ایک سے زائد بچے رحم کے اندر موجود ہوں۔

جنین کی پیدائش میں سہولت پیدا کرنے کے لئے بابونہ، میتھی، تخم کتاں، کرنب کے جوشاندہ میں بیٹھنا مفید ہے اور آب میتھی رحم میں ٹپکانا اور تخم کتاں کا ضاد کرنا مفید ہے۔ عمر ولادت میں ہلکی حرکت دینا، چھینک لینا، سانس کو روکنا اور پھر زور لگانا، وضع حمل میں مددگار ہوتے ہیں۔ مشیمہ خارج کرنے کے لئے عورت منہ کے بل لیٹے اور اپنے کولہوں کو اپنی رانوں سے ملا لے اور فم رحم پر قیروطی لگا لے۔ اگر مشیمہ چاک نہ ہو رہا ہو تو ناخون یا نشتر سے چاک کر لے اگر جنین غیر طبعی شکل میں ہو تو اس کو لوٹا کر طبعی شکل میں لائیں اور اگر مردہ ہے تو صا رہ سے پکڑ کر باہر نکالیں۔

زندہ یا مردہ جنین نکالنے کے لئے ایک شافہ، تربد، مر، خربق، جاو شیر، گائے کا پتہ ہموزن حاصل کر کے نکیوں کی شکل میں بنا کر رکھ لیں۔ پھر اسے بطور حمل استعمال کریں اور

زر نباد، کبریت کو گائے کے پتے میں گوندھ کر اس کی دھونی دیں۔ (ابن سرائیون)
 قثاء الحمار کا عصارہ گائے کے پتے گوندھ کر حمل کرنے سے جنین خارج ہو جاتا ہے۔
 (ابن سرائیون)
 شحم حنظل کا سفوف، شحم حنظل کے جوشاندہ میں گوندھ کر حمل کرنے سے جنین جلد خارج ہوتا ہے۔

اس سے زیادہ قوی نسخہ دیگر:

ستر ملی لیٹر جوشاندہ شحم حنظل کو فرج میں بذریعہ حقنہ داخل کریں۔ اس وقت عورت کو اس حالت میں رکھیں کہ اس کے کولہے قدرے بلند رہیں۔ لمبی نلی کی پچکاری میں جوشاندہ بھر کر رحم کے خوب اندر ڈال دیا جائے۔ اس عمل سے پہلے عورت کو آب گرم میں بٹھایا جائے اور کئی بار حمام کرایا جائے۔ اور مر، میعہ، روغن حنا اور مرغی روغنات اور روغن قطن و شہ کو بطور حمل استعمال کر لیا جائے یہاں تک کہ نم رحم تھوڑا سا کھل جائے پھر اسی جوشاندے کا حقنہ کر دیا جائے۔ اس طرح خروج جنین میں انشاء اللہ بڑی آسانی اور بڑی جلدی ہو جائے گی۔
 (مؤلف)

کتاب الحاوی کا تیسرا مرحلہ / مقالہ مکمل ہوا علامہ رازی مرحوم کی ترتیب کے لحاظ سے یہ آٹھواں مقالہ تھا۔ نویں مقالہ میں مدرات طمٹ، مضرات احتباس طمٹ اور جسم پر ظاہر ہونے والی نشانیاں اور منقیات رحم اور دوران نفاس رحم کی صفائی کرنے والی ادویہ۔ اور اس بات کا علم کہ طمٹ آئے گا کہ نہیں اور دیگر متعلقات آنے والے ہیں کہ نہیں۔

اس کی کتابت طلیطلہ میں کی گئی جو ابوالحجاج یوسف ابن شیخ مرحوم مکرم ابو اسحاق بن نجمیس (خدا ان کے سائے کو قائم رکھے) کی عنایت سے ہوئی اور اس سے فراغت پیر کے روز پندرہ مئی ۱۱۶۳ھ بمطابق ۱۰ جمادی الاولیٰ ۶۲۳ھ کو ہوئی۔

راقم الحروف یوسف بن محمد طیو جی اللہ وحدہ لا شریک کا شکر یہ ادا کرتا ہے۔ اصل نسخے سے مقابلہ کر کے حتیٰ مقدور صحت کر دی گئی ہے۔ اس کے لئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ (۱)

(۱) اسکوریال نمبر ۸۱۰ کا متن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے نمبر ۸۱۳ کا شروع ہوتا ہے۔ متن کی بنیاد اسکوریال لائبریری کا نسخہ نمبر ۸۱۳ ہے۔

پانچواں باب

وہ چیزیں جو حیض جاری کرتی ہیں، احتباس طمث کے نقصانات، احتباس کی حالت میں جسم کی کیفیت اور اس کی علامات، تنقیہ رحم و نفاس اور اس بات کی جانکاری کہ حیض جاری ہو گیا یا نہیں۔

خون حیض کے رک جانے سے سارے جسم میں گرانی ہوتی ہے اور اشتہا ختم ہو جاتی ہے۔ لرزہ، قلق، متلی، رحم کا کسی جانب گر جانا اور کبھی ظاہری اعتبار سے غالب میں غیر طبعی موٹاپا ظاہر ہوتا ہے جو کسی عضو میں ورم کا پتہ دیتا ہے کبھی یہ ابھار چیرا لگانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کمر اور گردن میں درد ہوتا ہے۔ حمی محرقہ لاحق ہوتا ہے، کالا پیشاب ہوتا ہے جس میں کونکہ ملا ہوا گوشت کے پانی جیسی سرخ پیپ مل کر آتی ہے۔ نیز عسر بول کی شکایت ہوتی ہے، اوندھے پھوڑے اور گرم اور ام لاحق ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر طمث جاری رہے تو اس طرح کی کوئی شکایت پیش نہیں آتی۔

اور اس طرح بہت سی عورتوں کے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے۔ احتباس طمث اکثر گوری اور بلغی مزاج کی عورتوں میں ہوتا ہے۔ (کتاب الاعضاء الملمہ۔ باب ۷)

ہذا اصل نسخہ میں یہاں کچھ ملنا ہوا ہے۔

احتباس طمث کا سبب یا تو ورم رحم ہوتا ہے یا اکثر اوقات ولادت کے باعث رحم کے الٹ جانے سے ہوتا ہے یا پھر خون کا گاڑھا ہو جانا یا پھر رحم میں کھلنے والی عروق میں سدہ بن جانا یا فم رحم کا بند ہو جانا یا مجموعی طور پر جو ہر رحم میں کثافت پیدا ہو جانا ہے یا کوئی بھی عارضہ جو غلظت خون کا باعث ہو وغیرہ اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں جن میں افادیہ سے تکمید کرنا مفید ہے۔ کہ اس سے غلظت میں نرمی آتی ہے، سدے کھلتے ہیں اور مواد ورم میں نرمی آتی ہے۔

احتباس طمث کسی غلیظ یا بارد خلط کے غالب آ جانے سے بھی ہوتا ہے۔ جس کی پہچان خون کے رنگ سے اور تدبیر ماقبل سے ہو جاتی ہے۔ پھر فسد کے ذریعہ اس خلط کا استفراغ کیا جاتا ہے۔ اور اگر احتباس طمث کا سبب اخلاط کی غلظت ہوتی ہے تو افادیہ کے جو شانہ میں بیٹھنا اور ملطف و مرقق خون تدبیر عمل میں لانا پودینہ کے فرزجہ وغیرہ کے رکھنے سے اور دوسرے ملطت مدرات کے استعمال سے طمث جاری ہو جاتا ہے۔ اگر عورت کو اس حالت میں دودھ آئے جب کہ نہ تو وہ دودھ پلا رہی ہو اور نہ حاملہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل کہ خون کا میلان اوپر کی جانب ہو گیا ہے اور جب خون چھاتی کی جانب مائل ہو جاتا تو دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ (الفصول - ۵)

احتباس طمث سے بہت امراض و عوارض پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ رحم کے بند ہو جانے سے یا عروق (جن میں خون حیض گرتا ہے) میں سدہ لاحق ہونے سے یا خون گاڑھا ہو جانے سے یا برودت لاحق ہونے سے یا عروق رحم کے منہ کے بند ہو جانے سے ہوتا ہے اور جب ان اسباب سے زیادہ مدت تک قلت و احتباس طمث کی شکایت رہے تو رحم کی بیماری ہونا لازمی ہے خواہ وہ ورم حار ہو یا حمراء یا سقیروس یا سرطان یا استفراغ دم مفراط۔ جبکہ طبعی صورت میں رحم میں اس طرح کی کوئی چیز عارض نہیں ہوتی۔ (بقراط)

اگر طمث جاری کرنا مقصود ہو تو حیض کے متعین دن سے قبل رگ صافن کی فصد کریں اور پنڈلی پر پچھنہ لگائیں۔ دوسرے دن دوسرے پیر میں بھی یہی کریں اور خون صالح کا بھی تھوڑا سا استفراغ کریں اور مدر طمث کی بھی تدابیر اختیار کریں۔ ☆..... اور اس سے بھی زیادہ قوی درجے کی مدر طمث دوا ابھل اور مشکطر امشیع ثابت ہوتی ہے۔ ☆..... افادیہ اور خاص طور سے۔ (کتاب الفصد)

کتاب السوداء..... ☆..... نفاس کے بعد اگر دار چینی کے ساتھ ہوا انتہائی سیاہ آتا ہے

☆ اصل نسخہ میں یہاں کچھ مٹا ہوا ہے۔

کیونکہ زمانہ حمل میں بگڑ کر سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ (کتاب الفصد)

چہرہ کا زیادہ سرخ ہونا، سر کی گرانی، جسم کے اندر تھکن، آنکھوں کی گہرائی میں درد، احتباس طمث کی علامات ہیں اور اگر طمث اس کی دواؤں سے ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے جب کہ اس کا استعمال صحیح وقت میں کیا جائے۔ زیادہ عرصہ تک طمث جاری نہ ہو، جسمانی رنگت سفید ہو، جسم رطوبی اور آبی ہو تو عورت کا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے اور مرض استسقاء پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک عورت جس کا حیض طویل مدت سے بند تھا اور کھانے کی خواہش ختم ہو چکی تھی اور جسم لاغر ہو گیا تھا۔ اطباء اس کے اختلال شہوت اور کمزوری جسم کے سبب فصد لگاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے عروق مٹیا لے خون سے پر تھیں۔ میں نے فصد لگائی تو اس زفت کی طرح کا خون نکلا۔ اس کو دیکھ کر میں نے اور زیادہ خون نکالا۔ پہلے دن ۶ سو گرام دوسرے دن ۴ سو گرام تیسرے دن دو سو گرام خون نکالنے کے بعد وہ عورت صحت مند ہو گئی۔ حیض معمول پر آ گیا اور جسم توانا ہو گیا۔ (کتاب السودا۔ دوسرا باب، فصل ۳)

ایک عورت بہت بچوں والی تھی اچانک بیوہ ہو جانے سے طویل عرصہ تک حیض رک گیا۔ اس دوران اس کا بدن مردانگی کی طرف مائل ہو گیا۔ سارے بدن پر بال نکل آئے، اس کی داڑھی نکل آئی، آواز مردوں کی طرح موٹی اور بھاری ہو گئی اور بعد میں وہ مر گئی۔

(کتاب ابذیمیا)

زیادہ بچہ والی عورتوں کو اکثر یہ صورت پیش آ جاتی ہے۔ طمث نہ آنے سے یہ تبدیلی پیش آتی ہے۔ اطباء نے اس طرح کی کئی عورتوں کا ذکر کیا ہے جن کو یہ سبب پیش آئے۔ وہ یا تو کسی بڑے مرض کا شکار ہوئیں یا مر گئیں۔ میں نے خود بھی ایسی عورت کا مشاہدہ کیا۔

(جالینوس)

ایک دوسری عورت کو بالکل یہی صورت پیش آئی۔ میں نے طمث جاری کرنے کی کوشش کی لیکن جاری نہ ہوا اور نہ دودھ باقی رہ سکا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ (بقراط)

جب کبھی کسی عورت کو مردانگی کی طرف منتقل ہوتا ہوا دیکھو تو اس رجحان کو روکنے کے لئے کوئی چیز کارآمد نہیں ہے اور یہ صرف انہی عورتوں کو ہوتا ہے جن میں مردانہ مشابہت موجود ہوتی ہے۔ زیادہ تر زیادہ عروق والی اور کم گوشت والی ہوتی ہے۔ (جالینوس)

ٹھنڈے پانی کا استعمال دوران طمث میں فساد لاتا ہے۔ روم کی عورتیں چونکہ برف کا پانی پیتی ہیں اس لئے ان کا دوران طمث بگڑ جاتا ہے اور تنقیہ بھی نہیں ہو پاتا۔ جس کی وجہ سے

بہت سے امراض کا شکار ہوتی ہے اور بانجھ ہو جاتی ہیں۔ (کتاب الاہویہ والبلدان - فصل ۱)
 فرنیون تازہ پانی میں سل بٹے سے پیس کر روئی میں لت کریں اور ایک گھنٹہ کے لئے
 اس کا حمول کر دیں زیادہ دیر تک کے لئے نہ کریں۔ بہت زیادہ خون جاری ہوگا۔ دوسرا نسخہ جو
 اس سے بھی قوی ہے۔ خربق سیاہ اور حنظل کی جڑ پیس کر پانی میں گوندھ لیں اور لمبا شافہ
 بنالیں۔ پہلی بار یہ بہت رطوبت نکالے گا پھر خون لائے گا۔ (مجبول)

اور اگر بہ تقاضائے عمر حیض بند ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں کیونکہ ایسی عورت کا خون کم
 اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جو عورتیں محنت کش ہوتی ہیں اس کا حیض کم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا خون
 جل جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے۔ طبعی انقطاع انتہائے حیض کی مدت پچاس سال ہے اور بعض میں
 ساٹھ سال ہوتی ہے لیکن میں نے اس عمر میں نہیں دیکھا۔ اور کبھی کبھی چالیس سال کی عمر کے
 بعد بھی حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور حد سے زیادہ موٹی عورتوں میں حیض کم آتا ہے لیکن ان کا
 خون جسمانی تغذیہ میں صرف ہو جاتا ہے۔ اور ان میں سے☆..... جن کا حیض کم آتا ہے
 لہذا اگر مندرجہ بالا اسباب میں سے کوئی سبب موجود نہ ہو اور حیض کا آنا بند ہو جائے تو یہ مرض کی
 دلیل ہے☆..... اور سراور اشتہاء ختم ہو جائے تو اس وقت ایسی دوائیں استعمال میں لائیں
 جو حیض جاری کریں مثلاً جند بیدستر، قردمانہ اور حرف☆..... اور سکینہ اور میتھی اور اسی قسم
 کی دوسری چیزیں لے کر بطور حمول استعمال کریں اور اس کو پلائیں بھی اور اس کی دھونی بھی
 دیں۔ اور جب بہت زیادہ پسینہ آئے خواہ ٹکان سے یا☆..... حیض و پیشاب آنے سے
 تو مدرطمت دوائیں استعمال کرتے وقت اس بات کا دھیان دیں کہ بہت زیادہ تفریق نہ ہونے
 پائے۔

دواء قوی☆..... الحیض، بیخ کرفس، رازیانہ، پوست بیخ کبر، قسط، بیخ حنظل اور
 مجیٹھ۔ فوۃ الصغ، اور حب☆..... اور شونیز، نانخواہ اور قردمانہ کو خوب اچھی طرح پکائیں
 اور اس میں سے ۱۳۰ گرام لے کر روزانہ جب حیض آنے والا ہو پلائیں۔

طمت ضعف جگر کی وجہ سے بھی بند ہو جاتا ہے اور بعض اعضاء کے اشتراک سے بھی
 ہوتا ہے اس کی بھی تفتیش کی جائے اور متاثرہ عضو کی فصد کی جائے۔ جب اس بات علم ہو جائے
 کہ بیماری کا مرکز رحم ہے اور کوئی دوسرا امر مانع نہ ہو تو رگ صافن کی فصد کھولیں اور چار سو ملی
 لیٹر سے کم اور ایک ہزار ملی لیٹر سے زیادہ خون نہ نکالیں اور ایسا دوران طمت کرنا چاہئے۔ پھر

☆ اصل نسخہ میں کچھ مٹا ہوا ہے۔

وقفہ کے دوران ایارج، شحم حنظل دیں۔ اس کے ذریعے اعضاء کو دبائیں اور پیروں کو طمٹ کا وقت آنے سے تین دن پہلے باندھیں اور حمام کرائیں اور ادویہ محمرہ پیڑ و اورریڑھ کی ہڈی پر لگائیں۔ پھر تنقیہ کے لئے ایارج، شحم حنظل، فصد کریں اور پنڈلی پر پچھنہ لگائیں اور خربق سیاہ سقمونیا، قنطور یون، شحم حنظل، صمغ زیتون بری، عصارہ سداب، عصارہ افسنتین کا حمل کریں۔ اس سے قوت کے ساتھ طمٹ جاری ہوگا اور جنین خارج ہوگا۔ (بولس)

ایک مدر طمٹ فرزجہ:

مقل ۳۵ گرام، جاو شیر، عسل البنی، حرف، کردمانہ، تخم جرجیر، جند بیدستر، روغن سوسن کا فرزجہ بنا لیا جائے۔

قوی مدر طمٹ:

مر، مجیٹھ، فجنکشت، بادام تلخ، صحر کو آب ترمس یا جو شانہ مشکطرا مشیع کے ساتھ پیئیں۔ (تذکرہ یوسف تلمیند)

ایک مدر طمٹ فرزجہ:

اشنان اخضر، عاقر قرحا، شونیز، سداب تازہ، فریون، قنہ میں گوندھ کر زنبق میں بھگوئے ہوئے کپڑے میں لت کر کے حمل کریں۔ (کتاب اکمال والتمام)

جس عورت کو خشکی بدن کی وجہ سے طمٹ نہ آتا ہو اس کو حمام، مرطوب غذاؤں اور شراب مائی کو کثرت سے استعمال کرنا چاہئے۔ پھر مدر طمٹ دوا و حمل کرنا چاہئے اور جس کو چربی کی کثرت کی وجہ سے طمٹ نہ آتا ہو وہ اپنی چربی کو نظرون کی مالش سے اور لطیف تدابیر سے گھٹائے۔ (کتاب میسون۔ علاج حوامل)

احتباس طمٹ جسمانی مرض اور خون کی قلت کی وجہ سے ہوتا ہے یا ورم رحم سے یا غلظت خون سے یا کسی عضو سے زیادہ مقدار میں خون کے خارج ہو جانے سے یا اعتدال سے زیادہ چربی ہونے سے یا کوئی زخم لاحق ہو کر مندمل ہو جائے اور سدہ بنا کر عروق کے منہ بند کر دے اور اس کے نتیجہ میں بھوک ختم ہو جاتی ہے، کمر، کولہے، ران، سر اور آنکھ میں درد ہو جاتا ہے۔ بخار اور متلی ہوتی ہے۔ پیشاب سیاہ و سرخ ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات قبض ہو جاتا ہے عسر بول کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ اور سوداوی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا سبب ورم ہو تو

اس کو تحلیل کرنے کی تدبیر کی جائے۔ اگر.....☆..... اس کا علاج لوہے سے کیا جائے۔
 قوی درجے کی دوا یہ ہے.....☆..... ماء الحسل کے ہمراہ پیٹنگ ساڑھے تین گرام
 کھلائی جائے یا پودینہ کوہی اور مرہموزن لیکر حمام کے بعد پلائی جائے.....☆..... خربق سیاہ
 اور بخ حظل اور کندس ہموزن باریک پیس کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیں اور تیل کے پتے کے
 ساتھ گوندھ کر بطور حمل استعمال کریں۔

نسخہ دیگر:

شحم حظل، افسخنیں ہموزن لیکر تیل کے پتے میں گوندھ کر بطور حمل استعمال کریں۔

مدر طمٹ شافہ جو مجرب اور نہایت عمدہ ہے:

شحم حظل، افسخنیں، اسارون، شونیز، کندس، وج، عرطنیشا، پہاڑی پودینہ، ایرسا،
 سداب، قفل، مقل، مر، پیٹنگ سب کو تیل کے پتے میں گوندھ لیا جائے اور اس کا حمل کیا جائے
 مجرب ہے۔ جنین کو جلد خارج کرتا ہے۔ عصارہ نقشاء الحما کر کو تیل کے پتے میں گوندھ کر حمل کرنا
 قوی مدر طمٹ اور مخرج جنین ہے۔

ایک نسخہ جو طمٹ جاری کرتا ہے اور حاملہ کو نقصان نہیں کرتا:

وج، جند بیدستر، انیسون، تخم کرفس ہر ایک ساڑھے تین گرام شراب ممزوج میں ملا کر
 پینے سے جنین کو قوت ملتی ہے، کوئی اذیت نہیں ہوتی اور طمٹ جاتی ہوتی ہے۔ (ابن سرائیون)
 جو دوائیں مدر طمٹ ہوتی ہیں وہ مدر لبن بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر اس میں کمی آجائے یا
 بند ہو جائے تو ان دواؤں سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ایسی حالت میں ابھل، مر، فودنج،
 مشطر امشیع، اسارون، سقط، مر، سلیج، دارچینی حاما، زراوند کی ضرورت ہوتی ہے یہ دوائیں
 مدر بول ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مجفف دوائیں مقدار میں مدر دواؤں کے
 مقابلہ میں کم ہوں۔ (کتاب ادویہ مفردہ۔ باب ۵)

حاملہ کے طمٹ بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مشیمہ رحم میں کھلنے والی رگوں کے منہ سے
 وابستہ ہوتا ہے اس لئے قلیل مقدار میں خون کا آنا عروق الرحم کی عروق کے ذریعہ ہوتا ہے جو بہت
 ہی کم اور کمزور ہوتی ہیں۔ جب خون زیادہ مقدار میں آجاتا ہے تو مشیمہ رحم میں لٹک جاتا ہے
 اور خارج ہو جاتا ہے۔ (الفصول۔ باب ۵)

☆ اصل نسخہ میں یہاں کچھ مٹا ہوا ہے۔

جس عورت کو حیض حرارت طبعی کی وجہ سے نہ آرہا ہو اسے آرام اور نیند اور حمام اور مرطوب غذاؤں کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اس کے بعد شیاقات کا حمل کرنا چاہئے اور جس کو زیادہ چربی کے باعث طمث نہ آرہا ہو اس کو مجففات کا استعمال کرانے کے بعد مناسب دواؤں سے حمل کرنا چاہئے۔ (میسوسن)

میری رائے میں جیسا کہ قرابادین کبیر میں بھی ہے ادرا طمث کا قوی علاج مندرجہ ذیل ہے:

مچھ، مشکطرا مشیع، قردمانا، سداب، ابھل جوش دیکر جامد کر لیا جائے پھر ہینگ پونے دو گرام شامل کر کے گولیاں بنالیں پھر اس میں سے پینتیس گرام کے بقدر لیکر کھلایا جائے اور زراوند کا فرزجہ کیا جائے۔

غذا میں چنے کا پانی اور بہا کا شوربا سفید باج وغیرہ دئے جائیں۔ کئی دن ایسا کرنے کے بعد جب سخونت (گرمی) بڑھ جائے۔ بخار کی طرح ہو جائے تو دہنی پنڈلی میں مکھنہ لگائیں پھر تین دن کے بعد بائیں جانب کی پنڈلی میں لگائیں۔ (مؤلف)

مشکطرا مشیع قوی مدر طمث ہے۔
فوہ قوی مدر طمث ہے۔

ترمس کا شرابا اور بطور حمل استعمال کرنا مفید ہے اور اس کا جوشاندہ مراور سداب کے ساتھ اور بھی زیادہ قوی ہے۔

حاشا اور کبر کی جڑ کی چھال قوی درجے کی مدر طمث ہے۔ سلیخ غلظت اخلاط کے سبب سے ہونے والے احتباس طمث کو جاری کرتی ہے۔ قنطاریون جلیل مدر طمث ہے۔
قسط تلخ مدر طمث ہے۔ (المفردات)

پیاز کا حمل مدر طمث ہے بزر الخیری نوگرام کا شرابا استعمال تمام مدر طمث دواؤں میں انتہائی درجے کی زوردار دوا ہے۔ کاشم، رازیانج، شونیز غلیظ خون حیض کو جاری کرتے ہیں۔ بطر اسالیون طمث جاری کرنے کے لئے اچھی دوا ہے۔ (اصل نسخہ میں اس جگہ کچھ الفاظ مٹے ہوئے ہیں) اس لئے مرتبین نے ایسے ہی نقل کیا ہے جو قابل اعتبار نہیں)

کرنب مدر حیض ہے۔ (کتاب الفلاح)

میہ کا حمل حیض جاری کرتا ہے۔ (ماسر جویہ)

کثرت حرارت اور بیوست جسم سے بھی حیض کا آثارک جاتا ہے۔

(کتاب جبل علی جبل)

احتباس حیض کی علامت یہ ہے کہ پورے جسم میں گرانی، بھوک کی کمی، بے چینی، لرزہ اور صلابت رحم واقع ہوتی ہے۔ جن کے نتیجہ میں درد ہوتے ہیں۔ کبھی یہ درد کو لہے یا پہلو میں ہوتا ہے اور کبھی پنجہ میں اور کبھی انگلیوں میں ہوتا ہے جس سے حالب میں خراج۔ پھوڑا۔ ہو جاتا ہے۔ جس کو نشتر لگا کر علاج کرنا پڑتا ہے اور اس میں مریضہ کو خراب چیزیں کھانے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے نیز بے چینی اور متلی ہوتی ہے۔ کمر، گردن اور سر میں درد ہوتا ہے۔ جی محرقہ ہوتا ہے۔ پیشاب سیاہ سرخ پیپ کے ساتھ آتا ہے۔ گویا گوشت کا پانی پیشاب میں ملا ہو اور پیشاب رکنے کی بھی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔

جب کبھی کسی عورت میں یہ علامت ظاہر ہوں تو اس سے اس کے حیض کے بارے میں پوچھیں معلوم ہوگا کہ اس کا حیض بند ہے۔ (کتاب اعضاء الالمہ)

قرمانہ کا حمل کرنے سے حیض جاری ہوتا ہے۔ اسی طرح مازریون فوراً حیض لاتا ہے۔ (مجبول)

احتباس طمث یا تو ضعف بدن اور قلت خون کے باعث ہوتا ہے یا اس سدے کی وجہ سے ہوتا ہے جو قرحہ وغیرہ کا علاج کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے اور جو فم معدہ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ مجاری بند ہو جاتے ہیں۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر گرانی، بھوک کا کم لگنا، درد دل، پہلو، ران، سر، گردن میں درد اور بخار و غشی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیشاب سیاہ اور بدبودار ہوتا ہے اور کبھی عسربول کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے اور قبض ہو جاتا ہے۔ مایخو لیا، سانس کی تکلیف اور سرطان وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ اگر احتباس کا سبب ورم ہو تو محلل دوائیں مددگار ہوتی ہیں اور اگر مجاری کے سدے برودت یا غلظت خون سے ہیں تو پہلے ملطف غذائیں اور پھر ملطف دوائیں دے کر خون کو ہلکا اور پتلا کیا جائے۔ تیز ملطف حمل بھی کئے جائیں۔ اگر موٹاپے کے باعث احتباس واقع ہے تو ریاضت، تقلیل غذا اور گرم حقنہ کام میں لا کر موٹاپا کم کریں اور اگر کمزوری کے باعث ہو تو حرارت عزیز یہ کو برا بیختہ کرنے کی تدابیر کریں۔ اگر فم رحم میں کوئی زائد گوشت پیدا ہو جانے سے احتباس ہو تو نشتر سے گوشت کو کاٹ کر الگ کر دیں۔

ان عورتوں کے لئے مدرطمت فرزجہ کا نسخہ جو آرم طلب ہوتی ہیں:

جند بیدستر اور مشک کو روغن بان میں گوندھ کر نکلیاں بنا کر حمل کریں۔

دوسرا نسخہ:

مر کو روغن زنبق میں گوندھ کر فرزجہ بنائیں اور روغن بان کے ساتھ حمل کریں۔

(سراپیون)

گل اٹھو ان حمل کرنا مدرطمت ہے۔

اٹھو ان ابیض غلیظ خلطوں کو تحلیل کر کے لطیف بناتا ہے۔ اس لئے اس کی شاخوں کو کسی

مشروب کے ساتھ شرباً استعمال کرنے سے طمت جاری ہوتا ہے۔ (جالینوس)

اٹھو ان سرخ پینے سے طمت تحلیل ہو کر جاری ہوتا ہے۔ (بولس)

انسان کا پیشاب جو پرانا ہر کر متعفن ہو جائے اور اس میں شدید بدبو پیدا ہو جائے تو

اس میں ڈیڑھ گرام کراٹ (گندنا) پکا کر اس سے آبزین لینے سے پانچ دن کے اندر رحم کی

صفائی ہو جاتی ہے۔ (اظہور سفس)

اسارون اور اذخر دونوں مدرطمت ہیں اور ابھل انتہائی لطافت کی وجہ سے تمام

چیزوں سے زیادہ مدرطمت ہے۔ برگ انجرہ کے ساتھ پیس کر استعمال کرنے سے طمت جاری

ہوتا ہے اور اگر تھوڑی مقدار مرکا جو شاندر برگ انجرہ کے ساتھ پی لیں تب بھی مدرطمت ہے۔

اخروٹ نوگرام کو بیج کے ساتھ پینے سے جلد حیض آتا ہے۔ افسنخین کو شہد میں ملا کر حمل

کرنے سے جلد حیض آتا ہے۔ اس کا پینا احتباس طمت میں مفید ہوتا ہے۔ انیسون رحم کی مائی

رطوبتوں کو حیض کے ساتھ خارج کرتی ہے۔ حلتیت، مراور قفل کے ساتھ پینے سے حیض جاری

ہوتا ہے۔ فنجکشت کا پھل نوگرام کی مشروب کے ساتھ پینے سے طمت جاری ہوتا ہے اور اگر اس

پھل کو پودینہ بری کے ساتھ پیا جائے یا حمل کیا جائے یا دھونی دی جائے تب بھی طمت جاری

ہوتا ہے۔ پیاز کا پانی مدرطمت ہے۔ برنجاسف کے جو شاندرے میں آبزین لینا طمت جاری کرنے

میں موافق آتا ہے۔ اگر اسے زیادہ مقدار میں پکا کر ضماد بنا لیا جائے اور شکم کے زیریں حصہ

میں لگایا جائے تب بھی حیض جاری ہو جاتا ہے۔

عصارہ برنجاسف کو مر کے ساتھ پیس کر حمل کرنے سے حیض جاری ہوتا ہے اور رحم سے

مواد خارج ہوتا ہے۔ اگر اس کی جوب ساڑھے تیرہ گرام کھالی جائیں تب بھی اور اگر طمت

ہوتا ہے۔

جوشاندہ بابونج کو پینا یا اس کے جوشاندہ کا آبزین لینا جلد حیض جاری کرتا ہے۔
 پر سیاوشان مدرطمت ہے اور نفاس کا تنقیہ کرتا ہے۔ جند بیدستر نوگرام پودینہ بری کے
 ساتھ پینے سے حیض جاتی ہوتا ہے۔ (دلیقوریدوس)

جس عورت کو احتباس طمت ہوتا ہے میں اس کی رگ صافن کی فصد کھولنے کے بعد جند
 بیدستر پودینہ کے ساتھ پلاتا ہوں۔ میرا تجربہ ہے کہ یہ بغیر کسی مضرت کے ہر حال میں حیض جاری
 کرتا ہے۔ میں اس کو ماء العسل کے ساتھ پلاتا ہوں۔ جاوشیر کو شہد میں ملا کر کھانے سے حیض
 جاری ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)

جاوشیر کا پھل افسنتین کے ساتھ پینے سے طمت جاری ہوتا ہے۔ جوز بری کا تخم کھانے
 سے حیض جاری ہوتا ہے۔ دو قومدرطمت ہے۔ جعدہ مدرطمت ہے۔

دارچینی مدرطمت ہے خواہ اس کو شراب لیا جائے یا مر اور ہیوفار یقون کے ساتھ بطور حمل
 استعمال کیا جائے۔ (دیسقوریدوس)

اس کی خاصیت حیض لانا ہے۔ صمغ زیتون بری جوزبان پر سوزش پیدا کرتا ہے، مدر
 طمت ہوتا ہے۔ (بدیغورس)

بکرے کی میگنی خاص طور سے جنگلی بکری کی میگنی کسی افادیہ کے ساتھ پینے سے حیض جاری
 ہوتا ہے۔

زراوند طویل حمل کرنے سے حیض جاری ہوتا ہے۔ اس کو نوگرام کی مقدار میں قلقل
 اور مر کے ساتھ لینے سے خون نفاس کا تنقیہ ہوتا ہے یعنی رحم کے اندر کے فضلات خارج
 ہو جاتے ہیں۔ زراوند مرحرج کا بھی یہی فعل ہے۔ زوفران کی جڑ اور کے تخم مدرطمت ہیں۔
 (دیسقوریدوس)

میتھی کا جوشاندہ شہد میں ملا کر پینے سے طمت جاری ہوتا ہے۔ (بولس)
 حرف مدرطمت ہے۔

حاشامدرطمت ہے اور شہد میں ملا کر اس کا جوشاندہ مدرطمت ہے۔
 حب قدقونی مدرطمت ہے۔ چنامدرطمت ہے۔ (ابن ماسویہ)

بیروج کا رساؤ اور اس کی جڑ ستائیس گرام حمل کرنے سے جلد حیض جاری ہوتا ہے۔
 تخم لفاح رحم کا تنقیہ کرتا ہے۔ بیروج کا عصارہ اس کے رساؤ سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔

کما فیطوس کو شہد میں ملا کر حمل کرنے سے رحم کا تحقیق ہوتا ہے۔ کرفس بستانی و بری اور مقدونی سب مدرطمت ہیں۔

تخم کرفس جبلی حیض جاری کرنے کی قوی درجے کی دوا ہے۔

کما ذریوس بالتحقیق مدرطمت ہے خواہ حمل کیا جائے یا پیا جائے۔ جو شانده کرب مدرطمت ہے خواہ حمل کیا جائے یا پیا جائے۔

کاشم اور اس کا تخم دونوں ہی مدرطمت ہیں۔

عصاره کرب اگر شلیم کے آنے کے ساتھ استعمال کریں تو مدرطمت ہے۔

(دیسقوریوس)

کراث نبلی کی ساری قسمیں مدرطمت ہیں لیکن کراث الکرم قوی ترین ہے۔

(جالینوس و دیسقوریوس)

پوست بنخ کبر اور درخت کبر کا پھل دونوں مدرطمت ہیں۔ (دیسقوریوس)

درخت بادام تلخ کی جڑ کو خوب پکا کر اچھی طرح باریک پیس کر حمل کرنے سے حیض

جاری ہوتا ہے۔ (جالینوس و دیسقوریوس)

گھوڑی کا دودھ گرمی سے لاحق ہونے والے احتباس طمت کو جاری کرتا ہے۔

(دیسقوریوس)

بنخ ابنابطس کو جند بیدستر کے ہمراہ شرباً استعمال کیا جائے..... ☆..... سرخ اور مر

پودے کے جو شانده میں بیٹھنا حیض کو جاری کرتا ہے۔ (جالینوس)

بنخ مرکوب..... ☆..... شرباً استعمال کرنے سے حیض جاری ہو جاتا ہے۔ آب گرم

سے نہانا اور ارطمت میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

نمام مدرطمت ہے۔ (روفس)

نانخواہ مدرطمت ہے۔

برگ مرزنجوش خشک کا حمل مدرطمت ہے۔ (بولس)

مرآب ترمس و سداب کے ساتھ حمل کرنے سے طمت جاری ہوتا ہے۔ اگر رزق کے

ساتھ نانخواہ کی دھونی دی جائے تو رحم کی فضلات سے صفائی ہو جاتی ہے۔

اسا سا جو مشہور دوا ہے قوی درجے کی مدرطمت ہے۔

☆ اصل نسخہ میں یہاں کچھ مٹا ہوا ہے۔

سندروس کو آب شہد کے ساتھ پینا مدر طمٹ ہے۔

بیخ سوسن مدر طمٹ ہے۔

لہ سا کا شراب کے ساتھ پینا مدر طمٹ ہے۔ (دیسقوریڈوس)

سکینچ کو آب شہد کے ساتھ پینا مدر طمٹ ہے۔ (جالینوس)

سا سالیوس کی جڑ اور تخم دونوں مدر طمٹ ہیں۔ اس کی قسم اقریشطی قوی درجے کی مدر

طمٹ ہے۔ (دیسقوریڈوس)

سداب مدر طمٹ ہے۔ (دیسقوریڈوس و جالینوس)

فاشراکا جو شانده، اگر اس میں مرینہ کو بٹھایا جائے تو رحم کا تنقیہ کرتا ہے۔

فرا سیون مدر طمٹ ہے۔ (ابن ماسویہ)

بخور مریم کا عصا رہ اور اس کی جڑ دونوں ہی مدر طمٹ ہیں خواہ پیا جائے یا حمل کیا

جائے۔ اس کی جڑ عصا رہ کے مقابلہ میں زیادہ قوی درجہ کی مدر حیض ثابت ہوتی ہے خواہ شراب یا

جائے یا بطور حمل۔ (دیسقوریڈوس)

فوة الصمغ اگر حمل کیا جائے تو بند حیض کو کھولتا ہے۔ (جالینوس)

برگ پودینہ اگر اس کا حمل کیا جائے تو مدر طمٹ ہے۔ پودینہ بہت شدت سے طمٹ

جاری کرتا ہے خواہ پیا جائے یا حمل کیا جائے۔ نیچے سے۔

حتر مدر طمٹ ہے۔ (جالینوس)

صدف اگر مع اس کے گوشت کے پیس کر حمل کیا جائے تو مدر طمٹ ہے۔

(ابن ماسویہ)

قسط مدر طمٹ ہے۔ چرانتہ خواہ پیا جائے یا حمل کیا جائے مدر طمٹ ہے۔

(جالینوس و دیسقوریڈوس)

قیصوم کا جو شانده یا اس کے خشک پتوں کو کھایا جائے تو احتباس طمٹ میں مفید ہوتا ہے۔

(جالینوس)

روغن قیصوم مدر طمٹ ہے۔

زفت اگر جند بید ستر یا اور شراب کے ساتھ پیا جائے تو مدر طمٹ ہے۔

(دیسقوریڈوس)

قثاء الحمار کا عصارہ اگر حمل کیا جائے تو مد رطمت ہے۔
 قنطوریون صغیر کی جڑ یا اس کا جوشاندہ اگر حمل کیا جائے تو جنین کو خارج کرتا ہے۔
 قنہ اگر حمل کیا جائے تو مد رطمت ہے۔
 راسن کا جوشاندہ مد رطمت ہے۔
 رازیانج مد رطمت ہے۔ (جالینوس)
 سوسن کا پھل اگر قفل کے ساتھ باریک پس کر کھایا جائے تو مد رطمت ہے۔
 شلجم مد رطمت ہے۔ (جالینوس دیسقوریڈوس)
 شقایق کا عصارہ اگر حمل کیا جائے تو مد رطمت ہے۔ (ابن ماسویہ)
 شونیز کو زیادہ دنوں تک پینا مد رطمت ہے۔ (دیسقوریڈوس و جالینوس)
 اخلاط کی غلظت اور برودت کی وجہ سے جو حیض رک جاتا ہے اس میں شونیز (کلونجی) سے جنین کا ادراک ہو جاتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)
 انجیر کا دودھ اگر انڈے کی زردی یا موم زرد کے ساتھ ملا کر حمل کیا جائے تو رحم کا تنقیہ کرتی اور مد رطمت ہے۔
 ترمس کا آٹا اگر مر اور شہد کے ساتھ حمل کیا جائے تو مد رطمت ہے۔
 ترمس کا آٹا اگر حاشا اور شہد کے ساتھ حمل کیا جائے تو مد رطمت ہے۔ اور اگر جند بید ستر کے ساتھ حمل کیا جائے تو مد رطمت ہے۔ شہد اور مر کے ساتھ حمل کیا جائے تو مد رطمت ہے۔
 اگر دھونی دی جائے تب بھی یہی عمل کرے گا۔ (دیسقوریڈوس)
 فرزجہ کے ساتھ رازیانہ کو حمل کرنے سے حیض جاری ہو جاتا ہے۔ اور جوشاندہ لہسن کا آبن مد رطمت ہے۔ اسی طرح اس کی دھونی بھی مد رطمت ہوتی ہے۔ (جالینوس)
 لہسن بری مد رطمت ہے۔ غاریقون اٹھارہ گرام کا استعمال مد رطمت ہے۔
 (دیسقوریڈوس)
 خیری زرد کے جوشاندہ سے آبن کرنا مد رطمت ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے تخم کو شراب استعمال کیا جائے تو.....☆..... حیض لانے کے معاملہ میں گل خیری کے جوشاندے نو گرام کا شراب یا شکل حمل استعمال کرنا سب چیزوں زیادہ موثر ہوتا ہے۔
 جوشاندہ خطمی نفاس کا تنقیہ کرتا ہے اگر اس میں مریشہ کو بٹھایا جائے اور شراب بری

☆ اصل نسخہ میں یہاں کچھ مٹا ہوا ہے۔

مدرطمت ہے۔

خریق ابیض اور اسود دونوں ہی کا حمل بہت زیادہ مدرطمت ہے۔

خشی کی جڑ مدرطمت ہے۔ (جالینوس)

وہ دوائیں جو رحم کا تنقیہ کرتی ہیں اور طمت کو جاری کرتی ہیں:

دارچینی، مر، صتربری، قنطاریون صغیر کی جڑ، جوشیر، حب فنجکشت، بادام تلخ، پوست کبر، فوة الصغ، کما فیطون بستانی، زوفا خشک، قثاء الحمار کا عصارہ، خریق سیاہ، علك الانباط، بخور مریم، اشنہ یطافلن، زیرہ سفید، نمام راس، انجرہ، قطران، حلبہ بارزد، مرزنجوش، آب کرانہ، پیاز کا عرق، حرف بابلی۔ یہ تمام دوائیں یکجا کر لی جائیں پھر اس میں سے سات سات گرام لیکر چھان لینے کے بعد آب کر اس نبٹی، آب افستین، آب ترمس، آب مشکطر امشیع، آب کر اس میں سے جو بھی میسر ہو سکے ستر گرام کے ساتھ لی جائیں تو مدرطمت ہیں اور اگر حمل کیا جائے تب بھی یہی عمل ہوگا۔ اور یہی عمل سداب اور اس کے پانی کا بھی ہے۔

ثبث و آب ثبث، آب صتربری، آب جند بیدستر، آب حاشا، ہر ایک ستر گرام کے بقدر لیا جائے تب بھی مذکورہ فعل ہوگا۔

جند بیدستر سارھے تین گرام، تخم کرفس، بڑی الائچی، حب بلساں، حب فاوانیا اور قنہ کا بھی مذکورہ عمل ہے۔

ایر ساسات گرام ۱۰۵ اگر اماء العسل کے ساتھ پینے سے مذکورہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ فوة، سعد، اسارون، پوست سلیخ، دارچینی، مر، میعہ یہ تمام اور افسنخین اور تلسی اگر ان تمام میں سے سات گرام لیکر آب فوة الصغ کے ساتھ پیا جائے تو مدرطمت ہے۔

مقل پھودی، جوشیر، دوقو، ساسالیوس اور قطران اگر جند بیدستر کے ساتھ اور فراسیون کے ساتھ حمل کیا جائے یا فراسیون اور مشکطر امشیع سات گرام آب فوذنج نہری کے ساتھ یا عرق سداب نچوڑ کر ستر ملی لیٹر کے ساتھ پیا جائے تو بھی مدرطمت ہے اور رحم کا تنقیہ کرتا ہے۔

(ابن ماسویہ)

طمت کو جاری کرنے کا ارادہ ہو تو متوقع وقت سے تین دن پہلے صافن کی فصد کریں پھر کسی ایک پنڈلی پر کھنہ لگائیں دوسرے روز دوسری پر اور ایک ہفتہ تک اس سے پہلے لطیف غذا میں کھلائیں اور جب خون کا استفراغ زرین شکم سے ہو چکے تو جند بیدستر پودینہ، نہری کے

ساتھ پلائیں بشرطیکہ حرارت نہ ہو اور جب حرارت ہوتی ہے تو بخار عارض نہیں ہوتا۔ اس حالت میں سب سے بہتر عمل جس کا اب تک تذکرہ نہیں کیا مندرجہ ذیل ہے۔

پودینہ نہری کو شہد کے ساتھ جوش دیکر اس کا جوشاندہ یا اسے خشک حالت میں اوپر سے چھڑکیں یا پلائیں یا حمل کرانیں اور سب سے بہتر وقت حمل کا مہام کے بعد ہے۔ اور اس وقت اس کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل نسخہ اس سے بھی قوی ہے۔

مشکطر امشیع، اور ابھل کو ند کورہ طور سے استعمال کریں۔

ایارج فیکر اس معاملہ میں نفع بخش ہے۔ نیز حاشا، بنج کبر کی چھال، سلیخہ، رازیانج، بطراسالیوس، پر سیاہ و شان اور حمامہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔

برودت کے سبب حیض بند ہو جائے تو اس کی دوا:

حلتیت، کرسنہ نصف حصہ، جوشیر ایک چوتھائی حصہ، دارچینی پانچ گرام، بنج سون اور اُشق دس گرام، پانی میں ابال کر اس کا جوشاندہ ساڑھے تین ملی لیٹر پیئیں۔

اسارون ایک سو چالیس گرام میں ابالیں جب ایک چوتھائی پانی رہ جائے تو پیئیں یہ بہت مؤثر ہے۔ نیز چہرہ کو پودینہ نہری کا سینک پیچائیں ایرسا، سعدانیسون کا جوشاندہ رحم پر گرم گرم دھاریں۔

(چار سطرین اصل میں نہیں ہیں)

دوسرا نسخہ:

عاقرقرا، مویزج، مشکطر امشیع، قطران میں گوندھ کر حمل کریں اس سے حیض اُتر آتا ہے۔

ایک اور نسخہ:

عاقرقرا، مویزج، مشکطر امشیع، قردمانا، حب بلساں، خردل، جند بیدستر، اسارون، پوست بنج توت، جاو شیر لبنی، پیاز، نرگس سب کو یکجا کر کے حمل کریں۔ (اسحاق)

رکا ہوا حیض جب خون کی غلظت کے سبب ہو تو مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کریں:-

جند بیدستر، فلفل ابیض ہموزن، پودینہ کوہی، مشکطر امشیع ہر ایک پانچ حصہ، فراسیون، چار حصہ۔ سب کو ملا کر اس میں سے سات گرام لیکر گنگنے پانی سے پیئیں اور اس پانی میں سرخ لوبیا پیس کر ساڑھے سات گرام قسط سات گرام ڈالا گیا ہو جبکہ آب شیریں چار سو ملی لیٹر ہو۔

اسے پکا کر سولی لیٹر کر لیا گیا ہو۔ داہنے پاؤں میں صافن کی فصد کھولنے کے بعد اسے نہا رمنہ پیا جائے۔ (کتاب الجامع)

مدر حیض اور مستقی رحم نسخہ:

مشکطر امشیع ساڑھے سترہ گرام، فراسیون چودہ گرام، عاقر قرح ساڑھے دس گرام، فوۃ الصبغ ساڑھے چوبیس گرام، جعدہ چودہ گرام، سداب خشک ۲۱ گرام، وج بارہ گرام، نقاح اذخر، بلساں، قسط، کماذریوس، اسارون۔ (کتاب الکمال والتمام)

ناخوہ، قفل سیاہ، قفل سفید ہر ایک ساڑھے دس گرام، تخم کرفس، ثمر فنجکشت، تخم رازیانج، انیسون ہر ایک چودہ گرام، سرخ لوبیا ۳۰ گرام دو لیٹر پانی میں اس قدر پکائیں کہ چھ سولی لیٹر تک رہ جائے۔ اس میں سے نین سولی لیٹر میں ساڑھے دس ملی لیٹر روغن ارٹڈ ملا کر پلائیں۔ آخر میں لو غا ذیا کھلائیں۔

ادار طمٹ کے لئے قوی درجہ کا نسخہ و فرزجہ:

اشنان فارسی، عاقر قرح، شونیز، سداب رطب، فریون ہموزن اچھی طرح پیس کر ملا لیں اور قنہ کے ساتھ گوندھ لیں۔ ایک کپڑے میں جو زنبق میں بھگو یا گیا ہو لپیٹ کر رحم کے اندر رکھیں۔ (دیسقوریدوس)

جب طمٹ کو جاری کرنا مقصود ہو تو پیڑ و اور حالبین پر زیادہ سے زیادہ کچھنے لگائیں۔

(جالینوس۔ حیلۃ البئر)

طمٹ یا تو رحم پر کسی مزاج کے غلبہ کی وجہ سے رک جاتا ہے یا پھر رحم کی بناوٹ میں تنگی اور اس کی عروق میں تنگی کی وجہ سے روکتا ہے اور بسا اوقات گوشت اور چربی کی زیادتی کے باعث یا رحم کی عروق کے منہ کی تنگی کے باعث یا غلظت دم اور قلت دم وغیرہ کے باعث احتباس ہوتا ہے۔ اور قلت دم کا سبب لطیف تدبیر یا ریاضت یا بارد غلیظ اشیا کا کھانا ہے۔

احتباس طمٹ کا سبب حرکت بھی ہو سکتی ہے اگرچہ وہ کسی اور جگہ ہی ہو مثلاً مقعد اور سینہ وغیرہ پر (کتاب العلل والاعراض)

احتباس طمٹ کی وجہ سے رحم میں مختلف اور ام اور دبیلہ وغیرہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سانس میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کی وجہ سے درد سر، وسوسے، ڈھیلا پن اور استقاء عارض ہو جاتے ہیں۔ (یہودی)

وہ موٹی عورتیں جن کے رحم کی عروق تنگ ہیں ان کو ادراطمٹ کے لئے پنڈلی پر پچھنہ لگانا فصد سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ فصد کے ذریعہ ان کی تنگ عروق سے ضرورت کے مطابق خون نہیں نکل پاتا ہے جبکہ پچھنہ کے ذریعہ بقدر ضرورت خون نکل آتا ہے۔ اگر طمٹ کا جاری کرنا مقصود ہو تو طمٹ جاری ہونے کے متوقع وقت سے قبل تین دن تک فصد کریں۔ پہلے دن فصد رگ صافن کی کھولیں اور پچھنے ٹخنے پر لگائیں اور کچھ صالح خون بھی نکل جانے دیں اور لطیف تدابیر اختیار کریں۔ دوسرے دن پیر کی فصد کھولیں۔

اور کبھی کبھی مدر حیض ثابت ہوتا ہے۔☆..... جو شانده فودنج جب کہ اسے ماء العسل کے ہمراہ جوش دیا جائے اور پھر اسے شراباً استعمال کیا جائے یا اسے باریک پیس کر ماء العسل کے اوپر چھڑک کر استعمال کیا جائے۔ اس سے استعمال کا سب سے مناسب وقت حمام سے فراغت کے بعد کا ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ قوی درجہ کی دوا ابھل اور مشطر امشیع کا استعمال ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور ایارج جس میں کہ کسی قدر مائیت ہو اور صبر ساڑھے تین گرام اور اتنا ہی افادیہ ہو اور اس سے بہتر وہ ہوتا ہے جس میں دارچینی شامل ہو۔ اس دوا کا استعمال فصد کے ساتھ اس وقت کیا جائے جب کہ اس کی ضرورت محسوس ہو۔

(جالینوس۔ کتاب الفصد)

پونے دو گرام اشنان فارسی حیض لانے اور پیشاب جاری کرنے میں مفید ہے۔ احتباس طمٹ کے نتیجہ میں عورتوں کو کھانسی، مرگی، فالج، اور تمام ردی املائی قسم کے امراض عارض ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر میں خون نہیں آتا بلکہ فساد خون ہو جاتا ہے۔ جب عورت کے چہرہ پر سرخی، بخار، بے چینی، تھکن، آنکھوں کے گڑھوں میں درد اور سر گرانی ہو تو حیض کے آنے کا پتہ چلتا ہے خاص طور سے جبکہ حیض کا وقت بھی ہو۔ بسا اوقات خون متعفن ہو جاتا ہے۔

جب طمٹ کا نظام بگڑ جاتا ہے تو اس کی مقدار میں بھی کمی بیشی واقع ہوتی ہے اور یہ تبدیلی جسم کے اعتبار سے ہوتی ہے یعنی جس عورت کا طمٹ مائی ہوتی ہے اس کو احتباس کی حالت میں اور ام بلفی، بدن کا ڈھیلا پن، رنگ میں بہت زیادہ سفیدی عارض ہوتی ہے۔

جس عورت کو دبلا پن لاحق ہو اور برے برے دست ہوں اور حیض بغیر حمل کے بند ہو جائے تو اطباء اس کی فصد کرتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن میں نے جب کسی عورت کی عروق کو

اصل نسخہ میں یہاں کچھ مٹا ہوا ہے۔

حار اور کمودی خون سے بھرا پایا تو میں نے فصد کا عمل کیا چنانچہ اس کا خون پگھلے ہوئے زفت کی مانند خارج ہوا۔ میں نے تین دن تک استفراغ دم جاری رکھا جس سے اسے شفا ہوگئی اور اس کی کمزوری بھی دور ہوگئی۔ اسی طرح ایک عورت جس کا شوہر زمانہء دراز سے اس سے دور رہا اور اس کو حیض آنا بند ہو گیا حتیٰ کہ اس کی داڑھی پھوٹ آئی تھوڑے دن زندہ رہ کر اس کی موت ہوگئی۔ (ابیدیمیا)

اگر حیض بند ہو جائے تو نکسیر لانا بہتر ہوتا ہے۔ اگر خون حیض کا رنگ متغیر ہو اور کبھی اپنے وقت پر نہ آئے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بدن کو تنقیہ کی ضرورت ہے اور تنقیہ رنگ خون کا معائنہ کر کے خلط کے لحاظ سے ہونا چاہئے۔ اگر خون غلیظ ہو اور زیادہ سیاہ نہ ہو بلکہ لیس دار بلغمی ہو تو خلط بلغم کا تنقیہ کریں اور اگر مائیت غالب ہو تو بلغم رطب کا بھی تنقیہ کریں اگر زرد اور رقیق ہو تو صفراء کا تنقیہ کریں۔ اگر سیاہ غلیظ ہو تو سوداء کا تنقیہ کریں۔

اگر عورت کو بغیر حمل اور بغیر بچہ کے دودھ جاری ہو جائے تو اشارہ ہے کہ حیض کا آنا بند ہو گیا ہے۔ حنظل کی دھونی دینے سے فوراً حیض جاری ہوتا ہے۔ (الفصول)

رحم کی سختی احتباس ہو تو عورت کو آرام و راحت کا مشورہ دیں۔ بدن کو روغنیات کی مالش سے نرم کریں، حمام کرائیں، مرطوب غذائیں اور مشروبات پلائیں اور حیض آور شافے استعمال کروائیں۔

موٹاپے کی وجہ سے حیض بند ہو تو صرف خشک روٹی اور حمام میں نظرون کی مالش اور زفت وغیرہ کے استعمال سے اس کے بدن کی شربی کھلانے کی کوشش کریں۔

(کتاب میسون فی القوابل)

چھٹا باب

ناف، مقعد اور فرج کا باہر آ جانا، آلہ تناسل اور اس کے متعلقات، دُبر، عانہ، اور ام اور بواسیر مقعد و رحم اور اس کے درد وغیرہ، عانہ کی خرابیاں، ذکر، خصى اور نتوء رحم۔

اس کا جراحی علاج کیا جائے حالانکہ اکثر لوگ دواؤں کے استعمال سے شفا یات ہوئے ہیں۔ دواؤں میں (یہاں اس میں کچھ جگہ چھوٹی ہوئی ہے) اور شراب کی تلچھٹ ۲۸ گرام، خشک گلاب ۳۵ گرام، ماز و خام ۷ گرام (پھر متین میں کچھ الفاظ نہیں ہیں) شراب کے ساتھ یہاں تک غلیظ شہد بن جائے تو اس سے ناف پر طلاء کریں۔ سرکہ میں بنفشہ کو بھگو کر رکھیں اور باندھ دیں۔

نسخہ دیگر:

سیسہ کا برادہ ساڑھے تین گرام، عصارہ طرامیٹ ہموزن کو بھی اسی طرح استعمال کریں۔

مقعد کی تکلیف خروج مقعد کے لئے :

شرینبوت، عفص، اسفیداج، اقا قیا، عصارہ طراشیٹ، لحیۃ الصوبر، کندر ذکر سب ہموزن لے کر اچھی طرح پیسیں اور شراب میں ملا کر مقعد پر لگائیں اور اس پر چھڑک بھی دیں اور مقعد کو اندر لوٹا دیں۔ (بولس)

علاج کے دوران ہلکی اور زود ہضم غذائیں کھلائیں۔ (مؤلف)

رحم باہر کی طرف نکل آتا ہے جس کا سبب عورت کا اونچائی سے گرنے کی وجہ سے ان جھلیوں کا پھٹ جانا ہے جو رحم کو تھامے ہوئے ہیں یا پھر مشیمہ عسر ولادت کی وجہ سے رحم کو کھینچ لیتا ہے یا مردہ جنین رحم کو کھینچ لیتا ہے یا استرخاء بدن جو کسی تکلیف کی وجہ سے ہونو، رحم کا باعث بنتا ہے اور ایسا اکثر عمر دراز عورتوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ رحم کا کچھ حصہ باہر پھسل آتا ہے اور بعض صورتوں میں پورا رحم خارج ہو جاتا ہے لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ پورا رحم خارج ہونے کے بعد واپس کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا پہلا علاج حقنہ اور پیشاب کا اخراج کرنا ہے تاکہ رحم پر دوسری کسی چیز کا دباؤ نہ پڑے۔ پھر عورت کو پشت کے بل لیٹنے کیلئے کہیں اور اس کے سرین کو قدرے اونچا کر دیں پھر اس کی فرج کی مناسب سے کپڑے کا فٹیلہ بنائیں جسے عصارہ قرظ، طراشیٹ اور شراب عفص کے مخلوط میں تر کریں اور پھر رحم کو اٹھا کر نرمی کے ساتھ اس کی جگہ پر لوٹا دیں۔ عانا اور کشادگی کی جگہ پر سرکہ اور پانی میں بھگو یا ہوا اسفنج رکھیں۔ عورت کو چت رکھتے ہوئے اس کے پیروں کو پنڈلیوں کے بل دائیں بائیں موڑ دیں۔ پھر ناف اور مراق کے قریب پہنچنے لگائیں اور عورت کو خوشبو سنگھائیں اور تین دن تک مذکورہ فٹیلہ کو اسی طرح چھوڑ دیں۔ تیسرے دن نیم گرم شراب سیاہ عفص میں یا آب قم قم میں جسے آس، اذخر اور پوسف انارڈا لکرا بالا گیا ہو بیٹھائیں۔ پھر وہ فٹیلہ اس طرح کے دوسرے فٹیلہ سے بدل دیں اور خارجی طور پر زیریں شکم میں پوست انار، جو کے آٹے سرکہ اور پانی سے تیار شدہ ضماد کریں حتیٰ کہ علاج کا یہ تیسرا دن بھی پورا ہو جائے۔ اسی طرح اس وقت تک علاج جاری رکھیں جب تک کہ مکمل صحت نہ ہو جائے۔

سوء اتفاق سے اگر رحم میں عفونت پیدا ہو جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فساد رحم کی

حالت میں رحم خارج ہو جاتا ہے اور عورت اس کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ (بولس)

اگر مقعد باہر نکل آئے اور براز جاری ہو اور ورم باقی ہو اور مقعد نہ لوٹ رہی ہو تو پہلے

ورم کو نکور کے ذریعہ زائل کریں پھر لزج چیزوں سے لطوخ کر کے اس کو لوٹائیں۔ (شمعون)
 لیسدار چیزوں کو بطور طلاء استعمال کریں اور اس پر کچھ قابض چیزوں کو بھی چھڑک
 لیں۔ لیسدار چیزیں اس لئے کہ مقعد کا اندر لوٹانا آسان ہو اور قابض چیزیں اس لئے کہ پھر
 دوبارہ باہر نکل آنے سے مانع ہو اور اسے تقویت حاصل ہو جائے۔ قابض چیزوں کا اثر فوراً
 سامنے نہیں آتا۔ ☆ (مؤلف)

کبھی مشیمہ خارج ہو کر متعفن ہو جاتا ہے اور جاہل اطباء اسے رحم سمجھ لیتے ہیں حالانکہ
 مشیمہ رقیق ہوتا ہے اس کا جرم اور عروق پتلی چھوٹی ہوتی ہیں اور وہ پھٹا ہوا ہوتا ہے۔
 (مؤلف)

کبھی مقعد کا خروج ہو جاتا ہے، ورم ہو جاتا ہے اور واپس نہیں جاتی اگر ایسا ہو تو
 مریض کو خطمی اور کرنب کے جوشاندہ میں اتنی دیر تک بیٹھائیں کہ اثر ورم تک پہنچے۔ پھر خطمی کے
 جھاگوں کو انڈے کی زردی اور آب کتیرہ، لعاب تخم سفرجل کے ساتھ پکائیں اور اندر داخل
 کریں۔ جب داخل ہو جائے تو اسے باندھ کر آب قم قم میں بیٹھائیں۔ یہ خون حیض اور خون
 بواسیر کے روکنے میں بھی مفید ہے۔

اقاقیا مقعد کے خروج کو ختم کر کے مقعد کو اندر لوٹاتی ہے۔ جوشاندہ آس خروج مقعد
 ورم میں مفید ثابت ہوتا ہے۔

برگ انجرہ تازہ کو نتوء رحم پر رکھنے سے رحم اندر واپس ہو جاتا ہے۔ تنہا برگ بنفشہ کا ضاد
 نتوء مقعد میں مفید ہے۔ اس میں جو کا آنا بھی ملا سکتے ہیں۔ (قرا بادین قدیم)
 گائے کے گوہر کی دھونی نتوء رحم میں مفید ہے۔

مصطکی کے پودے کا جوشاندہ جیسا کہ نفث الدم کے باب میں گزرا اور نتوء سرہ و نتوء
 رحم میں لحيۃ التیس (طراشیٹ) مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس)

خروج رحم اور خروج مقعد میں یہ مذکورہ دوا ہے۔ ہیوفسطید اس کی طرح بہت
 مفید ہے۔

چکنی مچھلی سے حمول کر کے باہر نکلی ہوئی مقعد کو باندھ دینا بھی مفید ہے۔

مازو کے جوشاندہ میں بیٹھنے سے نتوء مقعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔

(دیسقوریڈوس و جالینوس)

ماز و کو پانی میں پکا کر پھر اس کا ضاد کرنے سے نتوء مقعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔

(دیسقوریدوس)

بخور مریم کا عصارہ حمول کرنے سے یا سرکہ ملا کر دھونی کرنے سے نتوء رحم ٹھیک

ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)

جوشاندہ ماز و نتوء مقعد کو لوٹا دیتا ہے۔

خروج مقعد میں نفع بخش دوائیں مندرجہ ذیل ہیں۔

آب حب الّاس۔

آب گلنار

عرق گلاب کا جوشاندہ

جوشاندہ پوست انار

جوشاندہ ماز و

جوشاندہ پوست درخت بطم

جوشاندہ پوست درخت مریم

ان سب کے پانیوں میں آبز ن مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

سرخ، پختہ ماز و کو پانی میں خوب ابال کر باریک پیس لیا جائے اور مقعد پر ضاد کریں۔

نتوء میں مفید ہے۔ (اسحاق)

جوشاندہ برگ سداب اور جوشاندہ گل سداب میں بیٹھنا خروج مقعد میں مفید ہے جبکہ

برودت اس کا سبب ہو اور اگر حرارت ہو تو جوشاندہ سرو و جوز سرو و برگ سرو و ابھل میں بیٹھنا

مفید ہے۔

نتوء رحم اور نتوء مقعد کے لئے ایک جوشاندہ:

جوز السرو، گلنار، جفت بلوط، قشور رمان، گل سرخ مع ڈنھل کے ابالا جائے پھر ان

سب اشیاء کو سرمہ کی طرح پیس کر مقعد پر چھڑکا جائے اور انڈے کی زردی میں ملا کر لٹوخ کیا

جائے پھر مقعد کو اندر کر کے اس پانی میں بیٹھا جائے اور اسی حال میں قوی ضاد کیا جائے۔

(مجبول)

قوی نتوء رحم دردزہ کی شدت سے ہوتا ہے اس کو عقل کہتے ہیں۔ اس کا علاج سب

سے پہلے روغن گل سے کریں اور بار بار شب کی سینکائی کریں اور زخم کے منہ پر اقا قیا، مازو اور گلنار چھڑکیں۔ جب مقعد کا خروج ہو اور ورم بھی ہو تو حمام اور گنگنے پانی کے استعمال میں دیر نہ کریں۔ پھر روغن کنجد کی مالش کریں اور چھینک لائیں تاکہ وہ اپنی جگہ لوٹ جائے۔ انڈے کی زردی اور روٹی تھوڑی سی کھلائیں تاکہ فضلہ نہ بنے اور کم از کم چوبیس گھنٹے تک اسے بیت الخلاء جانے کی ضرورت نہ پڑے پھر بھی باہر آجائے تو دوبارہ یہی عمل کریں۔ اگر چاہیں تو کوئی لعاب دار چیز بھی کھلا سکتے ہیں۔ اگر خروج مقعد میں بہت زیادہ ڈھیلا پن ہو تو اس پر اقا قیا کا باریک سفوف چھڑکیں تاکہ وہ زیادہ دن تک باہر نہ رہے۔ اجابت، نرم کرنے کے لئے مغز خبار شہر اور روغن بادام اعتدال کے ساتھ دیں۔ (یہودی)

مقعد پر خبث الرصاص، سماق، تخم گل کو مقعد کو شراب عفص سے دھو کر چھڑکیں۔

(المیامر)

عفص کو جلا کر اس کی راکھ نتوء سرہ پر لگائی جائے یا کندر کو انڈے کی سفیدی میں گوندھ کر ناف پر لگا کر باندھیں۔ اگر بچوں کو زطوبت عضلات مقعد کی وجہ سے خروج مقعد ہو جائے تو یہی دوا کریں۔ (طب مساکین یا مداواة الاسقام۔ جالینوس)

رحم پھسل کر ولادت وغیرہ کے موقع پر باہر نکل آئے تو عورت کو پشت کے بل لٹا کر اس کا سر نیچے اور اس کے کولہے اونچے کر دیں اور نتوء رحم پر نیم گرم روغن ٹپکائیں اور فرج کے ارد گرد اعضاء کو نیم گرم روغن گل میں روئی تر کر کے اس کے ٹکور کریں۔ تھوڑی دیر ایسا کرنے کے بعد قاقیا کو نیم پانی میں ڈال دیں حتیٰ کہ وہ حل ہو جائے پھر سوتی کپڑے میں اس پانی کو اٹھالیں یا الحیۃ التیس کے عصا رہ کو شراب قابض اسود میں ملا کر اس سے سنکائی کریں۔ یہ بہتر علاج ہے یا پھر آب آس روئی پر لگا کر اندر داخل کریں اور عورت کو اپنی پنڈلیاں ملانے کو کہیں اور کچھ دیر اسی حال پر رکھنے کو کہیں۔ پھر اسے جو شانہ قم قم میں بٹھائیں۔ واضح رہے کہ اس علاج سے پہلے نرم حقنہ سے آنتوں کو صاف کر دیں اور مثانہ کو پیشاب سے صاف کر دیں تاکہ جگہ میں وسعت پیدا ہو جائے۔ (ابن سرائیون)

روغن اقوان سخت اور ام مقعد میں مفید ہے اکلیل الملک تنہا یا انڈے کی زردی کے ساتھ اور میتھی کے آٹے کے ساتھ یا السی کے آٹے کے ساتھ یا چکی کی گرد کے ساتھ یا خشخاش کے ساتھ ملا کر ضماد کریں اور سخت ورم مقعد کو خاص طور سے گرم ورم کو نرم کریں۔ اگر ان دواؤں کو شراب میں پکا کر ضماد کیا جائے تو دردوں کو سکون ملتا ہے۔ خسیوں کے درد کو بھی سکون

ہوتا ہے۔
فجنگشت کو چربی اور انگور کے پتوں میں ملا کر خسیوں کی سختی کو دور کرنے کے لئے لگائیں۔ اس کا پھل پانی میں ملا کر ضاد کرنے سے شقاق مقعد کا درد دور ہو جاتا ہے۔ باقلا کے آٹے کا جو شانہ شراب میں پکا کر ضاد کرنے سے خسیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔
(دیسقوریدوس)

باقلا کا آٹا انڈے کی سفیدی میں ملا کر ورم انٹیمین پر لگانا مفید ہے۔ خاص طور سے ان اعضاء کے قروح (زخموں) میں بہت مفید ہے۔

اکلیل الملک کو جوش دیکر اس سے ضاد کرنا ورم مقعد میں مفید ہے۔ بزرنج کو کوٹ پیس کر ضاد کرنے سے ورم خسیہ حار میں نفع ہوتا ہے۔

میٹھی کا روغن مقعد کے ورموں میں مفید ہے (جالینوس)

خوبانی تنہا یا مسکن مغری دواؤں کے ساتھ خاص طور سے توتیا مغسول کے ساتھ وجع مقعد میں مفید ہے جس میں گرم پیپ جمع ہو جائے۔ قرحہ سرطانی میں بھی مفید ہے۔

(دیسقوریدوس)

عانہ کے اورام میں بھی مفید ہے۔ اس کا ضاد کرنے سے مقعد کے ورم حار میں سکون ملتا ہے۔ (جالینوس)

نمک کو پودینہ کوہی میں ملا کر لگانے سے انٹیمین کا ورم بلغمی پک جاتا، نیل کا پتہ شہد میں ملا کر لگانے سے فرج اور فوٹوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔

سوسن کی جڑ پیس کر تنہا سرکہ میں ملا کر یا برگ بنج (اجوائن خراسانی) گیہوں کے آٹے کے ساتھ بھی انٹیمین کے ورم حار میں سکون دیتا ہے۔ (دیسقوریدوس)

مازو کو پکا کر پیس کر اس سے ضاد کرنا مفید ہے۔

دبر کے تمام اورام کیلئے نہایت مفید نسخہ:

جوش دی ہوئی مسور کی دال کو اکلیل الملک اور سفرجل یا پوست انار یا خشک گلاب یا روغن گل میں ملا کر ضاد کرنا بھی مفید ہے۔

خروج مقعد یا ورم مقعد کے عمدہ ضاد:

الیوان اعضاء کے اورام حارہ میں مفید ہے۔

ضماد اسرب اور دوسرے بار د عصارے جو کتاب الضمہ کے مطابق تیار کئے گئے ہوں اس مقام کے اور ام کے لئے مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس و جالینوس)
 خنزیر کی چربی درد مقعد میں مفید ہے۔
 خطمی تنہا یا شراب میں پکا کر ضماد کرنا گرم ورم مقعد کو تحلیل کرتی ہے۔ (جالینوس)
 سویا فرج کے دردوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)
 زفت رطب مقعد کے پھوڑوں اور گرم ورموں کو تحلیل کرتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)
 ارنڈ اور ام مقعد میں مفید ہے۔ خنثی کی جڑ شراب کی تلچھٹ میں ملا کر ضماد کرنا خضیوں کے درد میں مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس)

صلابت انشین کے لئے مفید نسخہ :

بزرالعقد اٹھارہ گرام، سفوف باقلہ ۳۵ گرام، مویز منقی ساڑھے ۵۲ گرام، زیرہ نیلی ساڑھے ۷۱ گرام، چنے کا آٹا پینتیس گرام پس کر ملا کر چھان لیا جائے۔ مویز کو بطن کی یا پچھڑے کی چربی ستر گرام میں ڈبو کر ساری دواؤں کو جمع کر کے تھوڑا روغن سوسن ملا کر ورم صلب پر رکھا جائے بشرطیکہ ورم بارد ہو۔ لیکن اگر یہ ورم گرم ہو تو برسیاں دارد اور عنب الثعلب اور جو کا آٹا اور خطمی کی جڑ اور آب کزبرہ اور انڈے کی سفیدی اور روغن کنجد میں دوا تیار کریں۔

مقعد اور انشین کا ورم :

اکلیل الملک بیخ غبی میں خوب پکایا جائے پھر انڈے کی زردی، میتھی، بزرکتاں کا سفوف، چکی کی گرد، آرد باقلہ، بابونہ، بنفشہ بھی شامل کیا جائے پھر اس کو ورم پر رکھیں۔ یہ دوا رحم کے لئے بھی نافع ہے۔ (ابن ماسویہ)

اگر ورم مقعد حدت اور حرارت کے ساتھ ہے تو سمید (ایک قسم کا اکسکٹ جو تل ملا کر بناتے ہیں) کو پانی اور روغن گل میں پکائیں۔ پھر صاف ستھرے ہاون میں باریک پیسیں اور اس میں ابالی ہوئی انڈے کی زردی ڈالیں اور پھر اس کا طلاء کریں یا خوش گلاب پندرہ گرام، دوا انڈے کی زردیوں میں جوتلی ہوئی ہوں اچھی طرح پیسیں۔ پھر اسمیں روغن گل میں تر کیا ہوا موم ڈالیں اور مقعد پر طلاء کریں۔

توتیا، رصاص محرق، سفید رصاص، سب ملا کر یا ان میں سے کسی ایک کو لگانا بھی مفید ہے۔ نیز روغن گل اور موم بھی مفید ہے۔ اگر مقعد کا درد ٹھنڈک کے باعث ہے تو گرم روغن

استعمال کریں اور گرم جگہ بیٹھائیں مثلاً گرم حمام وغیرہ۔ (اسحاق)
ورد کیلئے:

مرغ کی چربی، گائے کی ہڈی کا گودا ۳۵۱ گرام، سفید موم ۱۰۵ گرام اور روغن گل خام پینتیس ملی لیٹر، سفیدہ رصاص ستر گرام، مردار سنگ آب شیریں میں مغسول کیا ہوا ساڑھے ۱ گرام۔ انڈے کی سفیدی میں سب کو ملا کر مرہم تیار کیا جائے۔ یہ مرہم شقاق اور درد کے لئے

مفید ہے۔
مقعد کی کھجلی جو حرارت کے ساتھ ہو:

عنب الثعلب، روغن گل، انڈے کی سفیدی، طین خوزی، تھوڑا کافور، سفیدہ رصاص، آب عنب الثعلب اور موم روغن میں مرہم بنا کر لگائیں۔

خونی بوا سیر کرنے پر ہونے والا درد:

کراث گھی میں تلا ہوا اور پیاز گھی میں تلی ہوئی بار بار گرم کر کے لگائیں۔ رحم پر بھی ایسا ہی کریں اور اگر وہاں حدت اور گرمی بھی ہو تو مکوء روغن گل میں پکائیں اور نیم گرم لگائیں۔ روغن بنفشہ، بنفشہ گلاب پکا کر روغن گل میں ضماد تیار کر کے لگائیں۔ گرم گرم لگانے سے درد کو سکون ہوتا ہے۔ اکیلل الملک بھی بہت مفید ہے اسے بھون کر روغن گل میں ملا کر لگائیں۔ اگر مقعد کی کھجلی کپڑوں کی وجہ سے ہو تو اس کا علاج دیدان اور حیات کے بات میں دیکھیں۔

مقعد کا بے حس ہو جانا:

نمک کے پانی سے حقنہ کریں۔ کتاب الجامع کے مطابق شقاق مقعد اور گرم اور ام جو کہ شدت درد اور مرہ صفراء کے باعث ہو، کے لئے نسخہ۔

مردار سنگ اور خبث الفضہ ہر ایک سات گرام، سفیدہ رصاص اکیس گرام پیس کر ریشم کے کپڑے میں چھان کر روغن گلاب، موم اور بارہ سنگھے کی چربی میں گوندھیں اور اس کا طلاء کریں۔ (مجبول)

انشیمن اور اس کے نواح میں ورم حار کے لئے مرہم:

مسور، گلاب اور انار کی چھال کو اچھی طرح پکایا جائے پھر اس کے پانی میں روغن گل اور انڈے کی سفیدی ملا کر انشیمن کی کھجلی پر لگایا جائے۔

مایشا کا شافہ روغن گل میں بھگو کر رکھا جائے ران کے اندر کی جانب پچھنہ لگائیں۔

انشینین میں ٹھہر جانے والے ورم کا علاج:

باقلا اور میتھی دونوں کو پکائیں۔ بابونہ پسا ہوا، روغن زرد (گھی) منیج سب دواؤں کو ملا کر انشین کے ورم پر لگائیں۔

ایک عجیب نسخہ جو دیگر مرہموں سے مایوس ہونے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے: کھجور کی کھلی کی راکھ دو حصہ، خطمی ایک حصہ سرکہ میں پیس کر انشین کے ورم پر استعمال کریں۔

ایک دوسرا عجیب نسخہ:

اور اس نسخہ کو انجیر کے نقوع کے ساتھ شراب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مقل شامل کر کے دونوں چیزوں کا ضماد کیا جاتا ہے۔

بچھوؤں کا تیل لگانا اور ہلکے بیج کا کھانا بھی فائدہ مند ہے۔ (یہودی)

شقاق مقعد، ورم حار یا دونوں شدید حرارت کے ساتھ ہوں تو ان کے لیے لکھی جانے والی دواؤں کا ماحصل یہ ہے۔ روغن گل اور عصارۃ غلب اسرب کے ہاون میں ڈال کر اتنا پیسا جائے کہ غلیظ ہو جائے اور سیاہ ہو جائے پھر اس میں سفیدہ رصاص مغسول ڈالیں۔ کچھ لوگ کافور کے لئے بھی کہتے ہیں۔ پھر ہاون میں ڈال کر اس کو مرہم بنالیں بہت عجیب دوا ہے۔ درد شدید ہو تو اس کے ساتھ تھوڑی افیون بھی ملا لیں اس کا فائدہ بڑا عجیب ہے۔ اگر التهاب اور سوزش ہو تو انڈے کی سفیدی میں کافور ملا کر ہاون میں پیسیں اور اسے برف میں ٹھنڈا کریں اور ایک کے بعد ایک بار بار استعمال کرائیں۔ (مؤلف المیامر کے حوالے سے)

مقعد کے بوا سیری درد اور دیگر کے لئے:

چوزے کو شیریں پانی میں سات بار دھو کر انڈے کی سفیدی میں پھینٹ کر طلاء کریں۔

قروح فرج وغیرہ کے لئے:

انسان کی پیشاب سے جبکہ وہ پرانا ہو جائے قروح فرج کو دھوئیں جیسا کہ اطہور سفوس

اور دیسٹوریڈوس نے بیان کیا ہے۔ (ادویہ مفردہ)

میں نے ان اعضاء کے علاج میں اسے استعمال کیا جس کا واضح فائدہ نہیں ہوا کیونکہ

اکمیں حرارت اور رطوبت ہوتی ہے۔ (جالینوس)

سفیدہ رصاص تھوڑی افیون میں ملا کر سرکہ میں حل کریں اور آب کاسنی بھی ڈالیں۔ سرکہ تھوڑا ہونا چاہئے۔ اس کا طلاء ایسے موقع پر کریں جب کہ شدید سرخی، حرارت اور تڑپ ہو یہ بہت زیادہ کامیاب ہے یا آب کاسنی استعمال کریں جب خشکی ہو جائے تو دوبارہ لٹوخ کریں۔ (مؤلف)

قروح دُبر میں رسول مستعمل ہے۔ کالا چنا اگر خفض کے ساتھ پکایا جائے پھر اسے سرکہ کے ساتھ مرہم بنا کر لگایا جائے تو خسیوں کے گرم اور ام میں مفید ہوتا ہے۔ گرمی چنا کا طلاء کرنا بیفتین کے اور ام میں نفع بخش ہے۔ (جالینوس)

قیمولیا کا لٹوخ بیفتین کے سخت اور ام میں نفع بخش ہے۔ (جالینوس)
انٹیمین اور پستانوں کے اور ام گرم یں طین ساموس مسکن و محلل ہے اور دوسرے تمام اعضاء میں بھی مسکن ہے۔ (دیسقوریڈوس)

شمرۃ الکرم جبکہ اس میں زعفران، شہد اور روغن ملا لیا جائے تو فرج کے قروح ساعیہ و خبیثہ میں مفید ہے۔ کندر کو دودھ میں بھگو کر فٹیلہ بنائیں اور مقعد کے گندے زخموں میں اسے داخل کریں تو زخم کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ (اوریباسیوس)
کشینز کا ضاد بیفتین کے ورم حار میں مفید ہے۔

زیرہ زبیب اور باقلا کے آٹے میں ملا کر لگانے سے یہی فائدہ ہوتا ہے۔
برگ غار اور سداب ملا کر ضاد بنا کر لگانے سے انٹیمین کا ورم چلا جاتا ہے مسور کو جوش دے کر اکیلل الملک، سفرجل، روغن گل ملا کر بطور ضاد استعمال کرنے سے مقعد کے ورم، زخم اور فروج کے ورم و زخم ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر زخم گہرے ہوں تو خشک گلاب اور انار کی چھال شہد میں پکا کر استعمال کریں۔ بیل کا پتہ مقعد کے زخموں میں مفید ہے۔
صبر فرج کے زخموں کا تنقیہ کرتا ہے اور زخموں کو مندمل کرتا ہے خاص طور سے دبر اور ذکر کے زخموں کو۔

حبث کی جڑ جلا کر اور رماقیوم دونوں حشفہ کے زخموں میں مفید ہیں۔ (دیسقوریڈوس)
کھٹے انار کے دانے شہد میں پکا کر زخموں کے لئے مفید ہیں۔ حکاک الاسرب روغن گل کے ساتھ مقعد کے زخموں میں مفید ہے۔
اُسرب کا ضاد اور ٹھنڈا پانی اس معاملہ میں عجیب نفع رکھتا ہے۔

شبث کی راکھ عضو تناسل کے زخموں میں مفید ہے۔ نیز حشفہ کے زخموں میں مفید ہے۔

(جالینوس)

بقول ابن ماسویہ تر زخموں کے لئے خاص طور سے احلیل کی جلد میں واقع ہونے والے

تر زخموں میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ (ابن ماسویہ)

زوفا رطب الکلیل الملک اور مکھن میں ملا کر لگانا قروح مقعد میں مفید ہے۔ اگر اسمیں بطخ

کی چربی ملا لی جائے اور اس کا حمل کیا جائے تو فرج کے زخموں کے لئے مفید ہے۔

ذکر اور اس کے اطراف کے زخموں اور خصیہ کے ورم کے لئے:

عنب الثعلب، روغن گل بھی یہی فائدہ دیتے ہیں۔ اگر چاہیں تو انڈے کو ابال لیں اور

عنب الثعلب کو پیس لیں اور روغن گل کے ساتھ حمل کریں۔

انشین کے اور ام حار کے لئے:

آب مکوہ خرفہ، ہر ادھنیا، جو کا آٹا، باقلے کا آٹا اور روغن گل کا ضماد بنا کر لگائیں۔ اگر

احلیل میں پھوڑا ہو تو اسرب کو کندر کے ساتھ جلا کر استعمال کریں۔ (ابن ماسویہ)

خصیوں کے ورم حار کے لئے نسخہ:

ہر ادھنیا، جو کا آٹا، باقلے کا آٹا، روغن گل کا مرہم بنا کر لگائیں۔ (ابن ماسویہ)

ذکر، مقعد اور رحم کے اور ام کے لئے:

اکلیل الملک کو مینج کے ساتھ پکائیں.....☆..... اس میں گیہوں کا آٹا ملا کر ضماد کریں۔

ان مقامات کے ورم حار خاص طور سے ذکر کے ورم حار میں قیمو لیا..... اور زعفران

کے ساتھ طلاء کریں اگر برودت کے ساتھ ہو تو مینج میں بھگوئی ہوئی مقل، اسفیداج سفید کے

ساتھ طلاء کریں۔ (التمام والکمال)

ذکر اور دبر کے قروح خبیثہ زیادہ خراب ہوتے ہیں کیونکہ یہ حرارت اور رطوبت کی

وجہ سے اور فضلات کے مجازی میں ہونے کی وجہ سے عفونت پر مائل ہوتے ہیں۔

میرے خیال میں منہ کے زخم کا بھی حرارت اور رطوبت کی وجہ سے یہی حال ہونا

چاہئے۔

ہذا اصل نسخہ میں یہاں کچھ مٹا ہوا ہے۔

ذکر اور مقعد کے زخموں کا علاج مدلل دوا سے کرنا چاہئے اور وہ مدلل سے زیادہ یا بس بھی ہوں جیسا کہ قوانین خراجات میں ہم لکھ چکے ہیں۔ احلیل کے زخم بعض اوقات یبوست کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احلیل اپنے اطراف سے ذکر کے آخر حشفہ تک پہنچ جاتا ہے اور حشفہ کا زخم یبوست کا کم محتاج ہوتا ہے بہ نسبت کمرہ اور نواح کے تر زخموں کے۔ اس کا علاج کاغذ سوختہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ قوی درجہ کا محفف ہوتا ہے اور اگر ان قروح میں رطوبت نہ ہو اور مدت قریب کی بات ہو تو صبر کا باریک سفوف چھڑکنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس سے مقعد کے قروح بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔

صبر کے بدل کے طور پر قیمولیا مغسول شراب کے ساتھ اور مرتک استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرتک کے بعد بدانا اور توتیا۔ اگر یہ زخم زیادہ رطب ہوں تو درخت صنوبر کی ڈاڑھی جس میں چھوٹے چھوٹے پھل آتے ہیں اور شاد نہ سے علاج کریں۔ یہ دونوں حدت میں برابر ہیں اگر زخم گہرا ہو تو خشک کرنے کے بعد جیسا کہ ہم نے بیان کیا ان دواؤں میں کندر کا آنا حسب ضرورت شامل کریں تاکہ نیا گوشت پیدا ہو جائے۔

ذکر کا ورم حار:

مکو، جو کا آنا، روغن گل، سرکہ شراب، انڈے کی زردی ہم وزن ضماد بنا کر استعمال کریں۔ (جالینوس)

جب کھلی پھنسی عضو تناسل کے ارد گرد ہو جائے تو فصد کے بعد ران کی اندرونی جانب پکھنہ لگائیں اور فوتوں میں قروح خبیثہ ہو تو بھی فصد و حجامت کریں۔ حتیٰ کہ اس کی سیاہی چقندر اور گھی کے استعمال سے دور ہو جائے اور فوطہ کی صفائی ہو جائے۔ پھر مرہموں سے علاج کریں حتیٰ کہ پوری طرح صحتیاب ہو جائے۔

ذکر اور جوانب ذکر کے قروح کا علاج شاد نہ، صبر اور کدو سوختہ سے ہوتا ہے۔ میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ ان کے فوطے میں قروح خبیثہ ہو گیا جس کی وجہ سے تامل پیدا ہوا اور سقوط لحم ہو کر صرف بیضتین رہ گئے۔ اس کے بعد نیا گوشت پیدا ہوا اور کیسہ اول مانند کوئی دوسری سخت چیز اگی اور یہ پہلے جیسی ہو گئی۔ (یہودی)

خدا کے فضل و کرم سے نواں حصہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد انشاء اللہ دسواں جز گردہ، مجاہی بول، مثانہ، اندرون قضیب کے زخموں، اندرون قضیب کی کھلی، بول الدم والمرہ وغیرہ کا بیان ہوگا۔

KITAB AL - HAWI

VOLUME IX

(URDU TRANSLATION)

ABU BAKR MUHAMMAD

BIN ZAKARIA AL-RAZI

(865-925 A.D.)



CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN UNANI MEDICINE

Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India

(Deptt. of I.S.M. & H.)

New Delhi